

C 36

1334

ahc

coll. script

THOMÆ BARTHOLINI
HISTORIARUM
ANATOMICARUM
RARIORUM

Centuria III & IV.

Ejusdem cura accessere

OBSERVATIONES
ANATOMICÆ

Cl. Viri

PETRI PAWI.



HAGÆ-COMITIS,

Ex Typographia ADRIANI VLACQ.

M.DC. LVII.

Illustrissimo Viro

D^N. TAGONI TOT,

Toparchæ in Erichsholm, &c.

**Equiti Aurato, Regni Daniæ Sena-
tori sapientissimo, Regio Borringensis
Præsidi Amplissimo, Literatorum Me-
cænati perbenigno.**

S. P.

TH. BARTHOLINUS D.

EXcessisti humanæ felicitatis
terminum, Vir annis consiliisq;
gravissime, & inclyto animo
mortales superasti. Possem Rempu-
blicam advocare, ut publica tua me-
rita, tot annorum prudentiam pacē
belloque spectatam, virtutes tanto
hospitio dignas, & constantem fami-
liæque illustrissimæ propitiam men-
tem, pleno ore extollat: Sed unius
calami

calami non capit angustia, quod omnium superat admirationem. Ego privata merita tacere nolo, quibus Avum & Parentem Tibi dudum devinxisti, & literatos omnes. Ne posterii sint nescii, nosque ingratos damnent, quia majora non possum, æternam his chartis tanti Herois memoriam submisè inscribo. Patere, senex Inclyte, votivam debitæ devotionis tabulam tuo honori suspendi, ut ab illustri quoq; nomine ad invidiam magno, inter fastos Patriæ legendo, splendorem Historiæ meæ & auctoritatem mutuentur. DEUS tantum patriæ columen florente diu senecta & gloriosa servet, annosque facili largaque manu pro meritorum numero admetiatur fortunatos. Hafniæ
Calend. Januar. clō Idc LVII.

LECTORI S.

PLacido vultu ab æquis candidisque exceptæ fuere priores Centuriæ, & repetita præla meruerunt. Exinde animatus meliorum consilio, neglecto vulgi contemptu, tertiam quartamque corrente calamo, ex arbitrio festinantis Typothetæ, superaddidi, gratiam obsequij à Naturæ cultoribus meriturus. Non quæsiui elegantiam fictâ laudem, sed Naturæ veritate, sed fide narrationum, sed varietate rerum, qua hæc aliaque Lectori me commendo, & alia si possum, spondeo stipulanti. Pluribus nolo pro me intercedere. Placet suapte natura, adeoque gratiosa virtus est, ut insitum sit etiam malis, probare meliora. Vale.

THO-

THOME BARTHOLINI
HISTORIARVM
 ANATOMICARUM
 Rariorum
CENTURIA III.

HISTORIA I.

Abortus cum Mola.

Ebre continua, mox in intermit-
 tentem Tertianam degenerante, cor-
 repta Mulier Hafnienſis primæ no-
 tæ & formæ, poſt tertium gravi-
 ditatis menſem, quanquam à remedijs gene-
 roſis cauta abſtinuerit, abortum tamen exortis
 uteri doloribus edidit facili partu, benè con-
 formatum, mæculi ſexus. Exinde ſtatim fe-
 bris videbatur extincta, quaſi venæ ſeſtione
 per lochia procurata. Tertio poſt abortum die
 remiſſi antea dolores parturientium per vices
 ſed levius recurrebant, quumque iſto triduo
 alvus eſſet ſuppreſſa, ſuaſimus ſuppoſitorium.
 Dictum factum, à ſuppoſitorio ſoluta alvus, eo-
 demque conatu ſine ullo dolore aut graviore
 A ſymp-

symptomate frustulum carnis solidæ per uterum excrevit, quod hepar uterinum credidi, re verò accuratius perpensa Molam esse deprehendi. Prima fronte cordis figuram exactè referebat suo pericardio inclusi, basi & cono conspicuam. Duplici involvebatur triplicique membrana tenui. Inter intimam tunicam & extimam cavitas in altero latere erat, ventriculi instar, quam efformabat tunica à basi latiore molæ producta, ubi quoque crassior, sicut tota basis solidior duriorque velut adipe inserta. Ipsam substantiam quam cultro dividerem. constare eam vidi ex fibrillis infinitis variè invicem connexis & sanguine inter fibrillas concreto. Subtraxerat hæc mola fœtui nutrimenti partem magnam, unde, accedente febrili calore, debilitatus, ante præfinitum tempus, exclusus fuit. Similem molam à non prægnante exclusam nuper vidi. Molarum quia variæ sunt figuræ, neque unquam sibi similes, casu potius & loci varietate compinguntur. *Platerus* stellam marinam arborescentem observavit referre. *Lemnius* L. 1. de Occ. Nat. Mir. c. 8. molam vidit, cui utrinque ansæ duæ annexæ erant in brachiorum longitudinem ac modum exprorectæ, utricæ marinæ similem. *Hildanus* describit molam Cent. 2. obs. 52. fungum seu manum complicatam cum pollice referentem. *Foresius* L. 28. Obs. 61. 62. varias vidit molæ for-

formas, oculos habentes, item accipitris rostro, &c. P. *Salvus* notavit menbrum virile expressisse. *Salmuth* Cent. 3. Obs. 98. oris lati figuram vidit, quale est tineæ vel cyprino pisci, & duo nigra puncta oculos referentia. *Panarolus* Pentec. 4. Obs. 46. bulbum omninò referentem. Oblatas sibi esse molas narravit in amico colloquio D *Paulus Morb.* Archiater Regius & amicus meus honorandus, modò hepatis formâ lobis distinctas, modò bufonis effigie cum riçtu seu rima oris aperta, modò rostratas & alatas. Disputant nonnulli, an diverso tempore fœtus & mola excludi possint. Ne dubitemus, laudata nobis femina fidem facit. *Ballonius* L. 2. Ephem. p. 144. Damisellam de Briaco adducit, quæ legitimo partu pusionem edidit, viginti post diebus veluti molam. De abortibus *Hippocrates* L. 7. Epid. 86. *Terpida mater, à Dorisco per abortionem enixa est mense quinto gemellos ex casu, ab altero quidem statim velut tunica conclusa liberata est, ab altero prius vel posterius quadraginta diebus.* Perfectos quoque gemellos tempora partus inrer se divisisse exempla docent, ut de mola mirum non sit, quæ diversis ligamentis utero annectitur. Memini Neapolitanas puerperas frequenter vel ante vel post fœtum edidisse carneam molam, quam feram vocant, suis membranis inclusam. Superstitiosæ de fera ista credunt, si tangat terram emori

A 2

puer-

puerperam syncope, cui incommodo ut eant obviam, supponunt semper stragulum, deinde aquæ immergunt versantque, denique in cloacas abijciunt.

HISTORIA II.

Phthifici Anatome, in eoque Vasa Lymphatica detecta.

JANUS Laurentii Norwegus, Sartoriâ arte Hafniæ victum privatim quæritans, annorum 30, habitu pinguiusculo & athletico, temperamento calidiore, annis abhinc binis in phthisi venit, tractuque annorum in tantam corporis universi maciem, ut vix ossibus hæreret. A primo verò morbi tabifici insultu vox intercepta fuit, ut præter affirmantis particulam effari nihil posset, nutuque solo necessaria sibi ab astantibus peteret. Ante semestrem spacium obortus illi tumor infra mentum durus, quo impedita fuit solidorum ciborum deglutitio. Interea in ædiculas horti nostro urbano vicinas migravit, ubi inter angustias corporis & cubiculi ægerrimè solis potulentis vitam protraxit, donec penitus interceptis loquendi reliquiis, evanescente prius tumore colli, illuc abiret undè negant redire quenquam. Quarta post mortem hora ult, Mart, 1645. ad ædes clam ad volo cum

Hen-

Henrico à Mòinichen sectionibus meis adsueto, præsentē *Petro Erasmo* diligenter à muliercula ædes inhabitante prius edoctus nulla malignitate tum grassante, aut ædes esse infectas, aut ægrum decessisse. Emaciatum igitur phthisici corpus in angusto cubiculi angulo linteis sepulchralibus involutum dissecamus, nitidumq; cætera & labis in cute expers invenimus. In aperto thorace Pulmones spongiosi plumâ leviores, ex parte costis connati, externâ facie colore nativo tincti, dissecti vero per medium parum sanguinis continebant, cujus vice purulenta materia, alba, sincera expressis vasis exstillabat. In aspera arteria nihil heterogeneum visum, nec ullum istius tumoris vestigium apparuit, unde verosimile est à flatibus excitatum fuisse. Cor sic magnum satis, sanum & sanguine abundans, vasis coronarijs tumentibus. In Pericardio copia aquæ natabat, fusca, quali colore venæ quoque cordis cernebantur. Pinguedo sub universa cute parciore sed flavescens. In abdomine viscera sana pleraque & parum à naturalibus deflectentia. Omentum ferè consumptum. Intestina flatibus repleta & vacua. Ileum hinc inde nigricabat, qualis esse solet color illorum quos malignitas aliqua jugulavit. Hepar, si colorem fuscum excipiamus, nihil monstri alebat. Vesicula fellis plena, sed obscurior. Venter sanus capaxque, luridus Lien, Pancreas

incorruptum, sed pinguedine oblitum. Mesenterium sine pinguedine, sine lacteis manifestis tandem explicamus. Ecce circa ramum Mesentericum & splenicum duo Vasa Lymphatica se produnt tanto illustriora, quanto visu magis grata. Lætabamur impensè in homine à nobis visum quod anxie hætenus optaveramus. Vasa ista tumidiuscula undarum instar per venam Portæ fluctuabant oblonga, calami columbini crassitie, propter contentam aquam limpidam resplendescencia, & prorsus similia illis quæ in brutis olim primi invenimus. Prope hepar alia viscebantur minora, numero tria, per portam descendencia plena & eadem splendente humiditate pellucida. Plures Lymphaticorum ramos observare nequivimus, quod accuratius inquirere nec locus incommodus averfus à lumine, nec anxia muliercularum ante fores præstolantium expectatio festinantibus concederent. Motum tamen liquorum Lymphaticis Vasis contentorum in transcurso libavimus. Majora illa duo per ramum Mesentericum progredientia digito compressa humorem limpidum obstinatè retinebant, nec ad inferiora propellebant, unde ex cruralibus Lymphaticis orta judicabam, propter valvulas & cursum liquoris, nihil remeare admittentibus: disparuit autem versus superiora supra digitum quicquid cavitati inerat, ut conspici amplius nullo visu potuerit.

rit. Ex hepate quæ emergebant, eundem humorum cursum servabant, quem in brutis notavimus.

HISTORIA III.

Vulnus sclopeti in occipite.

PYRIO pulveri nullam inesse malignitatem eruditè probavit *Hildanus*, neque cum ad nervosas partes pervenerit. Firmat Viri laudati sententiam famulus mercatoris Hafniensis. Quum superiori anno ad lustrandos cives post pestilentiam extinctam, armis suis per ordines dispositæ classes per urbem procederent, ex sequenti ordine quidam per imprudentiam sclopetum solo pulvere pyrio refertum in prioris ordinis commilitem qui uno passu ab eo distabat, explosit. Juvenis læsus viginti circiter annorum honestis in Germania ortus parentibus, corruit dictum factum velut fulmine ictus, domumque sensu motuque privatus deferitur. Suspicio erat per nucham penetrasse pulverem urentem ad nervorum principium ob vocem interceptam & sensus omnes sublato. Consuetæ à Chirurgo perito contra ambusta postico vulnere applicantur remedia, venaque secta humorum ad partem affectam affluxum & alia sequutura symptomata inhibuit. Decubuit ita sine

A 4

sensu,

sensu, voce & motu quinque dierum spacio. Transacto quinto, eschara decidit, nudaque calvaria sine contusione aut rima apparuit. Statim aliqua motus rediere indicia, oreque aperto ad roborandum cerebrum portionem Cephalicam meo consilio hausit, exterius verò undique caput cephalicis munitum. Præter exspectationem sensim ad motum se erexit, & rogatus ad nutum Chirurgi vulnus deligantis in lecto se volutavit. Nono die fari cepit, & expeditior motus sensusque processit, quum altera eschara ex musculis occipitis & colli soluta tendines nudos illæsos monstraret, nec ad interiora penetrasse pulverem indubiam fidem oculis faceret. Exinde melius habuit, curatoque simplici vulnere convaluit, metu seu mortis seu Apoplexiæ ante percussus. Nempe turbati fuerant inopinato sclopeti ictu spiritus in cerebro, & nervi sive defectu spirituum sive timore constricti ab officio cessaverant. Metus multorum morborum causa, & timore nonnullos extinctos accepimus. Fulminis quoque ictu non pauci concidunt moriunturque, sive animi consternati culpa, sive malignitate communicata.

HISTO-

HISTORIA IV.

*Icterus Quartanæ superveniens non
semper malus.*

NEphritici dolores ingentes post longum decubitus & dextri sinistrique hypochondrij dolores cum frequenti vomitu quartanariam uxorem meam suavissimam postridie magni solaris deliquii 1654. invaserant torquebantque miserimè, nulloque remedio juvante, ad dolores mitigandos & laxandas vias in balneum aquæ tepidæ ægram demisi. Vix post repetitum lectum hora effluerat, quum febrilis paroxysmus invaderet tanto cum horrore, ut convulsionis esset metus, exinde horæ spacio interjecto, calor successit sequentibus diebus continuus, nec quarto die alius typus comparuit. Initio hujus paroxysmi bilis per universum corpus effusa Icterus induxit, & flavo colore cutim aliàs candidissimam oculosque infecit turpissimè. Urina crocea & satis flava, quæ chartam linteumque tingebat. Ominabar male & de salute uxoris desperabam territum duplici Prognostico. Solet enim mortis esse præsagium si Chronicis morbis Icterus succedat. Præterea Hipp. 4. Aph. 64. malum proclamat, si febris ante diem septimum morbus regius accesserit; Non enim

A 5

critica

critica sed symptomatica est evacuatio. Sed præter spem fefellerūt me præsagia. Tertio enim die sanguis una per alvum dejectus, purus, fibrosus, quem, quia purus, à fæcibus separatus & guttatim fluens sine torminibus, hæmorrhoidalem rectè judicavi. Septimo die sensim turpis flavedo ex corpore disparuit, splendidior more solito reddita cutis, lien induratus ante detumuit, hepar quievit, sopiti Nephritici dolores; Nec ex illo tempore quartanæ sentiit insultū. Tum in mentem veniebat *Hippocrates*, qui l. 1. Epid. sect. 2. 1. t. 22. sibi in Aphorismis contrarius, morbum regium etiam ante septimum prodesse prodidit, si vel per urinam purgatio, aut alvus turbata, aut sanguinis profluvium successerit, aut hæc omnia, ut Heraclidi evenit, juxta Aristoclidem decumbenti, cui & ex naribus fluxit sanguis, & venter turbatus est, & per vesicam est purgatus. Fluxus autem hæmorrhoidalis & quartanam sanavit, & lienem tumidum evacuavit, & ominosum Ictere signum elusit.

HISTORIA V.

Hermaphroditus sine cute,

Chrisiani Cerdonis Hafniensis uxor consueto partus termino expirante, facili partu enixa est hermaphroditum, muliebri natura loco

loco solito, virili verò membro supra in pube conspicuo. Alebat præterea infans extremis artubus aliquid monstri. Loco manus extremæ pedes erant, & locum pedis occupabant manus. Adhæc nuda caro comparebat sine cute, cujus ne vestigium quidem in universo corpore conspiciebatur. Non à calore, quia nihil de intemperie conquerebatur Mater, nec ab acrimonia humorum in utero contentorum, ut suspicabar, quia fidem fecit Obstetrix nostra, omnia secundum consuetam Naturæ legem fluxisse, nec modum nec qualitatem lochia excessisse. Igitur à primo conceptu defectus materiæ, vel cōformatricis facultatis imbecillitas inculanda.

HISTORIA VI.

*Anatome mulieris quæ prægnans falsò
credebatur.*

UXOR Eliæ Tabellarij in vico Regio prægnans ab obstetrice judicabatur, ob ventris tumorem & duritiem. Remittebat tamen illa & interdum per vices augebatur. Pedes subinde tumidi, internum sine sensibili evacuatione detumescebant. Menses interim ordinatis vicibus fluebant. Cætera toto corpore eleganter carnosâ florentis ætatis femina. Cœperunt hæc symptomata invalescere à tempore quagesimali

dragesimali 1655. ad Junium mensem, quo ingentibus doloribus auctis vivere desit. Consensu Mariti, & ita jubente ægra ante fatalem horam, cadaver aperuit *D. Simon Pauli*, qui curæ illius præfuerat, meque adscivit testem sectionis & rerum observandarum. Ex aperto abdomine ingens copia serosi sanguinis effluxit, quæ cavitatem quoque thoracis occupabat, implebatque mensuras nostras sex. Sive is sanguis ex rupto vase sit effusus, sive per *διὰ πύλιν* expressus. Inanitæ vacuæque omnes venæ in utroque ventre cernebantur. Omentum nulum, sed putredine absumptum. Intestina tenuia protuberantia omnia arctissime inter se connexa & membranis & pinguedine connata. Cohærebant eodem vinculo inter se ventriculus, hepar, lien & cætera huc spectantia: Remotis tenuibus & à membranis pinguedineque separatis, membrana adiposa & præpinguis à ventriculo protendebatur per universum abdomen ad coxas, qua discissa subtrus delitescabant crassa intestina libera. Circa rectum intestinum maxima pinguedinis copia adnata, ut prima fronte magnæ glandulæ specie dubios nos reddiderit. Uterus sanus justæque magnitudinis sine ullo conceptu. Ventriculus densus cartilaginis duritie, eminentiam acutam suprapylorum, uropygij instar, habebat, forsan ubi omentum abruptum fuerat, cætera vacuus sola

sola pituita glutinosa superflite. Hepar grandius utrumque hypochondrium implens, scirrhusum, firmiter supra infraque omnibus vicinis cohærens, membrana prope costas variegata, rubrisque maculis distincta, quæ facile separabatur. Lien arctissimè infra ventriculum pinguedine immersus, pugni magnitudine, colore sano. In Thorace aperto, dextra cavitas plena sanguine isto seroso, grumoso & lento. Pulmo exiguus vix pomum magnitudine æquans. Pulmo sinister præter solitum amplius costisque adnatus. Nullam tamen ægra superstes respirandi passa est difficultatem. Pericardium pinguedine abundans, sed sine serosa humiditate, quæ cum sanguine diffluxerat. Cor elegans & pusillum, adipe ferè tectum. In ventriculis ne guttula sanguinis comparuit, ut mirum non sit tribus ante obitum diebus pulsum cessasse. Tantorum symptomatum & miræ hujus constitutionis causa credebatur venenum per errorem fortassis oblatum, quum enim prædicta accidentia illam invaderent, vomitus insequutus, diarrhæa ingens, & sanguinis ex naturalibus eruptio. Inde invaluerunt symptomata, tumor ventris, dolores incredibiles, ut, secundum methodum frustra adhibitis remediis, ipsi sibi ventrem aperire sæpius dolorum impatentia optaverit.

HISTORIA VII.

Monstrum sine cranio.

IN oppido Cimbriæ Bryns territorii Haderslebiensis natum monstrum sexus masculini primis conjugii parentum annis, in quo nullum cranium visebatur, sed inversum caput, oculis posticam partem occupantibus, lingua exserta. In occipite tamen os triangulare supererat. Nullum collum. Infra oculos pollicos carnis cruentæ portio propendebat, ex qua sanguis stillabat. Sinistra manus ad superiora protendebatur erecta, quam si vi deprimeres, sua sponte ad superiora erigebatur. Sex digitis eadem manus ornabatur, ut & sinister pes. Dextra manus retrorsum à corpore flectebatur, quæ vi reducta, ad exteriora sua sponte redibat. In utriusque manus carpo dura adnata erat caro. Corpus reliquum per artus aut ventres distinctum non erat, sed æqualiter sine ullo discrimine à superioribus ad inferiora informe protendebatur. Rubra tamen lineola baltei, seu cinguli instar medium corpus dividebat.

HISTO-

HISTORIA VIII.

Menstrui fluxus ubertas.

Consilium meum expetiit uxor Pastoris in Scania honestissima, annorum 38. uterinis passionibus obnoxia, quæ sex abhinc hebdomadis ingentes dolores dorsi, lumborumque & murmura ventris hinc inde oberrantia perpeffa est, ut rugitibus supra infraque interceptus videretur commeatus. Puerperii dolores credidisset & partum imminentem, nisi pro certo constitisset gravidam non esse. Inter hos dolores menses prodierunt, quos non speraverat, sex hebdomadum spacio leniter fluentes, qui subinde per biduum subsistentes, recurrentibus iisdem doloribus, revertebantur. Sanguinis melancholici vitium mihi videbatur, qui serofus & flatulentus acrimonia sua venas uterinas reſeravit. Quia tamen de absente nihil certius sum pronunciare, & alias meminisse etiam in prægnantibus menses effundi, relictis generosioribus remediis suasi clysteres carminativos, sacculos uterinos, aquas fl. Chamomeli, Cinamomi, Cumini, &c. Quibus nihil proficientibus continuus evasit fluxus, qui octavo quovis die velut periodicus tanta copia effundebatur, ut grumosi sanguinis vasculum

culum satis capax exciperetur, jamque vires valde prostratæ sanguinem sistentia poscerent. Existimavi maxima sanguinis serosi & acris evacuata copia, ab obstructione esse nullum periculum. Præscripsi igitur Electuarium adstringens, & unguentem adstringens lumbis pubique inungendum, quibus feliciter sensim sedatus fluxus, & sopiti dolores.

HISTORIA IX.

Medullæ spinalis Anatome.

Quia plurima circa medullam spinalem & exinde exortos nervos inter Profectores nostros emergunt dubia, placuit spinalem medullam ex spina dorsi eximam curiosius examinare, ut aliis hætenus neglecta investigarem. Exterior tunica crassior levi opera separatur, & corticis instar faciliè tota ab interioribus divellitur, connectiturque interiori membranæ per fibrillas & nervulos ad vertebrarum foramina properantes. Venulas habet sed exiles. Interior subtilis membranula, piæ matris soboles, hujus more fibrillas venularum medullæ arctius connectitur. Dorsi spinalis medullæ longitudinem insigne vas sanguineum perreptat, ex quo ramuli hinc inde elegantissima serie emittuntur, quemadmodum in cerebro.

bro. Ad latera utrinque alius ramus sed minor ejusdem membranæ longitudinem percurrit, ex quo utroque pari modo ramusculi per tunicam disperguntur, an medullam pertranscant, haud liquido constat. In medulla certe interiore discissa puncticulæ rubicundæ hinc inde comparent, sine dubio à venulis capillaribus derivatæ. Medulla ipsa dorsalis à suprema ad infimam dividitur in duas partes. Veluti enim cerebrum antè per falcem seu duræ matris duplicatam meningem, ita hæc medulla, cerebri propago, manifestè distinguitur per tunicam internam, piæ matris filiam, nulloque negotio separatur. Medullæ divisura eandem membranulam recipit variis minutissimis venulis ornatam. Supra divisuram incedit nominatum nuper vas sanguineum, instar sinus in falce cerebri. Media tantum medulla per divisionem istam finditur, sed secundum medullæ totius longitudinem, paulatim enim & membrana tenui & medullæ confusione obliteratur. Remota membrana, quanquam pateat fissura & per tenuem falcem separetur, exterius tamen, integra tunica & salva ita constringitur, ut medullæ rotunda figura servetur. Cerebro perquam similis est medulla, quod & notatum Galeno l. 7. de Placit. c. 5. & l. 12. de V. Part. c. 11. Licet solidior, externè candicat, substantia constante, in centro mollior & obscurior. Libuit fi-

B

stula

stula experiri an medullæ subesset cavitas. Maximo spiritu non potui ullum cavitatis indicium percipere. At immissa in sinum seu divisuram fistula, facillimè spiritum ad extrema perducebam, totumque medullæ corpus, qua divisura pergebat, visum est elevari. An per hunc sinum quicquam in viventibus succi traducatur, non sine ratione dubito, si quidem arcte extrema membrana clauditur, respondetque fissuræ cerebri, per quam nihil ferri observamus, præterea purissimus est iste sinus & candidus, quarti ventriculi æmulus, sine ullo liquoris vestigio. Cætera non addo quæ aliis Anatomicis notata passim leguntur.

HISTORIA X.

Tuberosus pueri pes.

S Exennis puer Rustici Hafniam venit consilium apud Chirurgos petiturus. Delatus quoque ad me fuit spe auxilii. Vidi dextrum pedem oblitum tuberibus, non absimili figura manus à Severino l. 4. de Abscess. Anom. c. 1. depictæ & descriptæ. Dextri pedes pollex & index ita erant inflati, ut pedem integrum singuli digiti æquarent. Tres verò digiti minimi sub reliquis velut sub umbone latebant. Cujusque digiti tuberosi unguis latè se extenderat, reconditusque dilitescebat sub flexura tube-

ris

ris ad superiora inflexi. Dorsum pedis similis fungus occupabat, & sub planta alius extabat. Omnia ista tubera mollia, levia, fungorum instar, sed rotunda & æqualia, sine ullo doloris sensu, ut expedito gressu supra tubera plantæ ambularer, sed calceus pedi aptandus caput æquè ac pedem exciperet. Increverunt tubera à primo nativitatis anno, ex quo sensim cum augmento corporis in istam amplitudinem excreverant. Parentis rustici votum erat, ut resecarentur partes spongiosæ, quo ad agrestia officia rediret. Dissuasi tamen operationem propter instantis caniculæ æstum, & ad nos postea revisere jussi.

HISTORIA XI.

Articulorum Exsiccatio.

Religiosus Doctusque Pastor Grevanus post genæ sinistrae Paraly sin, licet corpore robusto & obæso, in tantam articulorum incidit exsiccationem, ut omnium ossium, cervicis, dorsi, brachiorum &c. motum exaudiverim & exacte distinguere potuerim, quasi omnibus articulis è compage sua solutis. Sonus quoque scapulæ, singulorum digitorum, epiglottidis, nasi extremi percipiebatur. Mira res visa omnibus & ægro molesta, nec satis relationi

credidissem, nisi præsenti mihi singula & visu & auditu innotuissent. Memini aliàs febribus ardentibus ita exsiccare in emacitis articulos, ut sonitu se prodant. At nulla hic febris, nulla macies. Re pressius apud ægrum examinata, comperi Hypochondriacum esse, murmura ventris sentire & fere fauces siccas esse. Forsan articulorum humiditas fuit intercepta propter detentam lympham in obstructo mesenterio. Divinum aliquid hic latere judicarunt alii quos consuluit. Ego verò cognito affectu hypochondriaco facilem curandi viam inveni. Obstructiones mesenterii commodis potionibus referavi, flatus dissipavi, roboravi viscera, & externis humectantibus tam fomentis quam exemplastris tantum profeci ut nec articuli ficci sint impedimento, nec hypochondria murmurent, commodeque jam vivat, Deique muneribus piè utatur.

HISTORIA XII.

Hermaphroditus Pariens.

ANcilla utriusque sexus, licet de ambigua natura varii rumores spargerentur, nupsit tamen Viro plebejo, & tandem gravida amisit in pestilentia illa magna 1654. maritum. Post computum decem & tres hebdomades effluerant,

rant, antequam verum pariendi tempus affulgeret. Interea in tantum tumorem aqualiculus est distensus, ut se gemellos parituram crederet. Tandem puerum grandiusculum enixa est, sed in partu extinctum. Vix obstetricem precio preceque exorare potuit, quod malè successurum negotium Hermaphrodito omnes ominarentur. Infans autem ob loci difficultatem vix eluctabatur angustias, unde compressum in partu caput *μακροκεφάλως* imitabatur, de quibus *Hippocrates* l. de Aere, locis & Aquis testatur, quod capita illorum tenella & mollia manibus efficta sint, & in longitudinem elevata. Lochia deinde copiosissima expurgata, quibus in tantam molem abdomen increverat. Ipsa Mater superstes & sana funus infantis sui procurat.

HISTORIA XIII.

Pregnans menstruata.

O Raculum est *Hippocratis* 5. Aph. 60, si prægnanti purgationes menstruæ procedant, bene valere foetum esse impossibile. *Galenus* in Commento de magna sanguinis evacuatione senem interpretatur sæpe fluente, quod privetur foetus alimento necessario. Alii ut *Liehauius*, *Heurnius*, *Martianus*, &c. post perfectam *πρωτην* 35. vel 40. die periculum cum Coe metu-

unt. Novi ego mulierem juvenculam Hafnien-
 sis mercatoris uxorem, quæ quotiens uterum
 gerit ordinarios patitur mensium fluxus adeò
 copiosos, ut lecto affixa imbecillitati suæ con-
 sulat. Subsistit is stato tempore, nec à primo
 conceptionis mense ad ultimum statas vices in-
 termittit. Fætus nihil inde mali patiuntur, quos
 masculos & robustos feliciter solet eniti. Igitur
 in plethoricis non succedit semper Aphorism-
 us, in quibus tantum super est sanguinis, ut
 nisi vel Venæ sectione extrahatur vel mensibus
 erumpentibus imminuatur, abortus immineat
 periculum vel gravidæ exitium. Uterum verò
 pertransire necessum non est, quum ex iis ve-
 nis quæ utrinque in uteri cervicem inseruntur
 profluant, ut rectè *Galenus* monet, & experien-
 tia suffragatur. Cui volupe legat nuperum
 Commentarium viri Eruditissimi *Io. Claudii de*
la Courvée de Nutrit. Fœtus in utero, ubi totus
 in eo est, ut demonstret fœtum non sanguine sed
 solo chylo in utero nutriri. Quid igitur periculi
 si gravidis vel fluant ordinati menses vel secetur
 vena? Non ob alimenti necessarij defectum, sed,
 quantum conjectura assequor, quod sanguine
 nimio evacuato vires puerperæ imminuantur,
 nisi & fœtus sit robustior & grvida sanguine
 præter necessitatem abundet. Novi quamplu-
 rimas prægnantes, quæ modò ter, modò bis,
 modò semel expurgentur sine fœtus detrimen-
 to,

& id pro certo conceptionis signo interpretantur.

HISTORIA XI V.

Vermis ex gravida.

Uterum gerebat Fridericiburgi mulier, sororis meæ olim serva, & necdum gestationis tempore completo tormina supervenere, nausea & tandem vomitus, quo præter spem vermis satis longus ex ore prodiit matre mea charissima præsentē. Mox conquievē omnia, tormina, nausea, & vomitus sedatus, sanoque statu per reliquum tempus decurrit donec feliciter eniteretur sanum foetum & perfectum. Suspicio mihi nata, vermes in mesenterio vitio alimentorum natos ab utero tumido sursum fuisse protrufos. Vidit *Panarolus* Pent. 5. Obs. 33. in puella virgine, uteri duritie & dolore afflicta, ex abrupto vermem per os vivum expulsum, dodrantali longitudine, capite viperino, colore cinericio, sed maculis nigricantibus inspersis, undique pilosum.

Lumbrici aliàs frequentes inferiora petunt varia forma, passim noti fere sine capite. *Tulpius* tamen Consulari dignitate conspicuus l. 2. Med. Obs. c. 42. lumbrici lati caput vi-

dit & depingi curavit. Ego lumbricum vidi ex puero trium annorum, nepote meo, excretum longitudine ulnæ mediæ fuscum nullisque articulis distinctum, utraque extremitate acutum, qui aquæ immerfus alteram extremitatem acutam oris instar diduxit hiansque aquam sorpsit. Certè plerisque lumbrici, nisi in intestinis detruncantur, caput habent, quanquam non ita manifestum ut à reliquo corpore distinguatur accuratè possit. Hinc enim dolores vellicantes & tormina pueros misere torquentia. Dentes habere & orationibus probat *Codronchius* de Morb. Vulg. c. 14. *Antonius Vituglianus* Medicus Romanus eruditus ex Antonio de Palto excretos vermes vel mille vidit, non majores cucurbitæ seminibus, sed rotundiores & pilulosos, habentes rostrum acutissimum nigrum in ore instar animalium quæ vites corrodunt, & Musculæ vocantur.

HISTORIA XV.

Motus sine corde.

JANUS auceps homo nefarius, qui nuperis annis in ædibus solitariis viæ Regiæ extra Portam Orientalem Hafniæ quam plurimos una nocte solus securi percussit, occiditque, tandem comprehensus morti tremendæ & acerbissimæ adjudicatus fuit. Per urbem enim rheda vectus,

ctus, forcipibus ignitis hinc inde miseré fuit discerptus, & ad supplicij locum deductus. Primum illi fracta crura & brachia, mox lingua faucibus evulsa, lora ex tergo excisa, deinde celeri carnificis manu pectus apertum, extractum cor, & in faciem projectum. Omnia ille cordatus intrepido animo pertulit & constanti, quumque cor pulsans ad latus projectum jaceret, inter alia tormenta, quæ sequebantur, caput expeditè movebat, adstantes torvo vultu intuebatur & cor suum accuratius contemplabatur, donec caput amputaretur. Occurrebat memoriæ *Verulamius* illustris, qui in *Hist. Vit. & Mort.* ad Art. 15. t. 32. certam de Homine recitat traditionem, qui eo supplicij genere versus proditores in Anglia recepto evisceratus, postquam Cor avulsum penitus esset, & in Carnificis manu, tria aut quatuor verba Precum auditus est proferre.

HISTORIA XVI.

Vesicarium devoratum.

UNO eodemque tempore duobus ægris in Pharmacopolio nostro Parens meus cœlitibus pridem adscriptus, præscripserat huic Vesicarium, illi Bolum purgantem. Culpa deinde & errore famulorum Pharmaceuticorum evenit

ut loco Boli vesicatorium ex Cantharidibus studioſo mitteretur, & alteri bolus. Hinc aſſumpto hora ſexta veſicatorio miri cruciatus excitati, linguæ fauciumque excoriatio, & extrema homini imminēbant, cui hora 9. acci-tus Parens ſumma ope ſategit occurrere, exhibitaque ſtatim lactis copia & aquis refrigerantibus ad vomitum compulſit. Interim plurimi dolores circa veſicæ regionem excitati, cantharidibus veſicam corrodentibus. Ad dolores veſicæ inſeſſus, cliſteres refrigerantes viſi opportuni. Tandem Theriaca cum aq. acetosæ aliquotiens exhibita ſomnum procuravit. Sed tota nocte cruciatus perſeveravit, & miſtus ſanguinis copioſus. Profuerunt Anodyna, ſyrupi refrigerantes & confortantes, emulſiones, quibus in integrum reſtitutus æger evaſit. Turbas tales incuria famulorum ſæpe concitat, & auxilij ſpe fruſtrantur mortales. Prudenti igitur decreto Medicorum Hafnienſium in officiis noſtris receptum eſt, ut & forma medicamenti & nomen ægri inſcribatur pyxidi vel chartæ ægris mittendæ.

HISTORIA XVII.

Polypus Cordis.

Henrici Schrafferi Belgæ annorum 50. cadaver Hamburgi à Mich. Kirſtenio Medico & Ana-

Anatomico peritissimo apertū fuit anno 1651. in quo sequentia notabantur publico dignissima. In dextro cordis ventriculo repertum est concrementum seu Polypus ingens, qui annatus erat dextræ auriculæ in parte superiore versus Cor, & extendebatur sinuato ductu in ipsam capacitatem dextri ventriculi, ubi pariter adhærebat parieti inferiori, implicitus valvularum cuspidibus. Porro progrediebatur sursum & exhibat per venam arteriolam, in cuius truncum & deinde ramos tripartitus sive distinctus in tres ramos porrigebatur. Rami illi rursus in alios multos furculos & tandem filamenta desinebant. Circa exortum duos prope digitos erat lata hæc concrefcentia, longa spithamam unam & tres circiter digitos. In auricula sinistra inerat alia concrefcentia, sed vel nullo modo, vel plane leviter adhærens. In cavitate auriculæ pars erat latior referens concretum sanguinem, protendebatur autem in arteriam venosam, ubi candicabat, distributa similiter in aliquot ramos, inter quos erant tres potiores (qui rursus in alios minimos dividebantur) inserti in ramos minores arteriæ venosæ.

In Aorta reperiēbatur alius Polybus ejusmodi insignis, cuius pars lata sive basis sita erat in divaricatione trunci, ubi etiam adhærebat firmiter: Ibiq; peculiaris quidam sinus, instar sphaeræ

sphæræ dimidiæ vel vesicæ effectus fuerat, in quem una & major ejusdem extuberantia inferebatur. Hic appensæ erant duæ quasi radices, quarum una immittebatur in arteriâ dextram, altera eaque bifida in carotidem sinistram. Basis erat subrotunda, instar cucurbitulæ balneatorum, & in longum extendebatur versus Cor, ita ut illud non ingrederetur, sed ingressum aortæ in cor attingeret. In fine erat altera appendicula. Longitudo totius quasi quinque digitorum. Omnia vasa cordis, ut & auriculæ erant ampliata mireque dilatata, inprimis caudex arteriæ aortæ. Præterea in vasis Iliacis ejusmodi vitia sunt reperta, ut & in sinu cerebri falcato, ubi per totam prope longitudinem effusa videbatur concrefcentia alia, quæ, inprimis versus posteriora, in duos ramos dirimebatur, in plurimos furculos, similiter & multas appendiculas distinctas. Singula ex figuris appictis clarius elucent, quæ mihi D. Joël Langelotius, Archiater Gottorpianus meritissimus, Amicus honorandus, amice transmissit.

FIGURARUM EXPLICATIO.

Fig. I. Exhibet dextrum ventriculum cordis cum auriculâ, venâ arteriosâ & contento in illis. Polypo.

aaa. Ven-

Fig. 3.



2
f
q
r
q
a
e
r
i
a
p
d
e
d
m
c
f
v
i
p
c
A
h

Fig



aaa. Ventriculi dextri cavitas aperta.

bbb. Auricula dextra & vena cava, qua circa eam discissa.

ccc. Vena arteriosa dissecta & à pulmonibus separata principium.

d. e. ff. Excrescentia seu Polypus.

d. e. Pars ejus latior seu basis.

ff. ggg. Pars ejusdem longior cum pedibus, seu ramis, surculis, filamentis insertis in venam arteriosam.

h. Appendix alia.

Fig. II. Ostendit sinistram auriculam & arteria Venosa principium dissectum cum Polypo.

aaaa. Cavitas qua oritur ex auricula sinistra & arteria venosa dissecta, non satis tamen expressa.

bb. Pars cordis.

c d e. Polypus.

c d. Ejus Basis.

eee. Rami & surculi ingredientes ramos venosa arteria.

Fig. III. Monstrat Aortam dissectam & in ea Polypum.

aaaa. Aortae portio à corde & Pulmonibus resecta.

bbb. Divisio arteria.

c. Arteria axillaris dextra.

d. Carotis dextra.

e. Carotis sinistra.

f. Axillaris sinistra.

g. Aortae truncus descendens totus dissectus.

h. i. k. Polypus.

bb. Po-

h h. Polypicaput.

i. Longitudo Polypi versus cor.

l l. Pedes Polypi seu appendices.

m. Sinus ille p. n. in quo repositum erat caput polypi.

n n n. Pedes alij aortæ ramis inserti.

Fig. IV. Polypum in cerebro exprimit.

a a a. Pars summa cerebri membranis tecta.

b b b. Sinus falcis dissectus superior.

c c c. Polypus in sinu falcis.

d d. Pedes nonnulli ad vasa porrecti.

e e e. Venarum in dura meninge rudimenta.

HISTORIA XVIII.

Melancholicus loqui nolens.

PAralyſi linguæ & ſiniſtri corpori correptus mercator Hafniensis loquendi facultatem amiſit. Adhibitis variis pro ſanitatis recuperatione remediis, inprimis ſecta vena lateris ſani, paulatim & reſolutio partis emendata & loquela facilior. Perſiſtitit verò diutius fatuitas quædam melancholica, ut amicis quibuſcumque præſentibus de re quacunque interrogatus reſpondere, nihil voluerit. Potuit tamen cantilenas diſtinctè cantare ſequutus ductum horologij templi vicini S. Spiritus, verba omnia facræ cantilenæ ſine hæſitatione aſſequi, ſed ad alia quæſita amicorū & uxoris præter negatē parti-

particulam, Jesu nomen, &c. nihil reposuit. Vitium linguæ incusabant amici, venæ sub lingualis sectione emendandum, sed revera melancholica erat animi perversitas, nolentis linguam ad voces expedire, satis facilem. Qui enim articulata voce Psalmos contabat, cur non alias posset voces proferre? Interea quia cerebrum stupore quodam fatuum videbatur & intemperie frigida laborare, huic omni arte succurrebatur, quia & ante morbi hujus invasionem de oblivione conquestus fuerat.

HISTORIA XIX.

Lochia per alvum expurgata.

Lochiorum post partum expurgatio copiosior nonnunquam ex justo, parcior nonnunquam, interdum planè intercepta. Pro diminuto vel cessante fluxu lubrica alvus confert, cujus rei causam non raro admiratus sum. Novi puerperas quibus nulla lochia post partum successerunt, magno vitæ discrimine. Injecto vero clystere simplici alvoque soluta convaluerunt, quibus diarrhæa loco sanguinei purgamenti fuit saluti. Quum uxor mea charissima feliciter filiolum meum Casparum enixa esset, parcissimè præter morem lochia fluxerunt, sed continua fere aliquot dierum diar-

diarrhæa sine ulla virium jactura purgata fuit. Dubitavi per quas vias retracta sit materia ad intestina. Longæ viæ sunt, nec hic per alvum cruor decurrit. Igitur vero mihi sit simile per alvum revelli & evacuari serum quo alioquin diluitur sanguis & imprægnatur ad venas uteri patentes deducendus.

HISTORIA XX.

*Convulsivi motus ex dextro
hypochondrico.*

Maligna subinde ex certis partibus aura elevatur, & nervos ad convulsiones irritat. *Galenus* l. 5. de Loc. Aff. c. 5. vidit convulsione comitali ob oris stomachi virium correptos, & simile quid *Grammatico* juveni evenisse. Alibi l. 3. de L. A. c. 7. observavit in puero decimum tertium ætatis annum agente, dispositionem Epilepticam ex tibia initium cæpisse, mox inde recta adscendisse per femur & lumbos, ac per latera ad cervicem donec ad caput pervenisset. Alius adolescens dixerat veluti frigidam quandam auram adscendisse ad caput. *Fernelius* l. 5. Pathol. c. 3. vidit à manuum pedumve digitis, vel à crure, interdum ab utero suscitaram. Alia exempla recitat *Marcellus Donatus* l. 2. Hist. Med. Mir. c. 4. *Holler*, in Prax. c. de Epileps. in

in Schol. refert historiam Monachi cujusdam Parisiensis, qui ex vaporibus à liene adscendentibus & cerebrum impetentibus menstruam patiebatur epilepsiam. Quod illi ex liene, Pastori cuidam Hafniensi ex hepate nuper accidisse suspicio. Nam à dextro hypochondrio ubi hepatis est sedes, invasit Reverendum Virum calor per musculos externos sensim adscendens cum pattium, per quas transit, stupore, ad musculos thoracis ejusdem lateris, ad brachium dextrum, ad dextram faciei partem & collum, ubi pedem quasi figebat stupor. Faciei autem musculi ad dextrum latus leviter convellebantur, eodemque modo paroxysmus iste sæpius recurrebat, ut gravioris convulsionis metus ingens ægro sit ortus. Sed sectâ venâ, injectis clysteribus, exhibitis pulveribus & aquis Antiepilepticis opera D. Mothi Medici felicissimi intermiserunt paroxysmi, sublatus metus, & inexorabile fatum subiectum pedibus, strepitusque Acherontis avari.

HISTORIA XXI.

Ructus Hystericarum.

NOVIT *Fernelius* l. 6. Pathol. c. 10. quibus plures ructus quam verba essent, in colicis doloribus flatulentis. Nos similia notavimus

C

in

in muliere Hypochondriaca & uterinis suffocationibus obnoxia, quæ quotiens sive ad curationem sive præservationem uterini affectus aquam Hystericam ex carminativis & uterinis compositam sumit, totiens infinitos ructus edit & liberatur. Nonnunquam spacio horæ quadrantis plus quam 400. ructus numeratos retulit mihi maritus amicus optimus, & uno spiritu subinde 50. eructari. Nitrosi aliquid subesse putatur, sicut enim ex nitro sonitus in bombardarum explosione, ita in humano corpore fieri existimant. Uteri verò intemperies hic culpanda frigida, & affectio hypochondriaca, in qua rûgitus ventris audiuntur ex flatibus creberrimi, qui solent increescere mensibus imminetibus, & quod mirum, nunquam ventrem distendunt, aut in tympanitide. Et utero præterea non minus quam alvo prodire flatus ventris annotant *Zacutus* l. 2. Prax. Admir. Obs. 141. *Salmuth* Cent. 2. Obs. 57. Passimque similia exempla audiuntur. De uxore sua mihi narravit Vir quidam summus, inter sermones interdum crepitum emisisse, ruboreque suffusam prævia excusatione necessitatis durum telum prætendisse, cogi enim se non per alvum sed uterum hujusmodi peditum edere. Observavi in aliis sæpe ex flatibus commotum uterum imposuisse mulieribus, quæ falsò sibi persuaserant se & uterum gestare & embryonis motum percepisse.

HI-

HISTORIA XXII.

Hernia Umbilicalis.

IN vico Hafniensi Laurentii Biornonius filiolus Sartoris sex menses natus Herniam umbilicalem passus est, sive ejulatu rupto umbilico sive flatibus distento, ab obstetrice enim umbilicum nascenti probe ligatum & procuratum afferebant. Rupto umbilico prodire foras intestina tenuia membranulâ tecta per angustum abdominis & peritonæi foramen, quo quasi circulo calloso pendula intestina constringebantur. Quum interea ad inhibendam gangrænam applicarentur remedia, calidoque lacte foverentur intestina, quinto die rupta membranula latiusque discerpto peritonæo, nuda prorsus intestina propendebant ad longitudinem mediæ ulnæ, per gyros consuetos intorta. Utrinque portio intestinorum eminebat, dextrâ versus crassius erat ileon ob flatus distendentes, angustius quod sinistram partem foraminis occupabat, duos tamen gyros involuta intestina efformabant. Consilium fuerat ampliare foramen, ut intrudi possent, & in locum suum reponi, sed ante puerulus fatis cessit quam Chirurgus adveniret. Post mortem longius adhuc intestina processerant, sine dubio in extremo morientis conatu protrusa.

HISTORIA XXIII.

Mirus Hydrops.

Ex Insulis Ferrensis Socer meus honorandus famulum habuit nautæ filium, annorum viginti, temperamento pituitosum & ad actiones segnem, qui partim Insulani aeris intemperie, partim nativa imbecillitate & segnitie, in hydropem sensim incidit, quo venter increvit & munia necessaria sunt impedita, tandemque in immensam molem aqualiculus distensus intumuit. Ubi ad summum tumorem elevatum est abdomen ut speculi instar pelluceret, ubertim per poros cutis aqua stillabat, detumuitque sudore isto spontaneo hydrops, ut & venter subsideret, & omnia linteamina corpori circumtensa lectoque injecta liquore diffluerent. Increfcenti iterum hydropi, idem stillicidium aquæ sponte sua prorumpentis, remedio fuit, sed tandem sæpius recurrente inter cutem aqua fractis vi morbi viribus ad plures abiit. Mirum sanè nec semper obvium aquæ per cutis foramina stillicidium. Nempe in immensum dilatata cutis per patulos poros facile aquam exstillantem admisit, quemadmodum id arte quotidie procuramus, siue laconico siue sudoriferis exhibitis.

HISTO-

HISTORIA XXIV.

Tetanus ab esu anguillæ.

IN publico urbis Hafnienſis diverſorio Hoſpitis filia & neptis in cœna cum aliis convivis anguillas in ferculo propoſitas comederant. Finitâ cœnâ utraque miro affectu correpta. Senſibus enim interceptis, ut ne acus puncturam ſentirent, rigidæ ſtabant, nonnihil ſubinde in priora curvatis corporibus, ſicut in emproſthorono evenit. Perſtitit hic Tetanus tribus diebus, ſed vicibus interruptis. Eſus anguillæ quanquam non paucis in deliciis ſit, à Medicis tamen improbatur omni tempore ex quacunque aqua emerſerint, maximè circa ſolſtitium, teſte Iovio, *Arnoldo Villanovano* aliisque. Nam nunquam boni ſucci ſunt tametſi puro in humore verſentur, nedum in eo qui urbium ſordes & purgamenta in ſe recipit, ut autor eſt *Galenus l. de cib bon. & mal. ſucc. c. 15.* Rationem alibi reddit *l. de Ten. diſſ. c. 6.* quod tametæ carnem habeant mollem, ſucco tamen lento & pituiſoſo abundant. Tales noſtræ ſunt anguillæ in portu variis ſordibus ex urbe inquinatæ. Reliquiſ tamen convivis innoxia fuerunt. Sed robuſtiores illi & calidiores evincere facilius potuerunt imminencia damna & generoſiori po-

tu sublevare. Unde autem Tetanus? Limosæ Anguillæ crassum lentumque alimentum subministrant & obstructionibus nervorum peropportunum. Hinc voci quoque nocere scribit *Ioannes de Mediolano* in schola Salernitana:

*Vocibus anguilla prava sunt si comedantur,
Qui Physicen non ignorant hæc testificantur.*

Advocatus in subsidium laborantibus Medicus exercitatus D. Christianus Fabricius, amicus noster, propter veneni suspicionem, vomitoriis statim ventriculum exoneravit, qui esculenta sola rejecit, perseverante verò malo ad Alexipharmaca digressus noxium affectum jugulavit.

HISTORIA XXV.

Anatome nuper natæ puellæ.

Theatro nostro Anatomico illatum cadaver 1654. exeunte sequioris sexus nuper natæ, à Matre impia occisæ. Quæ singularia occurrebant & mihi & *Martino Bogdano* Viro clarissimo, qui me subinde propter negocia publica absente, dissectioni præerat, paucis lineis notabo.

Per venam umbilicalem tanta sanguinis copia regurgitabat, ut sectionem impedivisset, nisi vinculo fuisset constricta. Urachus planè im-

impervius, per quem nullus liquor compressa vesica nec spiritus remeabat. Pinguedo ubique sub cute diffusa, sed rubicundior, Omentum araneosis telis simile, exiguis glandulis hinc inde conspersum. Hepar amplum more solitio in utroque hypochondrio, caput fœtus exæquans. In mesenterio vasa lactea notabantur, & pancreas Asellii candicante succo turgidum. Lien obscure rubebat, gustu nitrosus, transversos digitos duos longus, latus vero unum digitum. Colon meconio seu succo atro repletum. Ventriculus cremore humido plenus, & ileon simili materiâ circa finem scatebat. Cœcum nil excrementi continebat, sed lumbrici instar more consueto intorquebatur.

Uterus parvus vesicæ & recto intestino affixus, nymphæ exterius prominentes membranosæ, alæ vespertilionum seu ligamenta superiora inferebantur in ossis ilii spinam. Ligamenta rotunda videbantur membranæ carnosæ, quæ est circa musculos femoris, esse processus, quibus adductis crus totum movebatur ex membranarum consensu, nam in pedes anserinos longius diffundi non erat conspicuum. Uteri cavitas tanta erat, quæ lentem reciperet. Nullum aliud virginittatis in puella vestigium comparebat præter carunculas. Glandulæ renales renibus & hepati & lieni & peritonæo arte affixæ, cavitas vesicæ aqualis & figura similis.
pha-

phascolo, atro succo tenuique tumida. Renes ipsi ex plurimis glandulis magnis compacti.

Aperto thorace thymus circa jugulum ex tribus glandulis conspicuus, magnitudine cordi æqualis. Pulmones rubicundi, substantia densi: In pericardio humor ferè aureus, quantum duo cochlearia caperent. Foramen ovale in corde magnum, eleganti membrana tenuissima in circulo obvelatum, Canaliculus itidem conspicuus. Oesophagus refundebat spumæ quid simile & sputo. Crassa meninx adhærebat calvariæ tam arctè ut vi separari debuerit. In cerebro notabamus omnia quæ in adultis, sed imperfectiora, quia substantia cerebri mollior, & ventriculi compressi. Cerebellum cinericio & obscuro colore. Processuum mammillarum vestigia tantum signata, velut tenui muco dependente.

HISTORIA XXVI.

Pedes manus vicarii.

O Peras mutuas inter se tradunt pedes manusque. In pedum defectu manus suppetias in ambulando ferunt. Versa vice manibus vel culpa naturæ vel externo errore deficientibus, pedes ea præstant omnia quæ manus solent. Vide plura hujus exempla. Elegantissimos literarum characteres à pede mulieris vide
signa-

signatos. Alij mihi visi, qui pedibus pro lubitu uli & nummos donativos colligerent, & caput detegerent & securi expeditè ad operas uterentur. Illustre exemplum referam, quod omnium oculis nuper Hafniæ exponebatur. Mulier Suecica nomine Magdalena Rudolfs Thuinby, annos nata 42. nupta Germano militi, à primis incunabulis sine brachiis vixerat, & ne dolum crederemus subesse, illius consensu, nuda brachia exploravi, tactuque deprehendi solas scapulas adesse, nullumque vestigium ossis humeri & cubiti superesse, cutemque articulo humerali inductam sine ulla artificii suspitione. Quanquam autem brachijs sit mutilata, tanta tamen dexteritate & promptitudine pedibus omnia munia exsequitur, ut spectatorum admirationem mereatur, manibusque commodè carere videatur. Pedibus net, fila per acum trahit, textoriam artem exercet, sclopetum onerat exploditque forfice; & cultro artificiosas chratas scindit, tesseris ludit & alea, patera libat, infantem suum fasciis involvit. Flectere eodem pedes novit, capiti & pectori adducere, ut infantum velut ulnis admoveat uberibus, cibum potumque & suo & infantis ori indat, crines sibi pectine expediat. Omnia denique sine molestia præstat quæ & propriæ necessitati sufficiant & aliorum desiderio.

HISTORIA XXVII.

Penis gangræna.

JUvenis mercator Hafniensis febre corripitur ardente, cui venæ sectione & sudoriferis occurratur, sed frustra. Quibus nihil proficientibus, tandem victus dolore aliud malum aperit, quod occultabat, nempe tumidum penem, inflammatum & gangræna ferè defædatum. Confessus quidem est, rem secum muliere habuisse, sed contractam inde luem negabat, quod sana illa videretur & viribus integra. Orgasmm igitur inculavimus, & nimium juvenis fervorem, unde inflammatio, quam spre- tam vel dissimulatam gangræna est insequuta. Curatus fuit à Chirurgo imposito Ægyptiaco, & inflammatione refrigerantibus sedata. Tandem pars post partem sponte sua decidit, donec ad sanam colis partem perventum, quæ vix unius digiti articuli longitudine superest, per quam promptè lotium mejit.

HISTORIA XXVIII.

Antipathia variae.

VARIAE sunt quæ pro singulorū natura, homines insita & occulta antipathia averfantur.
Multi

Multi plura notarunt, nos nobis visa signabimus. Nobilis Venetus ferre non potuit calidum recentemque panem discindi. Hospita mea Veneta anguillas averfabatur. Vidi saepe felis praesentiam sed insciam, plurimis sudores provocasse & animi anxietates. Credit superstitiosum vulgus illos solos à sele abhorrere, quorum cunas felis forte ante baptismum transfilivit. Nobilis quidam Baro, amicus meus, æger rimé ferebat, si aciem cultri sursum in mensa verteres. Caseum & butyrum plures sunt qui repudient. Butyrum quidam frigidum fastidunt, liquatum in cibis appetunt, & si errore coqui frigidum forte cibis misceatur, in lipothymiam incidunt. Domesticum hujus antipathiae habemus exemplum, ad nepotes translatum, ut si vel vi vel blanditiis, puerulis vel butyrum vel caseus obtrudatur, superveniat vomitus, anxietas & narium hæmorrhagia. Nobilissima apud nos familia sinapi & allium averfatur. In medicamentis quidam Rosam non ferunt, alij Cinnamonum, alii Aurantium flores. Pleraque mulieres offenduntur à suaveolentibus, uterique patiuntur commotiones & hystericas passionis. Novi tamen Hafniæ mulieres quibus foetida naribus admota nocent, benè olentia verò libenter etiam hystericæ, excipiunt. Generosa quædam Matrona, omnia suavem odorem spirantia perfert, exceptis violis recentibus.

Unde

Unde summo studio in singulorum naturam Medicus inquirat, antequam vel hæc vel illa medicinis admisceat. Viros vidi exhibitam confessionem Alkermes vomitu statim rejecisse. Robustus quidam Hafniensis cætera sanus & cordatus, quotiens canem vel minimum videt, totiens perterritus convulsione sinistrae manus corripitur.

HISTORIA XXIX.

Arteriosus sanguis serosus.

Sanguini arterioso plus feri inesse quam venoso ex arteriotomia nos docuit *M. Aur. Severinus*, amicus magnus & Chirurgorum Princeps. Experimento enim comprobavit *Epidoch. l. de Aq. Pericard. t. 8.* in cruore crebris arteriotomijs extracto duplam fermè compertam ichoris portionem. Serum in arteriis contineri, nemo dubitavit, eo enim vehiculo indiget sanguis calidior. Cur autem & unde major ichoris quantitas in arterijs reperiatur, nemo divinare potuit. Lumen nobis hic fenerantur vasa Lymphatica, quæ aquam ex arteriis recipiunt suoque alveo includunt, nec sinunt omnem ad venas effundi. Unde mirum non est, copiosiorrem esse aquam in arteriis quam venis. In splenetico mihi amicissimo nuper experimenti veritatem

ritatem comprobavi. Per vomitum quinq; circiter vel ses mensuras nostras sanguinis ex liene rejecit, copiosis arteriis referto, Interjectis horis aliquot tertiam mensuræ partem serum occupabat, floridoque sanguini innatabat. Eodem vomitus tempore ad revulsionem secta illi fuit vena brachij, sed nullum in sanguine venoso haud illaudabili serum vel perpaucum comparuit, quod familiare sibi esse & consuetum ipse æger mihi fatebatur.

HISTORIA XXX.

Melancholicus digitos sibi detruncans.

A Gathias Smyrnaeus l. 2. hist. Gothorum, peregrinarumque historiarum scriptum reliquit, Leutharem Barbarorū Ducem eo amentiae devenisse, ut propria membra dentibus carne lacerata voraret, defluentemque lingeret cruorem. Quod ex illo inter picæ exempla recitat M. Donatus l. 4. hist. Med. c. 1, Studiosus Hafniensis pius & eruditus, melancholia Hypochondriaca miserè diu afflictus, quum se ex suprema ædium publicarū contignatione præcipitasset, & à chirurgo deligarentur accepta vulnera, præ impatientia dextræ manus indicem dentibus sibi detruncavit, & nisi vinculis in lecto fuisset constrictus, nec reliquis digitis percisset.

HISTORIA XXXI.

Thorax compressus.

NAuta quidam Petrus Finlandus recenter exstructam naviculam è sentina in aquas per glaciem cum socijs alijs protracturus, sub onere concidit pede titubante. Cæteri socij ignari hujus casus, naviculam, ut cæperant, protrudunt, unde miser ille inter naviculam glaciemque medius, à pondere incumbentis naviculæ ita fuit compressus, ut thoracis figura rotundior planam acquisiverit, indeque difficilis respiratio, urinæ incontinentia, ex ore auri- busque copiosi sanguinis fluxus. Tractu tamen temporis ita convaleuit, ut pugno alijs prævaluerit.

HISTORIA XXXII.

Monstrum intestinis exsertis.

IN civitate Selandiæ Coagio, nativitate Brochmannorum clara, natum pridem monstrum humanum, cujus superior capitis pars, futuris solutis, ut in alijs nuper natis usu venit, moveri & à vicinis separari potuit. Sinistri brachij loco truncus erat duabus appendicibus digitorum vice distinctus. Tres digiti in manu
dextra,

dextra, quartus digitus referebat granum hordei cum appendicula infra cubitum. Cor in hypochondriis situm. Intestina extra umbilicum prominebant nuda colore rubicundo. Digniti dextri pedis connati, quibus prorsus sinister pes carebat. Uterque pes rotundus iustar ungulæ, calcibus introrsum versis.

HISTORIA XXXIII.

Lotium calculosi copiosum.

PAstor ruralis temperamento calido & humido, eufarco, ætate consistenti, ante paucos annos calculo laborans per quinque dies à calculo obstruente urinam suppressam continuit, nec præter guttulas perpaucas interea excrevit. Post quintum sua sponte prodiit calculus insignis magnitudinis, qui nucleum pruni majoris facile æquabat. Exinde tantam lotij copiam emisit, ut octo portis seu mensuris nostris implendis sufficeret. Nihil ex illo tempore sensit incommodi, nisi quod per vices recurrant dolores arthritici in dextri brachij articulis, quibus leniendis, donec finito Æquinoctio, corpus universum expurgari possit, & inprimis caput evacuari, unde fluxionis principium, quia calidum & humidum & de ejusdem dolore imminentibus paroxysmis articularibus conqueritur,

queritur, dedi Emplastrum Anodynum in officinis nostris usitatum, quo & dolor solet mitigari & peccans materia discuti.

HISTORIA XXXIV.

Anatome calculosi pueri Brixiani.

Filius D. Marci Antonij Scalvini Brixiani, novem annorū, bonæ complexionis, 1645. ægrotavit diebus 33. febre ardentissima, quæ spacio paucorum dierum consumpsit omnem carnem, reduxitque miserum puerum ad sceleti maciem. Extremis diebus de ardore urinæ conquerebatur ejusque difficultate, quam sanus nunquam passus fuerat, licet siti continua aridus sine modo & modio tam vinum quam aquam puram lutulentamque & sapone inquinatam avidius hauserit. Demortui cadaver Parentes de incantamento dubitantes, cupientesque scire causam mali, aperiri jusserunt. Inveniebatur hepar immensæ magnitudinis prorsus sanum, nisi quod in extremis partibus esset tostum, nigrum & durum. Renes flaccidi nulliusque consistentiæ, in venis emulgentibus prope renes reperti sunt duo calculi, unus utrinque, nec tamen unquam in juvenili corpore urinæ mictionem impediverant. Primus calculus æquabat pondus duorum aureorum Hispanico-
rum,

rum, $1\frac{1}{2}$. ungaros, & sex grana. Alter duos aureos medium ungarum exceptis septem granis, quemadmodum testis mihi est frater charissimus *Doct. Erasmus Bartholinus*, qui per *D. Moretum* insignem Patavij Mathematicum à Brixiano Medico hanc observationem accepit.

FIGURA CALCULI.



HISTORIA XXXV.

Anatome calculosi pueri Leidensis.

Puer tredecim annorum, postquam per duos annos & quod excurrit, purulenta mictione & per intervalla diris cruciatibus graviq; pondere in hypogastrio laborasset, tandem spiritum

D

DEO

Deo reddidit. Parentes & amici ad causam tot malorum cognoscendam advocarunt *Thomam Staffardum* Chirurgum Leidensem peritissimum, amicum meum, ut cadaver aperiret. Vesicam invenit mirum in modum dilatatam, cujus crassities mediocrem digitum transversum æquabat, qua aperta extraxit calculum oblongum coloris cinericei. In vesicæ collo nihil præter naturam inventum, sed in renibus causam purulentæ michonis detexit. Renis dextri parenchyma planè consumptum erat, ita ut nihil præter membranofam ejus substantiam sacculi in modum contractam, esset reliquum. Sinister æquabat magnitudinem duorum pignorum, subnigro colore, apertus pure scatebat totus, & in infima ejus parte exiguus abscessus reperiabatur. Vtriusque pelvis admiranda amplitudine erat dilatata. Ureteres à renibus ad vesicam usque tam ampli visebantur, ut facili negotio digitum minimum admitterent. In reliquis visceribus nihil memoratu dignum fuit reperi-
tum. Lapis ipse obtusa & porosa parte in collo vesicæ latuit.

HISTO-

HISTORIA XXXVI.

Vomitus sanguinis salutaris.

Sanguinem supernè efferri, qualiscunque sit, Smalum pronunciat *Hippocrates* 4. Aph. 25. nempe si cum febre, ut se explicat. 7. Ap. 37. quia inflammationem indicat, interprete *Galeno* in Comm. & *ἐπιγίγνεται* est. Aliàs vomitu si rejiciatur per se periculo caret, præsertim tumido liene. Qui vomendo effertur vel ex hepate, vel liene eructatur. Vtrumque fieri consentit *Galenus* l. 5. Lo. Aff. c. 5. Pro liene vas breve adest, quod ideò tumidum sanguineque distentum observavi in horum Anatome. Hepar per porum cholidochum & sanguinem & bilem mittit. De alio sanguinis vomitu loquitur *Hippocrates* l. 2. Coac. Prænot. qui uterum expurget & sterilitatem tollat. Sect. 3. §. 43. *Sterilibus sanguinis vomitus ad concipiendum utilis est.* A menstruorum suppressione serum exprimi ad ventriculum *Duretus* credit. *Hollerius* contra vomitum sanguinis ad conceptum rarissimè prodesse, nisi si cui præ copia sanguinis aut largius fluentibus mensibus id accadat. Recte id quidem. Pro *Dureto* enim non video quid responderi possit. Evacuato quippe sero facilius subsistent ulterius menses, suo vehiculo privati, nisi nimium abundet.

In largo autem mensium fluxu, qui conceptum impedit, si ex quacunque parte evacuatio succedat, onere liberabitur uterus.

Nobilissimus quidam in Dania Vir, sexagenarius, vomitum cruentum perpetuum patitur, magnaue copia per statas vices sanguinem rejicit à liene, nullo vitæ aut valetudinis damno, sed salutari evacuatione. Supra trigessimum annum eo commodo gavissus est, sanusq; hoc medio vixit, & si subsistat, vitæ suæ & incolumitati timet.

HISTORIA XXXVII.

Scintillæ ex capillis.

C*Ardanus* l. 8. de Rer. Var. c. 43. de Monacho Carmelitani ordinis refert, quoties capillitium reduceret ad occiput, scintillas ignis è capillis erupisse. Heroïna Caumontiæ apud *Scaligerum* Exerc. 174. in mediis tenebris capillum dum pecteret ignem vidit. Sæpius id *Petro Io. Fabro* insigni chymico contigit, uti testatur in *Pallad. spagyrico* c. 14. & vidit in puella nobili, forma gratissima prædita, quæ dum coram illo capillos venustè admodum pectine implicatos dissolveret, flammæ veluti cadentes cœlo stellas, è capite suo in sinum excutiebat, quo meteorò perterrita puella in syncopen ferè incidisset, ni subito verbis lepidissimis refocillata metum

metum è pectore depressisset. Antiquiores si repetamus, frequens apud illos hoc visum ostentum. De Ascanio *Virgilius* l. 2. *Æn.*

Ecce levis summo de verice visus Iuli

Fundere lumen apex, tactuq; innoxia molli

Lambere flamma comas. —

De Tullio Romanorum Rege consentiunt historiæ antiquæ conditores *Livius, Plinius, Florus, Valerius, Dionysius Halicarnassæus* aliq; numero plures; quum aliquando circa meridiem in regio thalamo consedisset, somnoq; esset oppressus, flammam è capite ejus emicuisse, nec prius totum caput flamma collucere desiisse, quam à Matre accurrente excitaretur. Bamba Gothorum Rex apud *Sabellicum* l. 1. c. 4. ad supremum Regni fastigium efferendus per flammam à capite adscendentem de sequuturi imperii omine procures Curia admonuit. Nolumus extera exempla cumulare, quia domestica occurrunt. Serenissimus Daniæ & Norwegiæ Princeps *Christianus V.* imperio patrio destinatus, non semel pectine capillos ad occiput reducens scintillas exsilire vidit, & præsentibus monstravit. Dignus tali omine Princeps imperio, nisi morte præventus inter æterna sidera omnibus virtutibus Heroë dignis coruscaus esset repositus, & avitum regnum Augustissimo Fratri, quo majorem Sol non vidit, ex publico singulorum voto, consignasset. Miraculorum autem

horum rationes Libr. de Luc. Anim. persequuti sumus.

HISTORIA XXXVIII.

Infans hirsutus & rugosus.

HOSPITA Hamburgenſis contumaci febre maligna laborans fruſtra conſilio Medicorum adhibitis medicamentis, quia gravidam ſe profitebatur, in ſpem venit illorum perſuaſione, à contumaci morbo liberam fore inſtante partu. Ultra definitum imprægnationis tempus cum procederet, molam ſuſpicati Medici, ſanguinem aliquoties detraxerunt, nihil remittente febrili ardore. Noſte quadam obortis parturientium doloribus vix marito perſuadere potuit febrem cauſanti, accerſendas eſſe mulieres & obſtetricem. His per ancillam convocatis brevi interpoſitâ morâ partum feliciter edidit, bis eodem die febrili paroxyſmo gravius redeunte, ſæpiuſque exinde recurrente. Editus infans toto corpore hirsutus erat, pilis digitum longis, rugoſa facie grandioſam ætatem mentiebatur. Triduo elapſo omnes pili deciderunt, nec ullæ in facie rugæ comparuerunt. Sanctè affirmavit Mater puerpera, ita immutatum fuiſſe infantem ut fœtum proprium non agnoſceret, niſi propriis oculis deciduos pilos vidiſſet, quotiens enim

enim novis fasciis involvebatur, totiens in fasciis lotio madidis pilos invenit. Interjectis aliquot mensibus convulsus obiit, sicut ad me perscripsit *H. Moinichen* Affinis & amicus dilectus. Quotidianum quidem est nuper natos leviter esse hirsutos, sed in tantam longitudinem incrementum, raris annumeramus. Copiam excrementorum indicant in morbose & febrili corpore prægnantium.

HISTORIA XXXIX.

Spasmus Periodicus.

UXOR Cupedinarii Hafniensis in difficili partu convulsionibus corripiebatur. Salvum tamen sanumq; foetum enixa est. Postea spasmi manuum pedumque quotidie recurrunt eodem fere horæ momento vespertino, quo primum in partu invaserant, servantq; statum istud tempus per pluscûlas hebdomadas, etiâ post quam à puerperio convaluit. Consultus ego dedi pulverem Marchionis in aqua hirudinum & ceraforû paroxysmo imminente circa vesperam in lecto sumendum, quo iteratis vicibus sumpto à spasmis liberata fuit.

HISTORIA XL.

Nattæ.

P*Aracelsus* l. de Apostem. c. 12. nattas aliquas cartilaginofas afferit, aliquas carnofas, & ligamentofas. De cartilaginofis valdè dubito, ex ipfo Nattarum termino. Succellu enim temporis putrefieri vult augmentoq; fuas membro vires deprædari. Nattæ pleræq; in carnofis partibus oriuntur, & cuti mobiles mollesq; inhærent. Partibus alimentum non fubtrahere observavi, præfertim in capite enatas, nec femper putrefieri, fed tamdiu partibus fuais inhærere, quamdiu vita eft. Avus meus maternus in occipite innoxie ultra 60. annos geftavit Nattam globofam, nudam, mollem & mobilem. Semel aperiri juffit, pus exiit. Rediit poft paulò, & exinde intactam femper reliquit. Hæreditario jure ad Matrem tranfiit eodem capitis loco eademque figura, quam, mollem licet, propter ætatem ingravellcentem exfcindere aufus non fum. Notavit *G. Horstius*. l. 4. Part. 2. Obf. 14. nattam in Jacobo Achermanno radicitus infra nucham feliciter ablatam fuiffe, fed femfim vifum hebetiorem factum, & augellcente indies malo omni penè videndi ufu privatum. Nuper erumpentes fi dentibus leviter comprimantur

Nattæ,

Nattæ, sensim marcescunt & pereunt. Quod bis observatum Patavij, semel in Nobili femina, cujus erumpentem nattam dentibus vicina mulier apprehendit, & semel in filia Sinclitici Jurisconsulti ibidem summi. Ita *Galenus* l. 14. Meth. c. 17. autor est Romæ quendam excogitasse quemadmodum acrochordonas & myrmecias ore sanaret. Has enim primum labiorum applicatione ceu suctu ad se trahebat, atque à radice evellebat, deinde primoribus apprehensas dentibus totas simul eximebat. Alij filo constringunt, intercipiuntq; nutrimenti affluxum, quo artificio verrucas alias tollunt. *Theophrastus* nominatus aluminis plumosi filo utitur in oleo de gilla prius madefacto. Aliam Nattam, quam *Alcola* vocat *Paracelsus* c. 15. in rustico vidi pomi magnitudine & figura ex labio oris superiore dependentem, quam primo aspectu putavi rosam esse rubram ore gestatam.

HISTORIA XII.

Terrore inductus morbus.

Terrore insperato & sanantur morbi & inducuntur. *Benivenius* Obs. Med. c. 62. ex horrore flammæ in febrem se incidisse fatetur. Novit præterea c. 63. puerum, qui visis duobus viris, nigris vestibus cælo subobscuris obvolutis, adæo perterritus est, ut toto corpore contremis-

D 5

cens,

cens, in admirabilem ægritudinem ac demum in mortem inciderit. Filius Matthiæ vespillonis quum ex angulo hypocausti tumorem parentis à Chirurgo obligari & curari prospiceret, tanto terrore est percussus, ut subito velut mortuus concideret, quem paroxysmum Epilepsiæ affinem sæpius exinde patitur aliquot annorum decursu. Ex improvise enim sive domi degat, sive in ludo literatio versetur, dolore corripitur ingenti, ut alta voce clamet, mox consternatus concidat & immotus jaceat. His symptomatis annorum tractu cessantibus, remansit tremulus brachii motus, quem commodis remediis tandem persanavi. Fuere qui alio terrore primum morbum depellendum suaserint. Nolui verò vulnus vulneri addere, nec salutem pueri incerta spe prostituere, quanquam Epilepticam noverrim tempore paroxysmi frigida largiter affusa præter expectationem perterritam convaluisse.

HISTORIA XLII.

Mors ex vulnere acus.

NUllum planè vulnus temerè est negligendum, nam ut rectè *Celsus* l. 5. c. 26. quod per se exiguum est malum, majus fit curantis negligentia. Malo suo id experiebatur mulier quædam, mihi visa, quæ ludentis pueri impulsu
acum

acum netoriam in genu admisit, quo vulnere exili spreto post triduum convulsa moriebatur. Nempe circa articulos tendinum nervorumque est concursus, quibus vel obiter punctis, convulsio metuenda. Idem evenerat sutori apud *Hippocratem* l. 5. Epid. §. 44. soleas veteramentarias suenti. Pupugit seipsum supra genu in femore, & ferme digitum immerisit. Illi quidem nullus sanguis effluxit (quia parte nervosa vulnus inflictum), ulcus verò citò clausum est: Femur autem totum in tumorem elevabatur. Tertia die mortuus est. Quid huic loco propter nervum magnum crus moventem subsit periculi, videsis *Vallesium* doctissimum Interpretem.

HISTORIA XLIII.

Linguae portentosa magnitudo.

IN oppido Drisna Marchiæ Brandenburgicæ, Frederico Singero fabro filius natus Nicolaus, prominente ex ore lingua primum nucis avellanæ magnitudine. Medici plurimi, inprimis Electoris Brandenburgici D. Ottho Bœticher, parentis auxilium implorantes, & ferrum ad linguae diminutionem expetentes, certo infecuturæ mortis metu deterrebant. Igitur in terrorem reliquis infantibus adolevit, & intuentibus horrorem, ut adæquaret vitili ses. quimestris

cor,

cor, quo Mater illius gravis ferebatur in macello à lanione per jocum percussa. Non impedivit crassa lingua loquelâ, quam perfectè formabat, licit gutture rauco. Narravit hæc mihi *Cl. Martinus Bogdanus*, amicus & auditor meus, qui olim puer in patria illum sæpius vidit nuces avellanas ad oris latera intrudentem, & dentibus maxillaribus confringentem. Magis tamen delectabatur pisces aridis, quæ ex repleta crumena omni tempore cuivis poscenti offerebat. Utebatur peculiari ollula, eaq; fistulosa, lateri oris admota, ad sitim levandam. Increcente Luna crescebat lingua, & continuo cruorem modicum fundebat ex dentium forsan allisu, vel buccis nimium dilatatis, vel linguæ distentione.

HISTORIA XLIV.

Cæcus Eruditus.

BENIGNAM Naturam meritò admiramur, quod unius partis defectum majori commodo compenset. Cæcus fertur *Homerus*. At quæ regio, quæ ora, qui locus Græciæ, quæ species formæ, quæ pugnae, quæ acies, quod remigium, qui motus hominum, qui ferarum, non ita depictus est, ut quæ ipse non viderit, nos ut videremus effecit, sicut de eo *Tullius* in *Tuscul.* loquitur. Cæcos novi eleganter instrumenta Musica pulsan-
santes.

santes. Alius lumine à nativitate cassus ludum Pythagoricum, vulgo schacchium, tam callebat accuratè, ut non tantum omnem artificio superaret, sed & fallentes deprehenderet. Tactu enim digitorum omnes calculos discernebat, & summam universi ludi animo suo complectebatur. Comes Mansfeldius visu destitutus, solo contactu candidum à nigro fertur distinxisse. Uldarichus Schonbergerus Philosophiæ Doctor nostra ætate omnium in se admirationem concitavit. Cæcus is singulari ingenio & diligentia id assequutus est, ut plurimis, quibus videndi felicitatem Natura concessit, palmam fecerit ambiguum. Enimverò linguas Latinam, Græcam, Ebræam & Syriacam eruditè callebat, naturæ arcana didicerat, promptus in Disputationibus Philosophicis & acutus, musicæ peritus, utriusque picturæ studiosus, & quod mirandum, sclopetum tam dextre explosit, ut à scopo non aberrarit. Nuperis annis Regiomonti Borussorum obiit, de quo inusitati exempli viro elegantem hanc Elegiam Cl. Simonis Dachj accepimus memoriæ posterorum dignissimam.

Sera patrum magno lectura volumine fastos

Posteritas lectis vix habitura fidem.

Post belli varios casus pacisque labores,

Regis & intrepidâ colla recisa manu,

Sarmaticos tandem venies si forte Borussos,

Quod stupeas etiam tempora nostra dabunt.

Schon-

*Schonbergerus id est, qui nostris cæcus Athenis
Vixit, & heu! mæsto funere raptus obit.
Hic utriusq; tener fit cassus luminis infans,
Accipit & gemino noctis in orbe chaos;
At, quem perpetuis damnat sors atra tenebris,
Hunc beat alterius lucis honore Deus.
Olli ter centum fixit sub pectore soles,
Atque oculis animi cernere cuncta dedit.
Quas habet aut cælum, quas aut mare, terrave, vidit
Naturæ varias ingeniosus opes.
Quid loquor Ausonia, quid Graja munera linguae?
Diceret hunc Syrus, & curtus Apella suum.
O quotiens docta stupefecit acumine Phæbum
Multiscio pandens pectore grande Sophos.
Vix usa est illo meliore juvena Magistro,
Tam quævis mirè dexter in arte fuit.
Atque ea si scimus tantum, quæ mente tenemus,
Quolibet hic verè judice doctus erat.
Adde quod argutas norat compingere chordas,
Et pulsanda manu nablia saepe dedit.
Non credenda loquor, sclopo retulisse brabeum
Trajecto solers eminus orbe fuit.
Hunc ubi seva nimis surreptum fata tulerunt,
Et Musæ & scissis flevit Apollo comis.
Illius ut vita, sic Prussia morte superbit,
Exuviis tanti nobilitata Viri.
Si dices aliis hæc turpia secula monstres,
Posteritas isthoc esse beata feres.*

HISTORIA XLV.

Splendores in Epilepticis.

LVx sæpe oculis Epilepticorum obversatur
omine sinistro. De quo *Hippocrates* l. 1. Præd.
& l. 2. Coac. Præn. in Convulsione: *Quibus con-*
vulsis oculi intente relucet, neque apud seipsos sunt
& diutius egrotant: Vidit id *Cælius Aurelianus* l. 1:
Tard. Pass. c. 4. de Epilepsia: *Circulos igneos cir-*
cumferri oculis sentiunt egrotantes. Ex oculis verti-
ginosæ mulieris scintillas emicare Patavii cum
Sala & Avantio observavimus. Ignei subinde glo-
buli prodire visi. Mulier quædã apud *M. Donatum*
l. 2. hist. Med. c. 8. Lauræ nomine, dum vena ipsi
aperiebatur, quendam in media parte capitis in-
terna crepitum, ac si vesica disrumperetur, per-
sentiit, ex quo in levem lipothymiam incidit,
qua levata maximo animi mœrore correpta est,
ac post aliquot dies globulũ igneum sibi videre
visã est, qui postea in maximam flammam ex-
crevit, ac deinceps melancholicis & Epilepticis
symptomatibus per intervalla vexata fuit. Ad
lucidos spiritus animales, hic condensatos & vi
ex nervis expressos, alibi culpam relegavimus.
Aliud mihi hujus ostenti exemplum nuper ad-
modum summisit *D. Joh. Frid. Treubler* Practicus
Bergensis & Amicus meus, lectorũ oculis haud
in-

indignum. Capitaneus Regiæ navis Bergis Norwegorum, Vir robustus, temperamento melancholico, cum Anno 1655. ineunte, deambulando lassus domum reverteretur, urinam excernere coactus fuit; inter mejendum verò splendores & coruscationes non sine stupore ante oculum sinistrū obversari sibi animadvertit, quibus evanescentibus putabat rem esse nullius momenti, si quidem ad pristinum statum oculus statim rediret. Eadem tamen hora per intervalla scintillas eisdemq; splendores intuebatur, & quasi Medusam aspiceret, stabat immotus trucibus oculis. Malum istud indies per duas hebdomadas sequentes adeò increvit, ut non splendores solum & scintillas, sed globulos igneos, ignisq; maximam quantitatem è phiala quasi effusam sibi videre visus sit. Multa adhibuit vulgi consilia, quod omnia ad veneficia referebat, donec convulsionibus Epilepticis adeò horrendis corriperetur, ut vix quatuor Viri robustissimi ad sustinendum illum sufficerent. Inter quas violentissimas commotiones vitam cum morte miserè commutavit.

HISTORIA XLVI.

Mammarum moles.

NImio subinde incremento augentur mammæ, quarum sororiente tumore, si
 intra

intra mediocritatis terminos substiterint, impensè juvenes delectantur. Ferunt Indicorum itinerum scriptores in Regno Senegæ, uxoribus mammas ad ventrem usque à maritis divelli, & in Insula Arnabonis nutricibus tam vastas esse mammas, ut ad terga reflecti possint. Mulier Helsingorensis primaria tam amplas & ponderosas non ita pridem mammas circumtulit, ut ad genua propenderent. Onerosam molem sedendo genubus suffulciebat. Conveniret his mamillæ *Martialis* l. 14. Epigr. 66.

Taurino poteras pectus constringere tergo,

Nam pellis mammas non capit ista tuas.

Antiquis enim moribus receptum fuit, fasciis mammillas constringere, ne nimium excrecerent, teste *Isidoro* l. 20. c. 32. *Nonio Marcello* l. de Vest. *Polluce* l. 7. 14. *Ovidi* l. 1. de Art. Am. *Martiale* alibi l. 14. Ep. 134. strophium vocat *Catullus* in Arg. & Punicam, Zonam *Ansonius* Epigr. 92. de zona Hermiones. Erantque ferè inter primæ notæ feminas purpureæ fasciæ papillares. Testatur enim *Iulius Capitolinus* Clodium Albinum purpurea matris illigatum esse fascia, quia forte lotæ atq; udæ essent ruffulæ, quas mater prægnans paraverat. *Apulejus* l. 2. Met. de Fortide: Rubea prænitente altiusculè sub ipsas papillas succintula. Orientalibus eadem fasciæ usitatæ Quo trahunt nonnulli *Ierem.* Proph. c. 2. v. 32. Græcis quoq; Medea enim venenû Jascni

E

præ-

præparatura odoratæ falciae imposuisse dicitur, qua ipsi ambrosium instringebatur pectus. Vi-
de *Apollon. Rhod.* l. 3. *Argon.* v. 866.

HISTORIA XLVII.

Monstrum sine oculis.

IN oppido Scaniae nostræ Væ, natum est monstrum parentibus honestis. Rectè omnia in partu successerant. Sed infanti nulli oculi erant. Bregma apertum colore rubicundo patulum. Nasus latus oblongusque, ex quo tumor protendebatur una parte osseus, altera carneus, cute reclusus, sine foraminibus. Os latum & deforme. Maxilla superior unico osse constare videbatur. Utraque manus sex digitis aucta, ut & pes sinister. Miserando continuoque ejulatu omnium in se misericordiam vertit donec exspiraret.

HISTORIA XLVII.

Abscessus post febrem.

IN convalescentibus ex morbo abscessus fieri *Hippocrati* credimus 4. *Aph.* 3 2. præsertim ad articulos & juxta maxillas, si præ cæteris laborarent doleantque. Idque ex cruditatibus in refectione congestis, ut ex *Aph.* 45. patet. Idem
per

per μετασυσιν materiæ morbificæ in febribus evenit, quæ non crisi, sed decubitu humorum solvuntur. Translatas vero humiditates peccantes illæ partes recipiunt, quæ imbecilliores. Vidi febres decubuisse ad pedes, ad fauces, ad universum corpus scabie infectum. Febre acuta correptus scriba Fridericiburgensis, eum delirio, convaluit; Sed quia sine crisi febris extincta, successit tumor brachii sinistri ingens durus cum calida intemperie & tendinum manus distentione, ut nullum articulum movere posset. Præmisso purgante, sudoriferis exhibitis, balneum injunxi emolliens & discutiens, hinc emplastra post balneum applicanda, quibus paulatim detumuit brachium, tendinum remanente obstinata duritie, quam ita crebro usu pinguedinis humanæ emollivi; ut restitutum in integrum fuerit brachium & ad motus actionesque expeditum.

HISTORIA XLIX.

Serum in sanguine glutinosum.

SERUM in sanguine contentum aquæ simplicis superat tenuitatem. Præter enim lympham nostram qua diluitur, partes crassiores habet admixtas, quod tali experimento didicimus. Serû in pelvi ex sanguine emissio sua sponte separatum lebeti seu vitro indidimus, suppositisque illi

E 2

ignitis

ignitis carbonibus vel huic calidis cineribus, fivimus aquosam humiditatem exhalare. Remansit tum gelatina densi glutinis instar, majori plerumque copia quam fuerat serum, nam bullis excitatis ampliores in pelvi & vitro locum occupabat. Difficile dictum est, quænam ista sit materia, quæ post evaporationem aquæ relinquitur, similis planè gelatinæ ex jusculis carnis bubulæ, caponis aliarumque rerum cordialium. In sanis & morbosis eadem facies, nisi quod colore variet pro vario hominis sanguinisque conditione. Quum idem prius facerent experimentum Patavii, putavit *D. Frigimelica*, insignis Gymnasii Doctor, serum in coctione secunda hepatis genitum non purum esse excrementum, sed plurimas partes heterogeneas & adhuc utilissimas contineri. At observationum nostrarum pressior interpret *D. Lyserus*, chyli portionem suspicatur, quæ in corde immutari subito non potuit, sed cum sanguine arterioso ex corde pervenit ad extremas partes. Certè ex Thoracicis nostris Lacteis, quibus chylus cordi per axillares infunditur ex prima cl. Pecqueti observatione, & sanguini miscetur, commoda foret sententia, præsertim quum glutinosa seri materies appositioni partium sit opportuna, & plurimæ partes sint huic humori magis amicæ, vel, si chylo quis nutriendi potestatem adimat, possent cum sanguine venoso ad cor redire ulterius

rius perficienda. Videtur tamen residua gelatina ex sanguinis perpetua aliqua parte esse accersenda, quia omni sero miscetur, tam sani quam ægri, tam jejuni quam palti. Quod id certius ad oculum pateret, sanguinem ex sano homine, aliumque ex febricitante detractum cineribus imponendum curavi, & vix ullam in utroque adverti differentiam, nam gelatina in omnibus seris post exhalationem aquæ remansit. At chylus nec in ægris tam copiosè, nec jejunis sanguini admiscetur. In febricitantibus & serum supernasare & gluten copiosum observavi. Similis quoque est hæc gelatina à sero divisa, glutinosæ crustæ quæ in sanguinis scorbuticorum, Cachecticorum, aliorumque superficie condensatur frequentissimè, pessimi habitus certissimo signo. Quidquid sit, sive pro pituita habenda est, sive chyli parte, dispiciant curiosi ocio abundantes. Dubium non est quin plus in recessu habeat serum, quam in fronte promittat.

HISTORIA L.

Ventriculi dolores periodici.

PRæter febres alii morbi periodos certas servant. Vidi enim 1654. periodicos ventriculi dolores in quamplurimis, qui sine febre alternis diebus recurrebant. Notavi idem in filiola mea, quæ alternis noctibus inquieta de ventriculo conquerebatur, quem soluta alvus vel-

lotium mitigabat nullo calore p. n. præfente. Post febrem in aliis similia observavi, per vices solitis paroxyfmi diebus folitaque febris hora redeunte dolore & naufea, nullo amplius febrili calore infefante, quos abftergentibus medicinis, jufculis citriatis & acetofis perfanavi. Eft quippe in febribus nonnullis ventriculus primario affectus ex obfervatione *Panaroli* Pentec. 1. Obf. 20. Pent. 4. Ob. 8. *Riverii* Cent. 2. Obf. 83. *Helmontii* Tum. Pef. p. 85. 22. *Diemerbrochi* l. 4. de Pef. Hift. 15. ut, extineta quamvis febre, ad fe membranofum corpus non poffit redire, nifi interpofita mora aliqua.

HISTORIA LI.

Anatome Embryonis XV Imenfe nati.

DE ftupro conquerebatur Lipfiæ Juvencula, à juvene benè nummato illato, & in jus hominem vocavit. Amici juvenis 17. annorum meretriculæ parum fidentes ob illatam injuriam, in carcerem ipfam conjiciunt. Illa indies tumidior ad partum terminum vifa eft accelfiffe, nec tamen fætum ullum enitebatur. Hinc molam fufpicatus Medicus expellentia præfcripfit, & tumido ventri Cataplafma ex fem. lini, &c. applicuit, quibus aliquamdiu ufa fexto decimo mense feliciter peperit fætum fed debilem, nec
ultra

ultra unum alterumve diem superstitiem. Caput infantis nucem juglandem vix superabat, tumor verò capiti superna parte adnatus erat, universo capite major, qui quotiens manu contrectabatur, totiens infans convulsionibus corripiebatur, Mortuo infante caput aperuit *D. Godfridus welsch* Anatomicus Lipsensis, amicus olim meus, invenitque in ipso cranio exiguum cerebri portionem, quam pro cerebello habuit, in tumore verò substantiam cerebro valdè similem. Hinc diuturnam istam in Utero matris moram ex vitiosa cerebri constitutione derivavit, qua impeditus fœtus & fractus subsidariam operam matri parturienti ferre non potuit, nisi forsan in calculo erravit femina, vel ut juvenem reum ludificaret, serius se ab alio subigi passa est.

HISTORIA LII.

Penis constricti periculum.

Puer quidam Hafniensis in ædibus civis urinæ incontinentiâ lectum permungebat somno sepultus. Ancilla ægrè ferens totiens lintamina esse mundanda & lavanda, inito cum puero, qui hospitis quoque sui iram & indignationem metuebat, consilio, constrinxit noctu penem tam arctis fili vinculis, ut urinæ profluvium sisteretur. Ita miser puer per aliquot dies constri-

ctus & quasi infibulatus, retento latio, tam sæva sensit symptomata & membri inflammationē, ut nisi maturè Chirurgus advocatus fuisset, ætuum esset de vita. Magno labore depressum tectumq; à tumido pene filum rescidit, quo soluto & lotio excreto ex faucibus orci rediit puer.

HISTORIA LIII.

Fungus maxillæ.

FUngi in maxilla à se curati historiam *Thomas Staffart* peritissimus Leidæ Chirurgus hac verborum serie ad me misit. Ante aliquot tempus ad me accessit Nobilis quidam Holsatus, nomine Joh. Wolff von Alfeldt, Toparcha in Hutten, cui in dextro latere colli magnus & valdè durus tumor, ejusdem coloris cum vicinis partibus, dolorisque expers erat, qui immediatè ab infima parte auris deorsum usque ad pectus Adami tendebat, à pollice parte circa musculum Levatorem scapulæ antrorsum ad Os jugale protensus, totam malam occupabat. Ejus magnitudo ad basin in ambitu erat paulo plus Ulnæ. Miser ille de sanitate sua sollicitus, postquam in Germania (ubi vitam militarem vixerat) Colonia ad Rhenum consilium & curationem à plurimis tam Medicis quam chirurgis rogaverat, tandem ad me (nescio quo fato) venit Leidam, idem à me petens. Ego sanè magnitudinem & duritiem
hujus

huius tumoris obstupui, sententiamque meam ipsi aperui, tumorem nempe causatum esse à materia petuitosa sensim ac paulatim ibi congesta & tādē indurata, meque spacio 14. dierum vel trium septimanarum tentaturum promissi quorsum tumor vergere vellet, quod Cataplasmatibus emollientibus feci. Transacto hoc tempore, tumor tam mollis & tractabilis factus est, instar phlegmones suppuratæ. Clarissimus atque Doctissimus D. Joan. Elemannus (cujus consilio in principio usus fui) mecum judicabat tumorem esse suppuratum & magnam sine dubio copiam puris eidem inesse. Quid actum est? Applicavi cauterium potentiale, deinde post aliquot horas incisionem per crustā feci, expectavimus ut pus abundē efflueret, sed nil nisi guttula una vel altera nigerrimi sanguinis exstillavit, in misso minimo digito in vulnus deprehendi tumorem in circuitu cavernosū & planē fungosum, post escharæ casum, fungosam substantiam longo temporis spacio medicamentis cathæreticis atq; septicis consumpsi; Verum circa guttur & collum aliqua durities satis profundē remansit, quam propter vicinitatem majorum vatorum colli ulterius attingere mihi tutum non videbatur. Postremo ulcere mundificato operam dedi citatricis inductioni, quæ tandem secuta, unā cum patiente meo DEO Opt. Max. gratias egi pro optato fine, & ille quam primum curatus erat, in Galliam se recepit.

HISTORIA LIV.

Manus exsiccata.

PAgus est in Selandia nostra Weiby, proximus fontibus S. Helenæ, in cujus templi sacello reconditur servaturque manus integra exsiccata cujusdā hominis priori seculo defuncti: Ferunt manum istam cum corpore reliquo consumi in busto & putrescere non potuisse, quia impia hac manu parentem filius verberaverat. Superstitio hæc multorum pectoribus dudum insedit. Testatur *Christophorus Vischer* in concionibus quum Wittebergæ literis operam navaret, in monte Apollinis tres digitos effossos fuisse, toto corpore corrupto & consumpto, ubi seniores ejusdem loci rustici affirmaverant, ante multos annos quendam qui pejeraverat ibidem sepultum fuisse. Plura exempla manuum, quæ parentes percusserant, & corruptis corporibus incorruptarū recenset *Kornmannus* de Mir. mort. c. 48. 49. 50. Quantum verò conjectura assequi potui cum præsens manū viderem, miki dubium non fuit calce viva exsiccata esse manū, quod color indicavit. Exsiccari hoc modo non manus tantum sed integra cadavera & absumpta humiditate à putredine conservari possunt, si viva calx ferali arcæ injiciatur. Novit id vulgus Patavinum,

tavinum, quod hybernis mensibus, ut cadavera suorum amicorum à scholaribus vindicet, simulac animam exhalarunt, calce viva aspersa ita exsiccat corpora defunctorum, ut ad sectiones Anatomicas prorsus reddantur inutilia.

HISTORIA LV.

Quartanae typus.

Quartana, scandalum illud Medicorum, ubi satis desævijt, & ægrum læto omine est relictura, varium typum induit, variasque formas Protei instar. Constans est & semper eodem tenore affligit si vel ad interitum vergit, vel gravioribus symptomatis, ut Hydropes, Phtisi &c. sui absentiam est compensatura. Variat verò vices, si salutis sit spes. Quartana laborabat consanguineus meus, statasq; diu servabat periodos. At tandem quum paroxysmus postero die exspectaretur, præter spem die priore invasit, sicque postero die liber & sequentibus evasit. In aliis non paucis, meæ curæ subiectis, observavi, quartanam ubi desitura est, quotidie per octiduum perseverare, tandemque post largam diarrhæam vel hæmorrhoides vel sudores terminari cum salute ægrorum. Ratio est, quod mota in corpore materia & sedibus suis discussa quotidie moveatur, & quacunque crisi naturæ facile tum expellatur, quod instante solstitio feliciter succedere expertus sum.

HISTORIA LVI.

Mors & flamma ex Vino adusto.

Vini adusti copiam obesse, malo suo plurimi experiuntur. Nam vel fervore suo adurit ventriculum & intestina, ut in flammam facile erumpat, vel accendēdo vitales in corde spiritus calorem suffocat, constringitq; vasa, unde syncope, vel per carotidas arterias in cerebrum delata & constringit ventriculum & vapore repleto Apoplexiam inducit. Prope aedes nostras nuper projectus homo summo mane mortuus reperiabatur. Tota nocta in vicina taberna vino adusto se ingurgitaverat, ut excesserit mensurā duarum pottarum nostrarum, unde ænopolio egressus in platea statim mortuus concidit. Præter modum alius mihi notus urgentibus compotatoribus spiritum vini hauserat, cui flamma extra fauces tantum extabat ut loqui nesciret, quam tamen assumpta frigida extinxit. Anno præterito extra portam Hafniensem repertus rusticus vino adusto obrutus, ex cujus collo flamma emicuit. Assueti huic symptomati & potationi rustici id consilij solent dare, ut ebrij situm supinum eligant, ut pateat flammæ exitus ne suffocentur, imminere enim suffocationis periculum si proni flammam cohibeant. Cum in Galliis versarer Lugduni ad confluentem Araris & Rhodani

Rhodani mulieris cujusdam cadaver sive nimio sp. Vini haustu, sive calidiore Theriaces aqua extincta, rationem mortis investigaturi Medici aparuerunt, & ingentem ex ventriculo flammam erumpentem observarunt, sed brevi interposita mora extinctam, narrante mihi *Renato Moreo* Medico Parisiense, Professore Regio meritissimo, & Magno amico nostro.

HISTORIA LVII.

Fragorum vis Diaphoretica.

FRAGARIÆ herbæ fructum non in deliciis tantum æstuanti stomacho cedere, sed & urinam potenti vi movere calculosque frangere sive per se comestum, sive in aquas resolutum cottidiana experientia didicimus, & testantur *Matthiolus*, *Dodonæus* & ferè omnes ad unum. Diaphoreticā verò fragorum virtutem ignorant quotquot de hac re consului. Tacent veteres in fructu hoc describendo valde parci, quia in Italia paucissimis notus fatente *Plinio* l. 21. c. 15. & de sola herba loquitur *Nicolaus Myrepsus* in Unguenti Martialis compositione sect. 3. cap. 46. & *Apulejus* l. de Virt. Herb. cap. 37. qui malè Comaron Græcis dici fragum notat, quum κόμαρες *Dioscoridi* l. 1. cap. 176. sit arbor cotoneæ malo non dissimilis. Rectius μικραίνυλον, ut *Plinius* l. 15. cap. 24. & ex Glossis *Clau. Salmasius*, nisi de

de fructus similitudine sola loquatur, quo sensu unedones & comaram & memecylon Græci appellant eodem *Plinio* authore. Recentiorum nullus aliam fragis inesse potestatem sudores movendi observavit. Qui tamen in urbe nostra Vir & candore & eruditione conspicuus, Affinitatis vinculo mihi conjunctissimus, suo exemplo fragorum auxit usum. Tamen enim largum illi sudorem provocare solent, ut quotiens sive in conviviis sive inter mensæ delicias hoc fructu vescatur, totiens rubentia exanthemata per universum corpus prorumpant, ut libentius grato alioquin fructu malit abstinere quam fœdatam maculis cutem experiri. Certè solent inter se commercium exercere Diuretica & Diaphoretica, quum in expellendo sero utraque occupentur. Nisi forsan singulari dissensu fraga aversetur laudatus Vir.

HISTORIA LVIII.

Spectra Funesta.

DE muliere lotrice Belia narrat *Diemerbroeckius* de Peste l. 4. hist. 6. prævidisse mortem uxoris Dimmeri de Raet, hoc pacto: Vidi, inquit, super tabulatum in domo illius ad portam magni cubiculi anterioris spiritum ejus sine capite, optimis vestibus indutum, & clavem portæ haud aliter manu tenentem quam si januam aperire

aperire voluisset. Quam spirituum visionem sibi familiarem & molestissimam esse testabatur, quorumcunq; verò spiritus sine capite videbat, illi omnes intra paucos menses moriebantur. Sunt multi in patria nostra, qui morituros in spectro videre se sancte affirmant, nulla alias superstitione irretiti. Familijs Principum quorundam Germaniæ familiare ferunt, instante funere, præcedere visionem spectri candido indufio velati. Pertinax paucis diebus antequam periret, fertur dixisse, se cum in vivariū inspiceret, in aqua umbram conspexisse, quæ gladio stricto mortem minabatur, autore *Sabellico* l. i. c. 4. P. Annio Tacito Imp. mortis prælagia fuere, quod jam mortuæ matris umbra ei apparuit, neq; sine horrore, diversa in specie loco q;, fratris manes, annotante post alios *Fulgios* l. i. c. 4. Ad fluvium arcis Finlandiæ, nova arx dictæ, spectra subinde apparere & imminente morte præfecti arcis vel militis alicujus citharædum per noctem in mediis undis ludentem conspici & audiri scribit *Olaus Magnus* l. 20. c. 19. 20. Domesticum exemplum verius narrabo, ne aliunde longius reptantur dubia. Nobilissima apud nos Virgo prævidere potest excusso semper somno, quotiescunque ex nobili illius familia, quocunq; locorum degat, aliquis est moriturus, cujus sexus vel mas vel femina, aliter enim apparet ipsi femina, aliter mas. Nunquam in hoc prælagio se falsam
præsentē

præfente & exempla certi eventus memorante Magnifico Reg. Maj. Cancellario *D. Christiano Thomæo*, inclyto Heroe, nulliq; fup̄ſtitioni aut mendacio favente, teſtata eſt, ſed apparentibus viſionibus angī ſe & turbārī, & optare à naturali hac ſibi quæſi connata poteſtate liberārī. De fide igitur dubitare non poſſumus, quia vigilantes & vident & narrant. Socrati olim ſuus genius ſeu Dæmon adfuit amicus & futuri præſcius, comes vitæ invidius, mentisq; illius hoſpes, de quo elegāter diſſerunt *Apulejus* l. de Deo Socrat. *Max. Tyrius* Diſſert. Phil. 26. 27. & Platonici omnes, qui medium inter Deum & homines crediderunt, fuſè reſutati à *B. Auguſtino* l. 8. & l. 9. de Civ. Dei. Certè Chriſtiani, præter Angelos, ductum ſcripturæ ſacræ ſequuti, ignorant alios ſeu genios ſeu dæmones Platonicos. De aliis præſagiis quæ vigilātibus excidunt divina inſpiratione *Iamblichus* de *Myſt. ait: Animos verè præſagientes, aſſatosque, & quum dormire videntur, non dormire; & quum vigilare, non propriè vigilare, neque more hominum ſenſibus uti.*

HISTORIA LIX.

Noxius prægnantibus annus.

D*ionifius Halicarnaffeus* l. 4. Hiſt. Rom. annoravit quadam peſte duntaxat virgines & gravidis

gravidas correptas fuisse. Sunt quippe habitu teneriore & molliore ad resistendum veneno imbecilliores. Primis Anni 1654. mensibus satis calidis post æstatem æstuantem, Hafniæ ple-riſque prægnantibus malè cessit graviditas, calidioris cœli vitio. Petechiis enim plurimi occubuerunt, & gravidarum periculum sequuturam pestilentiam præſagiebat. Infectus certe & intemperie quacunq; vitiatuſ aer à Matre attractuſ facillime tenellum fœtuſ vel in utero enecat ſuffocatq; vel, ſi robuſtior ut inquinatuſ ſibiq; noxiuſ aerem fugiat, ante ſtatuſ tempuſ expellit. Hinc aliæ prægnanteſ ea hyeme primis menſibus abortiverunt, aliquæ poſtremis magno propriæ vitæ diſcrimine. Aliæ petechiis infectæ unâ cum fœtu exſpirarunt, aliæ Epilepſia convulſæ, quæ ſine intermiſſione miſeraſ comprehendens paucarum horarum ſpacio è medio ſuſtulit. Detestanda verò nonnullarum fuit religio, quod Matre petechiis vel Epilepſia extinctâ, fœtu in utero ſuperſtite & diutiſſimè ſe volutante, ſectiõnem tamen Cæſaream intermiſcerint, adeoque rudibuſ adhuc & ſimplicibuſ animiſ abnegarunt lucem non à ſe datam, ut loquitur *Lactantiuſ* l. de Ver. cult. c. 20.

HISTORIA LX.

Pestilentia magna 1654.

PEtechiales febres hyeme grassantes excepit
sensim veris initio & tora æstate pestilentia
ingens; quæ supra 9000. funera Hafniæ procu-
ravit. Contagio ad nos disseminato per naves
Holland. quæ Gedani frumento, cannabe, lino,
&c. onustæ ob classis Anglicanæ metum se in
portum nostrum receperant, ex nautis hospi-
tio receptis aliquot extincti. Expositæ vestes
in solatu tangentes pueros infecerunt, latiusque
deinde serpente lue universam urbem occupa-
vit, & vicinos pagos, quocunque vel vestes de-
mortuorum vel chartæ vel alia essent delata.
Pani quoque inhæsit venenum ex infectis ædi-
bus exportato, vino adusto & similibus. La-
ctantes multæ infantibus contagium fugendum
præbuerunt, ipsæ superstites. Multi iisdem ve-
stimentis inclusi, quæ infecti exuerant, salvi e-
vaserunt, alii audaciæ pœnas morte luebant. No-
tatum verò plures feminas juvenculas, gravi-
das, virgines, nuper nupras, & pueros pueraque
sublatas quam viros senesque plebejos plures,
qui infectorum consortium non vitarunt, quam
patricios. Paroxysmus magno rigore plerumq;
invasit, sequenti dolores dorso & capitis cum æstu
magno,

magno, tum dolor cruris sinistri, interdum hydatides in planta pedis, quibus recedentibus, veneno cor occupante, apparuere exanthemata lethalia, quibus erumpentibus sedatus omnis dolor ad extremum spiritum, ut non pauci fuerint qui & promptè ambulaverint & ipsos se arca ferali incluserint. Tertio hi ferè die moriebantur. Quantum suspicor veneno narcotica vis inerat, quæ doloris sensum sopivit. Bubonibus verò in inguine apparentibus, aliqua subinde salutis affulsit spes, quæ decollavit, si modò prorrumperent modò recederent, natura in protrudendo succumbente. In pagis vicinis tanto correpti peste delirio vexabantur, ut ipsos se aquis immerferint & suffocaverint, imò laqueis & cultris vitæ sibi filum abruperint. Pauci infectorū convaluerunt, nisi exhibitis statim sine mora repetitisq; Alexipharmacis sudores confertim moventibus. Profuit plurimis Elixir Pestilentielle Tychonis Brahæi quod in officinis nostris in frequenti est usu, præter alia à Medicis Hafnienfibus in publico consilio præscripta. Vespillones fune pice illito, odoris gratia, se immunes conservarunt.

HISTORIA LXI.

Vomitus sanguinis lethalis.

Studiosus Hafnienfis temperamento melancholico præditus, post longas splenis inveterationem

teratasque obstructions, evomuit magnam sanguinis copiam, & per inferiora parem cruoris mensuram. Non fallax erat suspicio, referatum esse vas breve, & per ventriculum exoneratum esse lienem. Consilio D. Wormii, quem creptum nobis seridè deploramus, ad cohibendum fluxum sumpsit syrupum symphyti, quo sanguis fuit ex voto suppressus. Empiricus togatus majori salutis promisso, suavitè oleum Hypericonis, quo assumpto fluxus sanguinis αὖτις & καὶ πάλιν tam copiosus rediit, ut convelleretur. Suspectus enim in sanguinis fluxu oleorum est usus, quod orificia venarum referent magis quam adstringant. Unde oleum amygdalarum omnibus vomituriis denegat *Aloys. Mundella dial. 1. f. 4.* Et in dysenteria clysteribus miscenda non esse olea *Rondeletius* docuit, alique à cl. *Rhodio* in *Analest. Septal.* magno judicio collecti. Tandem igitur paucarum hebdomadum lapsu, recrudescente malo, viribus fractus, purpuream animam citissimè evomuit.

HISTORIA LXII.

Amuleta elusa.

A Muletorum grande apud plurimos est precium. Sæpius tamen fallunt, & supersticiosos eludunt. De characteribus loquor & literis, quæ ad sanitatem nihil conferunt, corporibus

ribus appensæ, nec ad fortunas. Ægritudine correptus Hafniæ mercator Islandicus præter Medicum expertum, furtim usus est opera Monachi Empirici. Gestabat ille secum ægros revisurus in pyxide globulos, quibus instructus omnia sibi ex sententia prospera ominabatur. Clanculum famulus mercatoris globulum surripuit. ut hujus amuleti experiretur certitudinem. Reversus fortè servus, negociis heri non rectè curatis, eodem die misere à Domino vapulabat, unde diris execratus est impostorem. Interrogatus quid causæ haberet maledicendi, globulum produxit, quo tutum se credebat. Contextus is erat ex bombyce, ubi charta convoluta latebat verbis S. Johannis signata : *In principia erat verbum.* Ita amuletum preciosum Clerici laicus elusit. Felicior tutiorque est illorum amuletorum usus, quæ vi sua naturali morbis resistunt. Externa licet, vaporum tamen specie & atomorum sive per respirationem sive patulos cutis poros attrahuntur. Ita radix Pœoniæ, ungula alcis, aliaque usu probata collo Epilepticorum appensa convulsiones sedant. Carpis manuum telæ araneæ, fuligo, succus citri, aceta varia, &c. applicita febrilem æstum solent extinguere. Fœtida hystericis profunt. Pulvis bufonis ad urinæ incontinentiam laudatur, & mille alia sunt Amuleta quorum virtus passim consensu Medicorum feliciter innotuit.

HISTORIA LXIII.

Arthritis menstrua.

PRidie quam menses consueti fluant honestissimæ mulieri juveniculæ meæ fidei commissæ, post Chronicum splenis morbum, incredibiles artuum dolores excitantur, qui brachia primum invadunt inprimis sinistrum, per vices ad dextrum recurrentes, deinde pedes tanta occupant acerbitate, ut nulla dolorum intensissimorum sit intermissio. Infestant illi præsertim articulos omnes, chiragramque & podagram & gonagram specie simili mentiuntur. Exasperantur fomentis calidis, nec ullum levamen nisi à Theriacæ inunctione, quam pro doloribus sedandis peropportunam suasi. Mensibus verò supervenientibus, omninò, quasi illuc translata dolorum materia, cessant.

HISTORIA LXIV.

Scroti Tumor.

CUM Pastor in Vemminghoy spineam sepe transcendere, à spinis sepius ita scrotum & testiculi læsi fuerunt, ut dolor ingens & inflammatio partes illas divexarit. Empiricorum

rum variis remediis omnia in pejus ruebant. Tertio inde anno ulterioris mali metu Chirur- gum nostrum exercitatum Martinum Sixium advocat. Scrotum tum videbatur pellucidum, humidumque excedere caput. Loco scroti com- modo corrosivum applicat, tum inductam es- charam scalpello aperit, tandem aquæ flavæ croci instar ad t̄b vj effluerunt. Frustulum scroti magnitudine Thaleri Imperialis excidit, ut ea parte nudi dependerent testiculi. Exacto trimestri tam benè restitutus est, ut liberis ope- ram dare potuerit.

HISTORIA LXV.

Apostema spinæ.

Generoso in patria Viro apostema ingens in spina dorsi obortum. Barbitonfor imperitus scalpello apostema aperuit supra affectam par- rem, quæ nisi compressa nihil liquoris emitte- bat, hinc stagnans materia ossa corrodingo fi- stulam spithamæ longitudine excitavit. Adhi- biti postea in consilium D. *Nicolaus Fossius* Medi- cus in Scania felicissimus, & *Martinus Sixius* Chi- rurgus urbis dexterrimus, cauterium potentia- le affecto loco imponunt. Apparuerunt post e- scharam ossa nigra, quibus abrasis, & nitori suo restitutis ossibus, vulnus curabatur Sarcoticis & Emplasticis. Residuum adhuc erat in vul-

nere punctulum aciculæ caput vix superans, ex quo sanguis liberalius fluxit, nec ante sextum diem sisti potuit, tumque inducta cute convaleuit æger generosus.

HISTORIA LXVI.

Transplantatio Morborum.

MAgnum Naturæ pando mysterium. Transplantatio morborum, stupendum est remedium, quo ægrotudines hujus vel illius transferuntur vel in animal brutum, vel in alium hominem, vel in rem inanimatam. Superstitiosa quidem plurimis videtur curatio, sed, si quidem naturalia adhibentur remedia nulla concurrente superstitione aut verbis aut characteribus, aut gestibus, quanquam non semper manca mortaliū mens rationem assequatur, damnare non ausim quod experientia plures comprobarunt. In sacris vestigia quædam Transplantationis hujus observo, quanquam miraculosæ, de agno apud Moysen & porcis in Evangelio. Primus is modus est transplantationis morborum in animalia bruta. Nonnulli Phthisicos sanant, evacuato ex brachiis ægrorum sanguine, & gallo galinaceo propinato. *Flud* Anglus podagrâ cujusdā in cane familiari, quo cum dormiebat, fertur transplantasse, qua deinde torquebatur canis certis periodis, quemadmodum ante dominus. Sanguine

guine ex medianâ ægrotantis extracto, ovi gal-
linacei testæ artificiosè iucto, & deinde ovo
gallinæ per 14. dies supposito, postmodum fa-
melicæ exhibito; iæterum, morbosque quos-
cunque ex Scorbuto, Cachexia, Hydrope orto
abolere apud multos innotuit. Sunt apud nos
qui experti sint, morbos plerosq; curari si rescisi
ungues ex manibus pedibusq; ægrorum alligen-
tur pisci vivo & in mare demittatur piscis. De
hominibus alij fide digni observarunt, strumas
aliosq; tumores aboleri, si pars affecta affricetur
ad manum cadaveris humani, ita enim sensim
evanescere tumores prout sensim putrescit ca-
daver, quod tardius hyeme, æstate citius con-
tingit. Frequetior tertia species Transplantatio-
nis in res inanimas quascunq; in folia sæpe ve-
tulæ Calabricæ morbos transferebant, ut mihi
testabantur. *P. Castellus* Clarissimus Messanæ Me-
dicus expertus est, hæmorrhoides si tangantur
ruberofa radice Chondrillæ, ficcari si chondrilla
ficcetur, corrumpi verò si corrumpatur, quare
sub camino exsiccandam suadet. Periam sangui-
ne imbutam sub cineribus calidis positâ men-
ses sistere scribit *Panayolus* in fascicul. Arcan.
Duplex scirrhi lienis curati sympatheticum
remedium describit *10. Bapt. Sitonius* Jatroscoph.
Miscell. tract. 29. Prius est, si trium vel quin-
que noctium urina ab ægro schirrhum lienis
patiente micta singulis auroris cum suffi-

ciente cineris communis quantitate commisceatur, solisque radiis siccandum quotidie exponatur totum mixtum illud ex urina & cinere, donec exsiccatione peracta tota massa igni domestico apponatur, & dissolvi paulatim ex se permittatur, quia massæ illius dissolutione perfecta dissolutum esse volunt & scirrhum. Secundum autem sit; si ex urina scirrhum patientis hominis phiala vitrea impleatur, stuppaque lini vel cannabis, aut communi papyro clausa humi sepeliatur ab homine jejuno, & ibi dimittatur quousque tota absumpta sit urina, qui illa consumpta urina consumptum dicunt scirrhum. Generosus quidā Vir in patria nostra ad febrem aliud secretum mihi communicavit, quod succedere in propria uxore expertus est. Ovum in urina ægræ instante paroxysmo excreto ebulliat, donec omnis humiditas sit absumpta: Tum excorticatum ovum sterquilinio immittatur, & quam citò à formicis consumitur, tam promptè febris cessat. Lues Venerea & canceri persanari dicuntur, si baltheus Mercurio illitus corporiq; applicitus profundè in terram demergatur. Ad quartanam alii hoc commendant: Ægri urina in olla nova excipiat, misceaturque illi farina ex filigine & in pulvem redigatur. Puls arbori seu ceraso seu alij illinatur, ut avibus cedat in prædam, tantum enim quartanæ decedet quantum ex pulve aves comederint. Sunt, teste

Scrodera

Scrodero l. 5. Pharm. Med. Chy. class. 1. §. 23. qui ad quartanū capillos patientis cum aliis in corpore dispersis pilis permixto ovo imponūt, driter coquant & avibus deglutienda objiciunt, qua ratione quartanā curatum iri volunt. Lardo perfricatas verrucas, postea in terram defosso, evanuisse experta mihi mulier retulit. Idem sua experientia confirmat *Verulamius* Cent. Jo. Sylv. hist. 997. puer enim admodum in digito verrucam habuit, circa annum ætatis suæ decimum sextum cum Parisiis degeret, sensim in utraque manu subnascentibus pluribus, ad minimum centum mensis spacio. Angli Oratoris uxor, femina minime superstitiosa dixit quodā die, velle se quicquid verrucarum manus fœdabat, tollere. Post accepit lardi particulam, pelle non exutam, cujus pinguedine illevit omnes verrucas, & inter eas quæ pene ipsi eo usq; fuerat coæva. Clavo deinde affixam lardi particulam ad postem fenestræ cubiculi sui quod meridiem spectabat, soli exposuit putrefaciendam. Successus fuit, quod omnes verrucæ intre septē menses prorsus evanuerunt, etiam illa quæ reliquas ætate anteibat. Exemplum habet *Salmuth* Cent. 3. Obs. 34. intensissimi doloris brachij per transplantationem sublato. Corallos enim rubros cum foliis quercus contusos partique affectæ ad supputationem usque impositos, in foramen in radice quercus orientem versus spectantis

tis mane terebrâ factum immittebant, & cuneo ex eadem arbore obturabant. Dolor inde planè cessavit, & cum refoderetur amuletum exemplò cruciatus sæviores recurrebant. Ramum salicis dentibus scorbuticorum alij affricant, & fumo camini exponunt, ut cum rami exsiccatione sanentur dentes. Nihil tritius, quam fascias ægrorum patibulis suspendi, quod Transplantationis beneficium est, si succedat. Hydropicos vesica bibula ægrotantis lotio repletâ in furno fumante aliquandiu suspensâ, & deinde effuso lotio, ac vesica in Cloacam conjecta, detumescere narrat *10. Löselius* de podagr. Sect. 2. Membr. 2. Art. 2. Subl. 5. ubi & transplantatoriam artem Podagræ incipientis ita describit: Ægropilos in utroque crure novacula demunt, & insimul ungues manuum pedumque statotempore, vere scilicet, arboribus de integro succum recipientibus & quidem propriè ante novilunium, rescant, post terebrâ, in populo albâ, vel quercu virescente, foramine facto, ad medullosam usque arboris partem, unguium segmina & pilorum filamenta in locum excavatum, nullo segestri adhibito, transportant, foramine ligneolo, ex arboris cujusdam ramulo fabricato, accuratè & profundè clauso. Ligneoli propendens particula proximè arborem securi amputatur, & admoto fimo vaccino saucia ligni pars propediem optimè deligatur. Quod si trimestri

mestri spacio malum podagricū haud recurrat, arborem magneticā virtute efficacissimā arguit. Similis huic Transplantationi est balneum lactis, quo se non ita pridem Nobilis femina cimbrica immerferat occulto morbo laborans, quod lac porcis exhibitum, omnes enecabat, ægra convalescente. Plura passim occurrunt hujus curationis exempla, quæ miraculis sunt vicina, quia à communi ratione recedunt. Multi tamen in Natura sunt effectus, quorum causas nemo assequitur, nisi qui fecit. Occultæ sunt & magneticæ in mundo virtutes, quibus etiam diffita invicem alunt commercium. Ita Unguento armario vulnera absētia sanantur, si cruoris tantū guttula ex vulnere telis vel linteis insidiat. Et quæcunque ex corpore vivente prodeunt, longius quanquam separentur, occulta sympathia feruntur ad suam originem, & tacita attrahunt. Non negandum tamen sæpe casu succēssisse in exemplis allatis felicem eventum, sæpe nullum. Nos limites Naturæ non figimus, nec prorsus damnamus quæ imperita ratio non percipit, *quasi verò mensuram ullius rei possit agere, qui sui nesciat*, ut eleganter Plinius l. 2. c. 1.

HISTORIA LXVII.

Anatome Cachectici.

DN. Trenti Nobilis Patavini cadaver, me præsentē, apertum fuit, qui diuturno morbo
Ca-

Cachectico ad hydropem vergere videbatur. De eo contulerant consilia Maximi Medici *Io. Dom. Sala & Benedictus Sylvaticus* Præceptores mei, quorum hic abscessum in hepate, ille in corde divinabat, quia plerumq; in lentibus huiusmodi morbis ad cachexiam vergentibus, cordis aliquis solet esse abscessus, & pulsus in hoc erat interceptus. Cor tamen in aperto cadavere nihil noxæ contraxerat. Hepar pallidum, quasi coctum, lien verò rubicundus sani hepatis instar. Pulmonum sinister inflammatus & ferè putridus.

HISTORIA LXVIII.

Anatome febris malignæ.

Joh. Jacobus Heilmannus Medicus & Chymicus Doctissimus, historiam retulit de quodam febre maligna apud Germanos laborante; cujus nasi extremitatem rubra quædam macula obsederat, symptomatis benignum quid portendentibus, nec cibi appetitu planè dejecto, unde certam recuperandæ salutis spem æger conceperat; Sed nox obitum præcedens sinistra portendebat, omnia quippe in deterius ruebât, ignisque quidam internus viscera comburebat, cujus ardorem externo ac culinario igni nihil cedere ajebat, donec latius serpente veneno miserimam

ferrimam vitam cum felici morte commutaret. Dissecto cadavere omnia viscera nigricantia erāt & sphacelata, quin & ipse ventriculus adeò computruerat, ut sine ruptura & læsione digitis attrectari nequiverit, quocunque enim digitorum attactu disrumpebatur, cavitasq; relinquebatur manifesta. Id ex Heilmanni relatione ad me perscripsit *Henricus à Moinichen*, rerum Medicarum & Anatomies peritus.

HISTORIA LXIX.

Cliteris offeus.

SPernendæ exilitatis in junioribus Clitoris conspicitur, nec multum auctior in adultis, sæpe tamen membri virilis æmulatur longitudinem. *Tulpius* notat in femina animi virilis dimidiatum digitum æquasse, ut se feminis aliis viri instar misceret. *Platerus* ad colli anserini magnitudinem excrevisse observavit. Venetiis scortum erat Italis quibusdam meis amicis satis notum & familiare, cujus clitoris offeus extans amafios in amplexu impediēbat lædebatque ut sæpius inflammatione oborta Chirurgorum imploraverint auxilium, à multis tamen visitabatur ob formæ elegantiam haud cottidianam.

HISTO-

HISTORIA LXX.

Mulier splendens.

CUM in Italia, orbis Paradiso, versarer, Matronæ Veronenfis summa cutis vel leviter tacta scintillas manifestè ejaculabatur. Dignum curiosorum indagine spectaculum fideliter orbi publico scripto exposuit *Petrus à Castro* Medicus Veronenfis eruditissimus, edito de Igne Lambente libello, quem in hujus historiæ filio pertexendo sequar. Illustrissima Domina *Cassandra Buri*, Ill. Jo. Francisci Rambaldi Patritij Veronenfis uxor, ætatis consistentis, corporis habitu mediocri, universalis temperaturæ calidæ & humidæ, hepatis calidioris sicciorisque, adeoq; bilioso atroque sanguine abundantis ab innato fervore, aduisione, ætate proportionata & animi mœrentis pathematis vehementibus procreato. Hanc Nobilem Matronam eo prærogativæ dignitatis & stupendæ Naturæ signo signavit Creator, ut quotiens leviter linteo corpus tetigerit, scintillæ ex artubus copiosè profilient cunctis domesticis conspicuæ, non secus ac si é filice excuterentur, comitatæ etiam stridore omnibus audito. Sæpe ducta manus per indusij manicam scintillas excipientem, observavit flammam caudato radio ad instar accensarum

farum exhalationum decurrentem, à qua sæpe delusæ ancillæ ignem se intra stragula lintea ingessisse per incuriam cum cubile hyemali tempore frigidiori de more calèfacerent, quo tempore etiam copiosiores & clariores micant scintillæ, cum metu arbitrantur. Ignis autem iste non nisi noctu aut obscuro loco in morem luminum nostrorum, cernebatur, nec extra se urebat, quamvis materia suggereretur, ad inflammationem promptissima, nec denique ut alij fulgores ad certi temporis mensuram desinebat, sed eadem lucentis facie adhuc effulgebat post meum ex Italia discessum. Plura in hanc rem exempla l. 1. de *Luc. Anim.* c. 19. adduxi, causasque singulorum *Lib. 3.* fusius exposui.

HISTORIA LXXI.

Impotentia ex Incantamento.

Incantamentis ad conjugium ineptos reddi novos nuptos vulgo notum. Ligationem ligulæ vocant, quam Striges creduntur nodonectere nuptiarum die. Refert *Bodinus*, esse formas nodandæ ligulæ amplius quinquaginta, sive ad virum conjugatum impediendum, sive ad mulierem solam, plerumq; tamen virum illigari vix mulierem: Ligari autè posse in diem unum, in annum, in æternum, aut quantisper duratura esset ligula, nisi solverentur. Antiquis notum

G

incanta-

Incantamentum & recentioribus. Amasis Ægypti Rex apud *Herodotum* victus fertur & impeditus ne rem haberet cum Laodice uxore sua. P. *Æmilius* in vit. Clotarii secundi testatur Concubinas Theodorici Regis iisdem ligamentis adversus Hermambergam esse usas. *Codronchiur* l. 23. de Venef. c. 5. refert de juvene marito, quum diu rem cum puella habuisset, eamque deferere vellet, virilitatis damna meruisse ereptæ. Communicato cum vetula consilio, id remedij didicit, ut sive minis sive blandi alloquio & promissis, suspectam sibi puellam cogeret reddere amissum. Exsequutus consilium, cum promissis nullis persuadere puellam posset, arrepto fune non ante à suffocatione destitit, quam illa, immissa in loculos Viri manu, veneficiu auferret. *Beverovicus* in Thes. Morb. c. 18. affirmat in Gallia esse frequentes ligationes, idque *Cl. Salmasium* variis exemplis confirmasse. Præsertim apud Santones & in Gasconia artificio isto inducitur sæpe languor tempore matrimonij, vocaturque Gasconibus *noüer l'eguilette*. Apud nos decurtatum cuidam sponso à sagis virile membrum, ut proflus carere eo videretur. Alii Sponso viduo simile damnum die sponsaliorum minabatur ancilla, quæ spe matrimonij exciderat, edocta enim per vetulam sacro copulationis cœtui immiscuit, seramq; non constrictam in marsupio secum asportavit. Mox pastore verba copulationis

ria pronunciante seram constrinxit, virilitati sponsi nocitura. Re ab astantibus audita, advocato consilij authore, inflictaq; alapa ad hæmorrhagiam (ita enim vim omnem incantamentorum eludi credunt), compulerunt seram aperire, ut extra periculum sponsus esset. Aliis usitatus ramus quercinus ad rectum angulum sursum incurvatus, quem terræ lotio sponsi madidæ infligunt. *Fernelius* plenus fide, compertum sibi testatur l. 2. de Abd. Causis c. 16. magos, sagas, forcilegas, incantamentis nonnullos ita vinxisse, ut cum sola uxore non concumberent: alios concubitus impotentes quasi exectos reddidisse, alios in corporis extenuationem viriumq; imbecillitatem cum lāguore summo traxisse, quos solæ quæ inflixerant, precibus & muneribus restituere possent. *Codronchius* l. 3. de venef. variis exemplis probat genitalia per veneficia posse decurtari, sed videri tantum, non reapse fieri. Certè revera fieri Sponsæ quærunter & experiuntur. Causa autem supranaturalis, à Dæmone DEI permissu inducta in generis humani ludibrium. Execrabile maleficiū suo autore dignum, etsi quandoq; sine expressa conventionē & societate cum Diabolo inita committatur, actionem nihilominus esse diabolicam & supplicio capitali dignam decernit 10. *Georg. Godelmannus* J.C. l. 1. de Incant. c. 6. Mirior est *Verulamius* naturæ additissimus, qui Cent. 10. Sylv.

Hist. 888. 959. si non excedit naturam, vim habere suspicatur ex imaginatione ligātis membrum virile. Putat verò illud ab incantatione alienum esse, quia non à certis tantum personis, quales incantatores, sed à quolibet in Gasconia fieri potest. In nodi solutione impium foret ad artes Diabolicas recurrere, quemadmodum Amasis carminibus solutus fuit, & *Paracelsus* monstrosi characteribus & barbaris nominibus in membrana nova scriptis amissas maritorum vires revocavit. Præstat in quibusdam sequi decretum *Hincmari* Rhemensis Archiepiscopi *Part. 2. Decret. Caus. 3 2. quæst. 1. cap. 4. Si per sortiarias, atque maleficas occulto, sed nunquam injusto Dei judicio permittente, & Diabolo preparante, concubitus non sequitur, hortandi sunt quibus ista eveniunt, ut corde contrito & spiritu humiliato Deo & sacerdoti de peccatis suis duram confessionem faciant, & profusis lacrymis &c. Deo satis faciant.* Possunt & addi naturæ haud adversa remedia, quibus ab incantamentis inductæ ægritudines debellantur, Deo contra naturæ hostem conatibus remediorum benignè aspirante. *Carichterus* hujusmodi incantationes curavit mingendo per scopas betulæ. Potum seu cerevisiam in quâ betula cocta, mirè depredicat *Helmôtius de Lithia. c. 28. § 25.* Sponsus enim quidam ligatus per menses quinque ne sponsam suam attingeret, pedissequam interea imprægnavit. Postmodum, exortis inter desponsatos jurgiis,

jurgiis, dixit sponsa, se nefas cum pedissequa dis-
simulasse, ut exploraret, an frigidus, an verò ma-
leficiatus esset, & quo titulo divortium tenta-
ret. Tandem, soluta est ligationis incantatio per
potum præfatæ cerevisiæ, repertusq; est malefi-
ciatus, non autem frigidus. Remediis naturali-
bus veneficia percurari *Carichterus* c. 12. l. 2. do-
cuit, & in puella expertus est *Henr. ab Heer*
Obs. 8. Ex dente mortui suffumigium depellere
sponsorum impotentiam ex ligamine *Pæde-*
montanus in memorabilibus annotavit. Fœtida
enim his profunt.

HISTORIA LXXII.

Tubercula in facie.

Nobilis in Dania femina curæ Paternæ sub-
jecta miro quodam implicabatur affectu.
Nam per inordinata dierum intervalla erumpe-
bant in cute corporis nodi parvi magniq; juglā-
dium instar, facies intumuit, præsertim oculi &
collum, fuereq; nodi isti rubri. Causa videbatur
suppressus mensium fluxus, quatuor subinde
mensibus subsistens, nec satis bene lien & hepar
calidum valebant. Secta illi fuit vena, postea
Extracto Panchymagogo purgata, tum cucur-
bitulæ scarificatæ humeris genuq; applicatæ, &
sanguis aqueus extractus. Ad temperandos calo-
res internos Tabellis refrigerantibus usa, & ad
fluxum

fluxum revocandum secta vena malleoli, propinata denique menstrua ciente potione *Quercetani*: post paulò subductæ ex facie maculæ & cum menstruo sanguine sanitas postliminio rediit.

HISTORIA LXXIII.

Error in Pleuritide.

CEnturio quidam Danus stipendium Serenissimi Regis merens, de punctura lateris molesta conqueritur. Advocatus barbitonfor colicam suspicatus exhibet purgantem medicinam, qua per biduum adeò concitata fuit alvus, ut tandem copiosus sanguis *æta* fluxerit, jamque vix spiritum trahens mutato consilio Medici operam implorat, qui diligentius singula expendens Pleuritide laborare videt monetque. Statim vena illi secta. Sequutum deinde per sputum pus laudabile. Inde sublevatus convaluit.

HISTORIA LXXIV.

Suspensum urinae annulare.

CIvis Patavinus, qui in castris Venetis contra Pontificem militum cohorti præfuerat, febre maligna correptus utinam turbidam reddidit. Postridie cum summus Medicus *Io. Dom. Sala*

Sala, quem Ducem sequebamur, advocaretur, urinam vidimus clariorem cum suspenso tamen satis copioso, sed in medio sui vacuo, unde annulare illi vocabatur. Hoc quidem etsi non satis salutare signum semper viderit, de ægri tamen salute non penitus desperabat, cum cicatrices post hesternam scarificationem nihil mali præ se ferrent, cum petechiæ circa lumbos purpureæ essent, cum denique auditus esset gravitas, natura scilicet critico motu ad organa auditus materiam malignam pellente. Nec fefellit augurium, brevi enim restitutus est. Digna extat in hanc rem observatio C. *Gemma* de Febr. Epid. Pestilent. hæmitritea 1574. grassante in fin. *Cosmocr.* l. 2. p. 235. Erat in plerisque sedimentum urinæ in fundo subattrum, sursum livescens, ac ita sensim candidius atque tenuius. Quod autem vix unquam aliàs vidit, id erat: In ea crassitie sedimenti centrum se peregrinum ac diaphanon ostendebat, tanquam illic vacua sedes in circumferentiam amplam immunis à purulenta colluvie servaretur. Tales ubi prodire plenissimè esse iudicatos testatur, ac redivivos velut ab inferis resurrexisse. Factum id arbitratur ex fomite pestilenti jam separato penitus & per urinas excreto: Cum innati spiritus ea sit vis, ut in urinis (*Actuario* teste) aliquantisper commoratus, juxta ideam ejus potestatis, antipathiæ & sympathiæ quam in corpore semper obtinuit, etiam

tunc egressus obambulet, singulis partibus sua loca decernat, noxia quæq; & peregrina longius à se repellens, aut in circumferentiam trumat, aut medio quocunque spacio circumscribat.


HISTORIA LXXV.

Tophacea materia in colicis.

CRassa subinde & lapidosa materia intestinis compacta ita distendit membranas illorum tunicas, ut dolores colici acerbissimi insurgant. Nec mirum colon distendere, quum plane iliacam passionem visa sit induxisse N. Fontano Resp. & Cur. Med. l. i. pag. 84. Hildano Cent. i. Obs. Chir. 51. alijsque. In dolore ventris observavit Zacutus l. 3. Prax. Adm. Obs. 129. calculum castaneæ & forma & magnitudine, intestino collo tenaciter adhærentem: Platerus l. 3. Obs. c. ult. vidit Præfectum quendam colicis cruciatus diu vexatum, post clysmatum usum, casei concreti induratiq; magnam per alvum ejecisse copiam. Retulit mihi Benedictus Sylvaticus incomparabilis Medicus, matronam Forojuliensem diu colico dolore intensissimo vexatam fuisse, qui nullis cessit medicamentis, antequam singulis vicibus materiam tophaceam & calculosam per alvum reddidisset.

HISTO-





HISTORIA LXXVI.

Pilosa capitis cutis vivo evulsa.

ORta Helsingoræ inter duos contentione à verbis ad verbera deventum est. Caput alterius alter & capillos involat, manuque tam firmiter aprehendit capillitium, ut, quod mirandum, subiecta cutis cum pilis ex cranio divulsa sit. Duo miranda occurrunt, quod pili tam altis radicibus hæserint, ut à cute evelli nequiverint, deinde quod cutis capitis cranio firmiter non adhæserit. Æquali præterea figura cutis recessit, quasi arte separata, venis suis eleganter distincta. Curatus fuit à Chirurgo feliciter, & inducta à natura nova cute pili novi increverunt. Pilosa verò cutis pars, quæ fuerat evulsa, à coriario præparata in rei fidem servabatur, transijtque ad *Petrum Ionam Charisium* Cognatum meum honorandum, qui & videndam exhibuit, & figuram hanc amice concessit.

HISTORIA LXXVII.

Ptyalismus singularis.

Virin Dania Nobilissimus, cætera vegetus sanusque molestum patitur symptoma. Quo

G 5

tiescun-

tiescunque cibum sumit, sequitur sputatio satis larga. Toto die reliquo nihil exspuit, neque ante cibum neq; post, etiamsi liberalius quandoq; amicorum in gratiam invitatus potet. At quam primum cibi orditur masticationem, copiosè sputat, ut crederes sputi torrentem ante pedes stagnare, cessat idem ptyalismus finito prandio, nec aliud incommodum experitur. Impeditior videtur hujus ptyalismi causa. Si ex ventriculo, vel vomitus comitaretur, vel extra prandii tempus recurreret. At ventriculus cibum & avidè appetit, & rectè concoquit. Quin impediretur potius salivatio pondere deprimentis cibi. Igitur ex capite hujus humiditatis fons accersendus, quanquam de catarrhis non valdè conqueratur. Glandulæ oris & palatum spongiosum sputa imbibunt excernuntque in primis quando inter masticandum commoventur. Non tamen tument glandulæ, nec inter loquendum provocatur sputum. Ductus salivales observant in glandulis oris *whartonus* & *Glissonius* l. de Anat. Heb. c. 45. qui per glandulas salivam tenuem, pellucidam & aquosam in os effundunt. Forsan illi à motu excitati largius & hauriunt salivam & reddunt.

HISTO.

HISTORIA LXXVIII:

De Unguium resectione.

IN navi olim unguēs abscindere non licebat, neque in nundinis, teste Plinio l. 28. c. 2. *Ungues resecari nundinis Romanis tacenti atque à digito indice, multorum pecunia religiosum est.* Resegmina verò unguium ad artes curiosas servabant. Ita Apulejus l. 1. Apolog. ex Lælio:

*Philtrā omnia undique irruunt,
Antipathes illud quarito,
Trochus, pili, unguēs, tenia,
Radicula, herba, surculi,
Sauri, illices hircodula, Hin:
Nientium dulcedines.*

Quemadmodum ex vet. libris restituit Cl. Salmasius in Solinum. Plinius l. 28. c. 7. ad febres ex præscripto muliercularum commendat resegmina unguium cerâ permista. Vulgus superstitione tali imbutum, abscissos unguēs diligenter igni tradunt, ne ad magicas artes intercipientur. Alii sibi servant, secumq; in sepulchrum recondunt, sperantes exinde buccinā fieri ab Angelis extremo die. Ita varia de unguibus viguit omni ævo superstitio, quanquam excrementis meritò annumerentur. Olim auro inducebantur.

Vir-

Virgil l. 8. *Æneid.* *Præfulgens unguibus aureis.* Unde *Statius* eleganter *Auro mansueverat ungues.* Mumiam Egyptiacam vidi unguibus inauratis. Tanta denique unguium resecandorum cura erat, ut tonsoribus id concederint. Testis est *Martialis* l. 3. Epigr. 73. de quo loco videndi *Scaliger* Not. ad *Manilium* l. 5. *Modius* Epist. 109. Nov. antiq. Lect. Quousque resecari à digitis debeant definivit *Hippocrates* l. de Med. Officin. ut neque longiores neque breviores sint digitorum extremis verticibus. Ea enim, quorum gratiâ facti sunt tunc maximè præstant, quando commodatam habent magnitudinem, *Galen.* l. 1. Us. Part. c. 7. Cavendum autem sedulò ne in liberali unguium resectione, læsis tendinum nervorumque extremis, periculum haud spernendum superveniat. Novi quendam gangræna pedis sublatum, quam ex viriosa unguis sectione concitaverat.

HISTORIA LXXIX.

Cingulum Mercuriale.

Cinguli Mercurialis usus frequentior, multis est justis de causis suspectus: Inimicus enim plerisque est Mercurius, imprimis imbecillioribus & convulsionibus obnoxiiis. Scabiosis tamen & cutis prurigine laborantibus audacter Empirici applicant, quos eos nomine castigat.

gat *Mindererus* l. Thren. Med. c. 14. quod tetrum illud argenti vivi virus in corpus gestantis ejaculentur. *P. Hechsterus* Dec. 3. Obs. Med. cas. 7. damna recenset illorum qui cingulo isto ad scabiem temere nisi sunt. Seni enim scabioso ex cingulo infectum palatum, gurgulio & fauces exulceratæ, salivatio copiosa, anhelitus teter, dentes vacillabant, gingivæ tumidæ, tensio in nervis & tendinibus colli, masticatio impedita, deglutitio depravata, appetitus prostratus, febris lenta hæctica, lipothymix multæ, & denique mors. Puellam quoq; cacochymicam scabiosam vidit ex tali inunctione percussa scabie, totam intumuisse cum spiritu sublimi. Nempe lethale est cingulum, si imbecilliores vel morbo vel ætate, & cacochymici eo cingantur. Unde sedulo cavendum ne, neglectis præmittendis, impura corpora & enervia inungantur. Rusticus *Mathias* in urbe nostra satis notus cingulo mercuriali diverso successu sanitati quosdam restituit feliciter, qui pura corpora crebro medicamentorum à Medicis præscriptorū usu obtinuerant, quosdā exitio eripere non potuit cacochymicos. Filiam civis *Hafniensis* totius capitis scabie diu deturpatam, cingulo perfanavit, ut & conjugio apta redderetur & sana deinceps vixerit. *Ballonius* l. 2. Ephem. p. 264. refert in æstiva constitutione Anni 1579. dum quædam tempestas sæviret, pustularum & eruptionum ferinarū ferax, obortos esse

esse tumores & dolores in variolis, quæ pueros necabant corruptis solidis partibus. Itaq; in eam itum esse sententiam, ut Emplastrum Vigonis cum Mercurio applicaretur, aliis litum levem ex hydrargyro fieri, idq; remedii mirum in modum profecisse. Eodem cingulo integræ sanitati restituit idem Empiricus rusticus Generosissimum Virum *Georgium Rosæranzium*, qui ex male curata fractura pedis per plusculos annos intolerabiles dolores expertus fuerat, & inveterata ulcuscula in parte affecta. Quod si aliud in vita nihil præclari gessit Rusticus, in eo tamen laudem & acclamationem omnium bonorum meruit, quod tantum Virum omnibus dilectum neminiq; molestum, florem nobilitatis & Musarû delictum, consuetis torminibus subtraxerit. Mercurius verò huic ægro obesse non potuit, quia multis Medicorum remediis propriaq; rerum Medicarum pericia, ita purgatum præparatumq; fuerat corpus, ut præter salivationem nullum incommodum ex usu hujus cinguli senserit. Mercurii cingulum alii ita faciunt. Mercuriû saliva aut sævo extinctum albumine ovi excipiunt, illinuntq; supra gossypium, quod in cinguli modum consuunt. Noster verò Mercurium cû oleo juniperino subigit & in massâ compingit, corioq; in cinguli formâ resecto illinit, quo mediû corpus constringit, cõmendatq; ad omnes affectus malignos, cancos, ulcera mali moris & antiqua &c. Ita audaces sæpe fortuna juvat,

HISTORIA LXXX.

Anatome Epileptica.

PErraram observationem ex Anatome Ernestæ Nassovici Comitissæ filiaë annum vix egressæ, nuper per literas mihi transmisit Vir Clarissimus D. Ioh. Daniel Horstius Archiater Darmstadianus meritissimus, quam hic publico non invidebo: Hujus Parentes Illustrissimi 23. Junij 1655. per literas Wistadio conquerebantur, quod nudius tertius filiola eusarca, florida & bene habens, enormi diarrhæa correpta fuerit, altero die aliqua ex parte sopita, sequenti verò cum vomitibus recurrente largius. Adventus 24. Junii deprehendit duritiem in dextro hypochondrio, calorem totius p. n. sitim, pervigilias, capitis dolores, alvi excrementa alba, virium prostrationem, quibus 26. Junij superveniens Epilepsia finem vitæ imposuit. Post obitum tota dorsi regio fuit nigra à nucha ad finem spinæ dorsi. Ventriculus verò in sinistra parte nigricans & quasi putrefactus, viridi humore refertus: Hepar scirrhosum decem unciarum. Vesicula bilis grandior, & nigra bile inflata. Intestinum rectum quoque nigricans. Renes unciarum quatuor, benè dispositi & sani, ut & Lien, Vesica, ipsumque Cor unciaë unius & dimidiæ. Cerebrum verò librarum quinque copiosa

pioſa aqua circum fuſum erat , aderant ipſi puſtulæ aqua plenæ. Parentes defunctæ venenum fuiſſe propinatum ſuſcipabantur , quibus manum nondum dare potuit, cum Cordis conſtitutio reperta fuerit integra. Nec vidit cur decedendum ſit à cauſis manifeſtis & cognitis ad obſcuras & dubias. Sufficiens enim videtur ſcirrhus hepatis ad virium debilitatem, bilis quoq; copia in ventriculo retenta & coacervata ad exulcerationem & exſtinctionem calidi nativi, atque exſiccationem humoris radicalis. Ipſa ſymptomata indicabant præſentiam bilis & motionem ejus, quæ tanto deterior, quanto magis recedit à naturali colore, uti fuit reperta præſina, æruginofa, & atra : Cujus exhalationes & vapores convulſiones, phlogofes & alia procurarunt. Sententiam rogatus à Cl. Viro, exiſtimavi malignæ febris fuiſſe ſymptomata: Ideam enim morbi quarto die ad exitum properantis id indicare , & quod ferè in malignis febribus ventriculus, inteſtina, &c. obſerventur læſa & inflammata, ſicut variis exemplis alibi demonſtravi. Orta autem febris à bile, eaq; à naturali ſtatu declinante , propter hepatis ſcirrhum ſine dubio connatum , quo tranſcolatorium ejus munus fuit interceptum. Epilepſam verò a bile ſuſcitari *Averrhoës* comprobat , & à maligna venenataq; qualitate *Fernelius*. Frequens ſanè id ſymptoma febribus malignis, præſertim in teneræ ætate.

Hi-

HISTORIA LXXXI.

Anatome Hydropici.

NEpos Georgij Illustrissimi Hassiæ Principis Hydrope 21. Iunij 1657. vix annum natus decessit. In examine viscerum *Ct. Horstius* antea laudatus sequentia notavit, sicut ad me amica manu perscripsit. Cutis circa regionem ventriculi, umbilici & inguinum, maculis atro purpureis instar ecchymomatum picta erat. Ex abdomine per sectionem umbilici leniter factam, humores serosi, biliosi, lutescentes & fœtidi, instar aquæ per canaliculum ductæ ad libras medicinales XV. profiliebant. Quibus subductis & aperto abdomine omentum penitus putrefactum notabatur, intestina cum ventriculo aliquo modo inflata, Pancreas verò ita consumptum, ut ejus nullum ferè vestigium animadvertere liceret. Venæ Meseraicæ glutinosa materia refertæ. Lien monstruosus tribus appendicibus instructus, sinistroque Reni arctissimè annatus, ut sine sectione digitis avelli non posset. Renes ipsi satis grandes. Hepar sanguineo colore suo amisso, cineritium ferè, & qualis in cocto aliàs notatur, habebat, incisumque copiosum serum, & copiosius quam Lien stillabat. In Hepate autem & Liene foveæ aqua plenæ apparebant. Bilis in vesicula aureo colore coruscabat. Pericardium ejusdem coloris & fæ-

H

toris

toris aqua distentum erat, cui cor innatabat. Ipsum Cor plane exsuccum ne guttulam quidem sanguinis intra se continebat, quod in aliis etiam observabatur: Nusquam enim sanguis notari poterat etiam in venæ cavæ & arteriæ magnæ incisione: Sed tantum aqua loturæ carnis non absterilis. Pulmones flaccidi & ex una parte purulenti.

HISTORIA LXXXII.

Febris in sene Nonagenario.

AUreum dictum est *Calij Aureliani* l. 1. 1. Acut. c. 3. Illud in ægritudine semper magis afficit, quod à natura plurimum recesserit. Quo spectat & oraculum *Hippocraticum* sect. 2. Aph. 34. minus ægrotare periculosè, quorum ætati familiaris morbus est. Magnam certe causarum vim indicant isti morbi, qui in contrarium temperamentum incidunt, ut febris calida in ætate senili per se frigida. Si tamen ætas grandævâ nativo robore se defendat, nonnunquam vim rerum naturæ adversarum eludit. Ita Avus meus maternus *D. Thomas Finckius* emeritus Academia nostræ senior, annum agens tertium supra nonagesimum ad actiones animales naturalesq; præter ætatis privilegium promptus & expeditus, æstate calida Anni 1653. in febrem Tertianam intermittentem felici eventu incidit, quæ invadebat cum sternutatione, quasi
ex

ex capite catarrhoso febrilis materia motus principium faceret. Naturæ autem in senili corpore tantum fuit robur, ut quotidie alvus aliquoties lubrica, aliàs satis contumax & adstricta, secesserit sive expultricis beneficio, sive irritantis bilis in febre abundantis excretionem. Toto morbi decursu somnus facilis frequensque, à quo multum sublevatus senex, tandemque sudore spontaneo soluta febris. Interea & calculus præter expectationem cum lotio prodijt pisi magnitudine inæqualis, cujus per universam vitam nullum unquam indicium observaverat. Exinde sanus salvusque Venerandus senex superstes vixit, ad annum 1656. quo febre iterum correptus prostratis viribus & aucto catarrho suffocativo, ætatis Anno 96. satur vitæ & gloriæ placidè exspiravit.

HISTORIA LXXXIII.

Hydrops Vetulæ.

Diffecabatur me præfente in Nosocomio Leidenfi corpus vetulæ Annos 70. natæ, quam aqua inter cutem jugulaverat. Magna copia aquæ flavescens ex abdomine intra peritonæum ejecta est. Hepar non tam putridum, sicut aliàs notatum, neque scirrhusum, sed parenchymate flacido. Lien à naturali quoque non multum recesserat, minor tamen, forsan ætate contractus.

Omentum ferè consumptum . Existimabat igitur sector Chirurgus, præsentibus D. *Screvelio* nobisque Hydropem istum ob defectum potius nativi caloris in corpore senili inductum, quam à læsione vel hepatis vel lienis vel aliorum viscerum.

HISTORIA LXXXIV.

Abscessus fracturæ salutaris.

FRacturis omnibus affluxus sanguinis & ichoris permolestus solet accidere, qui & partem in tumorem elevat & ossis consolidationem impedit. Inprimis fracturis id evenit prope articulos, qui & suum nativum ichorem libenter subministrant & ex toto corpore refundunt attractum. Unde periculosa sunt fracturæ ossium articulis vicinæ, & sanitatem diutius protrahunt, sæpeque obruta copia humiditatum extinctoque calore circa articulos exili, sphacelum ossi cariemve & gangrænam minantur, nisi alio divertatur evacueturque affluens materia sive Medici consilio sive Naturæ providentia. Natura ipsa quid hic subinde moliatur, exemplo luculento illustrabo. Vir Religiosissimus & quavis sanitate dignissimus, D. *Ioh. Svaningius, Selandiæ Episcopus*, prope urbem nostram rheda vectus, eandem saltu egressurus pedem dextrum ad terram fortius illidens fregit per transversum utrumque pedis

os

os tibiam fibulamque prope articulum circa malleolum, perforataque cute in malleolo interno ingens vulnus à tibia exeunte inflictum, ut miratus sim, ob viciniam articuli fracturam potius, quam luxationem sequutam. Periculosissima fractura statim per Chirurgum nostrum Sixium deligata, ossibus fractis repositis, & applicatis quæ & ossa arctè suo loco continerent & supervenientia symptomata impedirent. Fenestratæ verò fasciæ & splenia facta, ut sæpius vulnus detergi & curari posset, immoto pede sibi que relictis fasciis & spleniis ad maturiorem ossis consolidationem. Nulla insequuta alia symptomata propter summam constantis ægri quietem & dolorum patientem animum verè masculum, nisi quod copioso ichore madens vulnus infecerit fascias, ut sæpius solatis fasciis & spleniis commovere pedem fuerit necesse, difficilisque eadem deligatio successerit propter articuli viciniam, qui vincula difficiliter arcta admisit. Dum ter quaterque inter spem metumque anxij deligationibus studemus, ossiumque fractorum dislocationem & incurvi pedis situm metuimus, & impedimenta curationis ex affluxu ichoris copiosi detestamur, ecce Natura per *μικροσπον* quarto decimo exacto die à vulnere divertit materiam vulneri ossibusque obfuturam. Apostema enim circa spinam tibiæ infra genu exortum, latius infra angusto canaliculo ad vulnus ferè protensum, quo in supre-

ma parte, maturationis signis comparentibus, scalpello apertum, puris sanguinei ingens effluxit copia, cottidieque ad plures hebdomadas processit. Dictum verò factum vulnus fracturæ exsiccari visum, nec ichoris vel tantillum fundere, unde rarioribus ligaturis quietiora ossa citius per callum solidata, & inducta vulneri cicatrix. Apostema denique postquam satis & sanguinis & puris profudisset, sensim canale secundum spinæ longitudinem, concidente & curato, prorsus perfanatum fuit.

HISTORIA LXXXV.

Pes abscissus.

SCriba rusticanus cum anno præterito Norvvgiam silvis asperrimisque collibus & montibus horridam equo circumiret, procul Bergis lapsu graviore fracturam tibiæ sinistræ passus, dolores sensit gravissimos. Vicini Rustici hominem miserum suo hospitio exceperunt, & pedem fractum sine extensione instrumento ligneo excavato firmiter incluserunt, summaque cum diligentia oleo ex cineribus (quod ipsi rustici parant) inunxerunt. Hunc in modum lecto affixus inter rusticos annum complevit, vanisque illorum pollicitationibus delusus, tandem rogatu fratris sui maxima cum difficultate ex septentrione Bergas delatus fuit. Ad Consilium vocatus Ioh, Frid. Treublerus

blerus Medicus eruditus, amicus meus, qui hæc ad me transmisit, deprehendit os tibiæ cum fibula esse fractum quinque digitorum latitudine supra malleolum, ita ut pars tibiæ inferior fractæ cum parte superiori callo ad latus firmissimè connexa fuerit latitudine trium digitorum, fibula autem fracta inferior nusquam firmata in musculis oberaret, ut moto pede exactè sentiri posset. Ob cal- lum firmiorem, extensionem nullam fieri præ- dixit, at rogatu amicorum instrumentum effor- mavit, quo utrumque os in diversa trahebatur, sed frustraneo conatu, cum cutis sola eo usque ex- tenderetur ut jam disrumpi videretur, illa præ- fertim in parte, cui extuberantia ossis superioris fracti adnectebatur. Ideoq; & hoc in loco & alibi vulnus metuendum esse adstantibus monstravit, iussitque ut Chirurghi instrumentum remitterent, quia nec æger amplius perferre posset. Inflam- matio statim oborta, cui sedandæ externa appli- cabantur, & ad doloris mitigationem interna propinabantur. Igitur abscissionem pedis suavit *Treublerus*, ut ad officium è lecto rediret. Sed æger acerbius credens mutilari quam extingui, maluit, persuasus quorundam agyrtarum blan- ditiis, ut instar ossis fracti jamque in suum locum repositi pars deligaretur fortioribus adstringenti- bus atq; Emplastro catagmatico, quod absq; ulla ratione aut consensu Medici, approbarunt Chi- rurgi, unde dolores ferè intolerabiles cum tu-

more novo surrexere. Quibus nihil proficientibus, fero æger à doloris acerbitate & longo decubitu ferè insanus, tibiæ magis amissionem optabat, quam cruciatus diuturniores. Die itaque V. Mart. Anno 1655. summo favente Deo, hora 9. antemeridiana præsentibus tribus Chirurgis urbis primariis & Medico *Treublero* operatio commissa est Chirurgo juniore peritissimo *Heinrico Eckhofio*, qui carne prius ad os incisa, nudatum os feliciter abscidit. Peractis deinde peragendis, dissecti membri cutem cum musculis aperuit *Treublerus* calli formam lustraturus: Ossa tibiæ fractæ tanta firmitudine connexa erant, ut parvo cultello dissolvere nequiverit, ossiculum autem acutissimum Lit. A. in figura subjecta notatum cuticulâ adhærebat tenuissimâ ossi inferiori. Fibulæ ossa fracta nullo modo conjungebantur, id quod ex commotione persentiebatur antequam essent recisa. Inferior pars ossis tibiæ, ubi quædam cavitas conspiciebatur sub Lit. B. nigricabat & sphacelum minabatur. Optimè inde convaluit æger, & artificioso pede amissum damnum compensat.

HISTORIA LXXXVI.

Maxilla superior semper immobilis.

Maxilla superior omnibus animalibus est immobilis, quia articulatione caret, cranioque
per





per solas futuras connectitur. In homine usus id exigebat & cranij magnitudo. Præterea stabilis est ad faciei decus & venustatem, atque oculorum commoditatem, quemadmodum commentatur *Cl. Riolanus Comm. de Off. c. 10.* quippe si motum habuisset, oculis majore circulo inspecturis, & naribus odores excipientibus magno fuisset impedimento, & sua continua agitatione vicinum cerebrum perpetuo agitatum plurimum offendifset. Ciborum quoque duriorum contritionem exquisitam impedivisset, ut exemplo illustrat Vir laudatus: Nam ut in molendinis ad comminuendum triticum lapis unus immobilis persistit, supra quem alter celeri circumactione movetur, simili modo ciborum contritio in homine perficitur. Diversum in Crocodilo annotat *Aristoteles li. 3. Hist. Anim. c. 7.* qui inferiore maxilla immobili, superiorem moveri scripsit. Hunc ducem omnes sequuti de Crocodilo, Psittaco, Phœnicoptero idem prodiderunt. Sed crocodilo pressius inspecto aberrasse omnes à vero experiemur. Crocodilos in Musæo meo domi servo suspensos tam mares quam feminas, in quibus quidem prima fronte maxilla superior acuminata moveri videtur, sed non proprio motu. Siquidem enim & minor est & capiti arctius cohæret, capitis motum sponte sua sequitur, nec moveri potest capite immoto. Similia patiuntur vipera, Psittacus, Phœnicopterus, quorum rostra-

ta maxilla cum capite commovetur. Testabatur mihi Io. Veslingius Anatomicus illustris amicus olim meus, in Ægypto plures Crocodilos à se esse dissectos, accurateque separata cute à cranio & maxilla, nullas articulationes observatas in maxilla superiore, unde nec moveri posse solam, sed ad totius capitis motum, quia & oculos sursum moveat: Inferiorem maxillam exiguam habere articulationem, ut parum moveri possit & manifesto motu non indigeat, quia teriæ vicina. In penu summi Pontificis Romæ caput magnitudinis giganteæ vidit Columbus l. 15. de Rar. in Anat. in quo maxilla inferior capiti adeò connata & conjuncta erat, ut omni motu prorsus caruerit, atque in vivente non carere non potuerit. In quo monstro quomodo ad masticandos cibos maxillæ motum reciprocare potuerint, fateor me non intelligere.

HISTORIA LXXXVII.

Corij humani Usus & præparatio.

Celebres sunt corij humani præparati in medicina usus. Cingula enim inde conficiuntur & lora, quibus per medium discinctæ puerperæ feliciter foetum enituntur. Hystericas quoque passiones seu uteri adscensum corij humani cingulum comprimit, quod non semel expertus sum, & apud non paucas Hystericas isto vinculo gratiam

tiam merui. In spasmodicis manuum pedumque ex eodem corio auxilium sæpe petitur. Chirotecas inde factas ariduras & contracturas sanare, refert 10. *Schroderus* l. 5. Pharm. class. 1. Circa carpum cingulum ex corio humano, matronæ convulsionibus brachij sinistri correptæ post inunctionem applicuit cum successu *Hildanus* Cent. 3. Obs. 9. In Viro sexagenario aulico Epilepsiæ paroxysmum sedatum esse corio humano, quo collum cinxerat, meminit *Becherus* l. 2. Microc. Med. c. 1. Siquidem igitur à multis usu exigente corium humanum expetitur, & coriarios subactarios difficiles sæpe experimur nauseabundos ad cadaveris humani tactum, modum præparandi subjungam, ad cujus normam Ministri Anatomici mihi solent cutem humanam in Theatro nostro præparare. Separata de corpore cutis, omni pinguedine quoad fieri potest deterfa, immergenda est fecibus cerevisiæ, fursuræ filiginis & fermento temperatis. Calidæ huic mixturæ mergatur cutis, & manibus diligenter agitetur alternis horis, ut facilius vis ad corij intima penetret. Quatuor diebus clauso vase digeratur, ut quotidie aliquoties mixtura caleat, & cutis manibus subigatur, tumque, epidermide abscedente candicabit. Deinde aliud lixivium præparetur ex aqua simplici, tribus quatuorve manipulis fursuris filiginei, manipulo fermenti, tribus manipulis salis optimi, & libra aluminis triti, quæ invicem benè

benè misceantur, & calefiant, tepidisque immit-
tatur cutis & manibus, ut ante, subigatur denuò.
Per diem & noctem in isto lixivio remaneat, de-
inde abluatur, expurgeretur, & siccetur sive solis
radiis sive igne lento, & manibus dilatetur ex-
tendaturque, ne corrugatione nimia durior aspe-
riorque evadat.

HISTORIA LXXXVIII.

Pinguedo exsuperans in puella.

Proximis nundinis Falcoburgensibus inter
alia ludicra publicè spectanda proponebatur
puella quædam decennis in Brabantia nata Anno
1644. parentibus, ut ferebant, parvæ staturæ &
rei. Hujus puellæ abdomen à mammis ad talos
usque se produxerat. Iacebat enim puella, quia
impeditior erat incessus, ventre proprio tecta tan-
quam tomento superstrato, qui tumidus circa
umbilici inprimis regionem ita se inflaverat, ut
altè elevatâ undique cute cavitatem satis capa-
cem ad umbilicum demitteret, in qua tanquam
in crumena servabat quicquid pecuniæ à specta-
toribus collegerat. Interdum præmiolo aliquo
invitata ventrem ad instar tympani pulsabat can-
tillans simul quid subrauca voce. Tympanitem
esse crederes: Sed facies optimè colorata, nec in-
ficeto tinctæ rubore genæ, omniaque boni habi-
tus

tus indicia aliud videntur suadere. Pronunciatum fuit à Medicis qui ante hac eam viderant, tumorem hunc puram esse pinguedinem, naturæ lusu in abdomine exuberantem, & ab utero tractam, cibo enim utitur & potu quam parcissimè. Ipsa cum mole hac corporis 200. libras pendet undecimum jam ingressa annum, justâ alioquin pro ætate staturâ. Donaverat illam Cæsar torque aurea quum Viennæ degeret. Hæc ea fide refero, quæ & vidit & ad me Leidâ perscripsit eruditus *Petrus Schumacherus* noster, amicus dilectus, in spem patriæ feliciter surgens.

HISTORIA LXXXIX.

Aquæ in Variolis usus.

AD exitum decurrente & deservente æstate Anni 1655. passim in urbe nostra variolæ grassabantur, multosque tenerioris ætatis, sed sine funeribus, infestabant. Erant quippe boni moris. Consueta remediorum genera nostris fuere exhibita. Infectæ & eodem tempore variolis mulieres binæ Groenlandicæ, quæ post obitum tertiæ apud nos supererant, insuetæ hunc morbum pati. Quibus quum varia potus genera tam ad provocandas variolas, quam sedandum caloris æstum aliis proficua offerentur, omnia recusabant, ne coctam quidem aquam admissuræ, sed signis datis frigidissimam ex fontibus tam
avidè

avidè expetebant, ut si denegaretur, moriendum sibi significarent. Concessa tandem illis frigida, convaluerunt.

HISTORIA XC.

Menstrua ultra 50. annum fluentia.

RARò quinquagesimum annum fluxus in feminis menstruus excedit, nisi copia sanguinis abundet. Ita observavit *Hildanus* Cent. 2. & 4. mulieribus quibusdam ad septuagesimum annum & amplius perstitisse. Monstruosum est, quod *Saxonia* Part. 3. Prax. c. 23. de moniale refert quæ vixit ad 103. annum cum menstrua purgatione. Illustris in Dania Matriona quinquagesimo secundo ætatis anno, quum antea substitissent ordinati fluxus, ter quaterve eosdem est passa, sed magna difficultate revertentes, quæ optimo corporis habitu prædita & eleganti, sanguine copioso vegeta, sana postea vixit. In sexagenaria femina Veronensi, postquam lege naturæ ante annos sexdecim menstruæ purgationes cessassent, anno demum 1655. cursum suum, consuetum velut olim reperierunt, prodennte sanguine florido optimæ notæ, sed post aliquot menses stillicidium ac tandem suppressio, eademque mala insequuta, quæ mensium obstructions concitare solent. Curata tamen à *Pietro de Castro* Medico eruditissimo, præsentè D. *M. h. Lysero*, amicis meis, sensimque revocatis mensibus, melius habuit.

H 1 -

HISTORIA XCI.

Novennis puella menstruata.

Menstrua purgatio ex naturæ prescripto primum ferè erumpit circa ætatis annū quartumdecimum : Paucis citius teste *Aegineta* l. 3. c. 60. Novi tamen puellam annos novem natam, in urbe nostra cætera macilentam & colore faciei pallido, cui menses fluere cæperunt, sive quod uteri cervicisve vasa sanguine serioso aperiantur, sive quod nativa constitutione ampliora sint, sive denique quod sanguinis copia, etiam in macilentis subinde abundans, vasa uterina distendat impleatque. Vidit *Semertus* l. 4. Prax. part. 2. sect. 2. c. 1. quibus undecimo anno fluxerunt menses, easque plerunque salaces esse, & brevioris vitæ. Novit *Hercules Saxonia*, Part. 3. Præl. Pract. c. 23. puellam cui menses quinto anno apparuerunt, & ordinatim singulis mensibus modice prodibant, plures quoque quæ decimo anno liberalius purgabantur. Supra fidem est filia tabellarij apud *Tulpium* fide dignissimum l. 3. Obs. cap. 36. cui à quarto in octavum ætatis annum periodicè fluxerunt menstrua, quibus suppressis omnis sanguis in caput convertebatur.

HISTORIA XCII.

Pustula in ventriculo.

POst febrem ardentem passus est in Galliis recidivam Polonus, notus mihi & amicus. Medici de recidiva consulti variis potionibus medicatis, venæsectione & aliis remediis frustra contra prostratas vi morbi vires luctabantur, nam potiones omnes vel respuebat, vel assumptas revomebat, unde fatis cessit. In aperto cadavere nullæ partes ullum vitium visæ sunt contraxisse, sed omnes nativa temperie sanæ comparebant. In ipso tamen ventriculo pustulæ quam plurimæ hinc inde conspiciebantur, quas à calore malignæ febris fuisse elevatas, tanto minus dubito, quod semper fere ventriculus in hujusmodi febribus vel escharam vel inflammationem vel alia hujus census contrahat.

HISTORIA XCIII.

Dubium purgantium tempus.

PURGantium medicamentorum tempus anticipiaugurio & incerto captatur. Ignorat sæpe Medicus naturæ motum & orgasmum, unde, quando sua sponte ad humorum noxiorum expul-

pulsionem accingitur, inscio Melico, si purgans medicina propinetur, etiam lenioris ordinis, in vitæ periculum præcipitatur æger. Decoctum foliorum senæ cum prunis perbenignum, assumpsit ad præservationem solitam honestissima urbis nostræ matrona, unde tantum alvi successit profluvium, ut in Dysenteriam tum populariter grassantem degeneraverit, quæ post tridui intervallum ægram jugulavit. Quanquam fortassis profluvium istud supervenisset nullo assumpto medicamento, potest tamen congesta materia ad expulsionem concitari & cogi, quum vel levissimum accesserit irritamentum. Alia curæ meæ concredita recidivam Tertianæ passa, post tertium paroxysmum intermittente die circa vesperam pilulas assumpsit, propter vires infirmiores, valde lenes, in quibus vix grana quatuor purgantium numerabantur. Sequuta tamen statim ventris murmura post parcam cœnam, vomitus biliosus, tormina & cruciatus, dejectiones crebræ biliosæ & serosæ, virium projectio, pulsus ferè intermittens. Inter has sollicitudines nox tota transacta. Mane bis alvus adhuc lubrica solvebatur. Exinde exhibita Theriaca intus forisque, & vino paulatim imminuti dolores, alvusque suppressa. Postridie solita paroxysmi hora tertia post meridiana, mitior calor advenit & blanda febris, quippe naturæ potius quam medicamenti conatu bilis copia evacuata febrem ferè extinxit.

HISTORIA XCIV.

Sanguis in corpore concretus.

Sanguis in quodam subiecto Luca tamen erat à Melancholico humore exsiccatus, ut omnes venæ cordis & ipsum cor à Chirurgo perito dissecari nequiverint, turgidæ tamen venæ Meseraicæ cernebantur sanguine atro & lutulento. Notat *Fernelius* l. 6. Phys. c. 7. ex rara quadam & abdita morbi causa quempiam post diuturnum languorem de vita exiisse, cui sanguis universus in venis concreverat, adeo ut demum corallij modo fruticans illinc eximeretur. *Platerus* l. 2. Obs. p. m. 505. relatione *Chiffletij* habuit, venas meseraicas in Hæctica sanguine crasso & concreto tumuisse, qui è majoribus venis coralli instar nigri cohærens extrahebatur. Audivit *Ballonius* l. 2. Epid. p. m. 242. D. du Mesnil sanguinem nigrum ita concrevisse in jugularibus venis, ut carbonem illic impacti crederentur.

HISTORIA XCV.

Vomica Pulmonum.

Juvenis Patavinus ab inflicto in dorso vulnere, ad pulmones usque penetrante, febre acuta corripiebatur, cum dolore pungitivo & respirationis difficultate, ut pro Pleuritico æstimaretur, postri-

postridie, inflammatis pulmonum membranis, de dolore conquerebatur ad posticam cicatricem pertingente. Hinc Io. Dom. Sala, Præceptor in Praxi meus, aliud quod Pleuritidem subesse suspicatus, cicatricem locumque affectum tetigit, adhibitaque in consilium ratione, pronunciavit febrem illam subortam esse ex Vomica in pulmonibus ob puris collectionem genita. Nec fessellit augurium Viri sagacissimi, oportunis enim adhibitis remediis omne pus per sputum educum fuit, ægerque convaluit optime.

HISTORIA XCVI.

Inflammatio intestinorum.

CAdaver Monachi S. Justinæ Patavii me præsentè apertum olim fuit, de quo suspicio inter Fratres oborta erat à corivalibus oblatis veneni, quippe clystere communi injecto, statim de dolore colli & partium vicinarum conquestus, ardorem acutissimum ad extremum usque spiritum sustinuit. Sed in aperto cadavere nullum veneni comparuit vestigium. Hepar verò inflammatum visebatur gangrænaque correptum, quæ labes & vicina intestina infecerat & dextrum hypochondrium nigerrimo colore totum occuparat. Ventriculus sanus, nisi ea parte qua hepar respiciebat, ubi eodem modo nigricabat. Vetus igitur Monacho malum videbatur, quod

per clysterem injectum inflammatis intestinis irritatum, citam mortem attulit.

HISTORIA XCVI.

Vermes dentium.

Vermes in dentibus reperi generariq; quemadmodum in aliis corporis partibus quamplurimis, dolorum acutissimorum indicia persuadent. Vermem sesquiarticulum longum, crassitie vermiculum in caseis nasci solitum crassiusculum referentem, ex dente nobilis virginis aulicæ extractum vidit *Salmuth* Cent. 3. Obs. 32. Bis idem expertus est Chirurgus noster peritissimus *Martinus Sixius*: Semel in filia Consulis *Hafniensis*, cujus excavatum dentem & à se extractum, ferro medium disrupit, ut de rei veritate certius constaret. Repertus in illo vermis vivus similis prorsus vermi qui nuces solet erodere, albo corpore, capite rubro. Similem in alio observavit. Ad enecandos expellendosque ex dentibus vermes alii commendant suffitum ex *Hyoscyamo*, alii aquam in fenestris collectam, alii axungiam campanarum, mihi secretum suum communicavit *Rusticus Empiricus*, seyum nempe cervinum linteo exceptum & ad ignem liquatum imbibitumque, & gingivis impositum, quo & vermes attrahi expertus est, & dolores mitigari. Certè inter lumbricos enecantia, Cornu Cervi primum locum solet in Pharmacopoliis obtinere.

HISTO-

HISTORIA XCVII.

De Betonica experimentum.

INter herbas cephalicas Betonicam primo ferè loco numerari, apud Botanicos est in confesso. Ex illa Emplastra conficiuntur omnibus capitis vulneribus proficua, opiata, decocta &c. Solo Betonicæ emplastro cranii vulnera & contusiones curatas memini, ut alibi monui. *Antonio Musa* autore, herba betonica contrusa, & super capitis ictum imposita, vulnus mira celeritate conglutinat & sanat, ejusque potestas tantam fertur habere utilitatem, ut ossa quoque capitis fracta vi sua extrahat. Caput recentem Betonicam petere, singulari experimento Hafniæ comprobatum. In horto suo suburbano instructissimo *Esaias Fleischer* Pharmacopola urbis primarius, inter alia simplicia officinæ necessaria, colebat Betonicam suo pulvisculo contentam. Hinc quum operarii hortulani seu *πίζιπμογ*, evellerent in usum officinæ, omnes velut ebrii titubarunt; increpatique ab hero, quod potu largiore operas neglexissent, sanctè affirmabant etiam testibus advocatis, nihil se liquoris assumpsisse, sed in extractione iltius herbæ capite fuisse turbatos. Ob figuram capiti cerebroque æmulam nux juglans capitis quoq; affectibus confert. Singulare inde ad dolores capitis remediū nuper in Anglia detectū.


Primo vere antequam folia in nuce juglande prurumpant, terram circa radices fodiunt, & ex radicibus incisiss emanantem liquorem extrahunt, cujus aliquot guttulas propinant magno cum successu in doloribus capitis.

HISTORIA XCVIII.

Venæ ex pulmonibus rejectæ.

VENARUM ex pulmonibus rejectarum sine parenchymate, exempla habent *Tulpius* l. 2. Obs. c. 12. 13. *Zacutus* l. 1. Prax. adm. obs. 101. Similem rami venæ arteriosæ à phthisico rejectum Parenchymate suo ita nudatum ac si industrius Anatomicus separasset, *Rostochio* 1649. *D. Stephanus Scultetus*, ad *D. Simonem Paulli* transmisit, cujus Viri clarissimi mihi que amicissimi dono ramum cum surculis possideo, rudi tipo hic lectorum in gratiam expressum.

Plures



Plures quidem ramuli , seu venulæ capillares
aderant , sed quia disruptæ fuerunt, pictor ne-
glexit. Postea idem phtisicus plures alios ramu-
los absque sputo sanguinis fertur rejecisse, & ali-
quandiu supervixisse.

HISTORIA XCIX.

*Anatome feminae diarrhææ
defunctæ.*

C Atharina Mathelings, Femina Leodiensis XV. annos nata, post Hecticam diarrhææ vehementiâ sublata ad interiorum examen ansam dedit. Viscera omnia flaccida, præcipue cor & pulmo. In dextro pulmonis lobo vomica, intra pericardium vero, ubi membranæ mediastini cordis basi annectuntur, glandula Thymi nûcis juglandis magnitudine solida densaque latebat. Reliquæ in mesenterio glandulæ majores solito, aliæ ateromatum materia plenæ, aliæ pure concreto tam candicante, quam ad nigrorem vergente. Plurima aqua pericardio inerat, cordi paucus sanguis. Renes flaccidi, ureteris utriusque extra renem exortus amplior, nihil tamen sabulosi in renibus aut vesica deprehendebatur. Omentum omni pinguedine expoliatum. Hepar tabidum. Uterus minimus & durus. Uterque testiculus gracilis, tuba exilis, vasa colli & fundi tenuia quia necdum mensurum fluxum passa fuerat.

HISTORIA C.

Pullities in sterquilinio.

IN Ægypto familiarem pullos in fornacibus excludendi modum Magnus Hetruriæ Dux imita-

imitatur, & Divus Christianus I V. Rex Daniæ Augustissimus in arcem Fridericeburgum feliciter invexit, exstructis fornacibus elegantissimis, musæo singulari, & scamnis, in quibus nuper exclusi pulli ambulare possunt antequam in peregrinum aërem transferantur. Idem artificium in quovis calore succedit moderato, siquidem gallina incubans præter calorem externum ovo nihil imprimit satis secundo, sicut nec uterus foetui. In quovis igitur sterquilinio hybernis etiam mensibus pulli ex ovis excluduntur, quod in Palatio Magnifici Cancellarij Regij Dn. Christiani Thomæi, Patroni nostri, aliquoties cum successu fuit tentatum. Citius hic quam sub gallina excluduntur, & cavendum sedulò ne nimius sterquilinij calor ova comburat, quod sæpe contigit, ideò foramina patula in superna parte sterquilinij relinquenda, ut calor temperetur.

THO.

THOMÆ BARTHOLINI
HISTORIARUM
ANATOMICARUM

Rariorum

CENTURIA IV.

HISTORIA I.

Anatome Civettæ.

EX Africa cum navibus nostris Hafniam inter alias merces præciosas 1655. allatæ sunt utriusque sexus Civettæ odoriferæ sex, nam reliquæ in itinere mortuæ sunt. Inter superstites una sola femella erat, quia in precio majori habentur mares propter Ziberthi copiam, quo abundant. Mas & femina in arce Regia servantur, reliquas precio 600 Joachimicorum emit Samuel Mejerus insignis in urbe nostra Pharmacopola, ad Zibethici liquoris collectionem. Vescuntur cruda carne & oriza, nihil bibunt, & in locis calidis semper suis caveis inclusæ servantur, quia frigus collectioni Zibethi obstat. Semel in hebdomade colligitur odoratus liquor, & à perito extrahitur cochleare, apprensâ hinc cauda, illinc fune irretito capite ne mordax animal ad sui tutelam

Iam insurgat. Forte ex quatuor coemptis una Hyæna feriis Natalitiis moriebatur, quæ pica laborare videbatur: præter morem enim & modum plus vorabat quam reliquæ tres, & quæ cæteræ respuebant ipsa avidè arripiebat, minus tamen Zibethici liquoris excernebat, & odore vilius, furiis denique acta hinc inde in cavea magno impetu ferebatur antequam concideret. Concessit mihi de mortuam laudatus Mejerus, quam in Theatro Anatomico plurimis spectatoribus dissectam demonstravi, ut & differentiam interiorum viscerum scrutarer, & vasculum Zibethicum accuratius examinarem. Plures quidem & externam figuram animalis & liquoris condicionem adumbrarunt, ut *Bellonius*, *Gesnerus*, *Aldrovandus* &c. pauci tamen interiora penetrarunt. Solus *P. Castellus* Messanensis Medicus, amicus meus, cum Romæ esset Anatomen Hyænae odoriferæ celebravit, & publico postea scripto Messanae edidit, sed nec omnia egregius ille Anatomicus assequutus est. Nam Hyæna, quam dissecuit, Hydrope interempta, unde putrida ibi omnia non sinebant quicquam notare præter vasculum, quod tamen nec ita accurate aut descripsit aut depinxit, quin aliquid nostræ industriæ reliquerit. Quid observaverim in Hyæna nostra, brevibus signabo.

Figuram externam rectè assequutus est *Gesnerus* ex *Cajo*, & *P. Castellus* in iconæ annexa. Cutis illi maculosa pilisque obsita, qui nigras hinc inde
lineas

lineas efficiunt inter alios pilos flavescentes. Caput ferè lupinum, curtæ aures, dentes huic obtuli, sive senio sive arte detruncati. Collum crassum & oblongum, musculis valde carnosis robustum, quorum duo longius intra thoracem supra spinam protenduntur ad cordis usque regionem. Orbita oculi superiore parte versus frontem patula. Musculus temporalis crassus totum utrinque caput superius occupat, nec alii in capite musculi manifesti. Per medium cranium incedit processus osseus loco suturæ sagittalis, instar cristæ, dividens cranium in duas partes. In dorso cutis fetas habet longiores, nigras, durasque, quas iracundum an mal erigit.

Dissecto abdomine, musculis nempe & peritonæo, omentum occurrebat ubique duplex, sed tenue retis instar, hinc inde pinguedine pauca conspersum, quod à fundo ventriculi cui arctè cohæret, protendebatur supra omnia intestina ad pubem usque, ubi se circumvolvebat ad spinam, & intestina velut in marsupio comprehendebat. Involvebat quoque lienem octo digitos transversos longum, duos pollices latum, cætera sanum, nisi quod exiguum apostema sanguineum pisi magnitudine in extrema sui parte splen monstraret. Hepar magnum floridumque diaphragmati non solum consueto ligamento suspensorio alligatum, sed ipso parenchymate cohærens. Lobis septem distinguebatur. Velicula bilis
parum

parum liquoris continebat subobscuri. Venæ cavæ descendentes truncus ex hepate statim renes contingebat, ut vix tantum spatii pro ligatura superesset. Circa portæ ingressum observari sunt ductus Lymphatici plurimis ramusculis conspicui, & supra portam versus mesenterium tres rami tumidiusculi. In mesenterio nullæ lactæ manifestæ, nam ventriculus plenus adhuc erat cibo copioso inconcocto & crasso. Intestina scatebant excrementis nigricantibus, & ipsum cæcum articuli pollicis magnitudinem æquans eodẽ excremento plenum viscebatur. Nulla valvula in colo, præter circulum duriores.

In Thorace mediastinum valdè tenue & foraminibus hinc inde retis in morem perforatum. Pericardium paucam aquam continebat, quia calidum est animal. Cor ipsum justæ magnitudinis & interna & externa facie nihil ab homine diversum monstrabat. Dextrum ventriculum & auriculam dextram & ingredientem cavam, magna sanguinis grumosi nigrique copia distenderat, ut insigniter tumerent. Hinc non aliam mortis causam in animali sano invenimus, quam suffocationem. Sanguis in corde contentus nullum odorem spirabat. Pulmones utrinque longi, dexter tribus, sinister duobus lobis distinctus. Arteræ per membranâ mediastini cohærebant œsophago & arteriæ magnæ descendenti. Forsan hinc ingluvies, à pulmonibus continuè irritatis, commoto

moto & aperto œsophago. Thymus nullus, frustulo pinguedinis illius vices supplente.

Exemptis intestinis, renes, vasa spermatica & vasculum Ziberthicum aggressus sum. Renum leviter incisa tunica sponte separabatur, subiectumque parenchyma foraminulis seu foveis externè hinc inde distinctum: an id naturale omnibus, vel huic proprium, affirmare non possum. Sinister obscuriori colore fuscus. In ureteribus & vasis spermaticis diligenter separatis nihil notatu dignum. Situs inferiorum hic erat. Vesica parva lotium continebat solito loco reposita, tum penis eminebat extrema parte osseus cum præputio sicut in canibus. Urethra inde longo tractu descendebat ad testes infra pendulos oblongos instar nucleorum dactyli. Inter penem verò & testes collocatum est vasculum Zibethi, membranis urethræ alligatum. Vasculum externa forma vulvæ assimilatur, per medium fissum & pilosum, tres digitos transversos longum, totidemque latum, quod per mediam rimam nonnihil diductum, in utroque latere foraminulum instar oris carpionis ostendit lanuginosum. Ut interiores cavitates paterent, per mediam rimam dissecui & in duas partes divisi ad urethram usque, quæ per medium infernè transibat & à vasculo facilè separabatur. Hinc ad vasculi utramque partem divisam converso, primum circa marginem vasculi divisi purgata candicantia occurrebant, deinde fo-

ra-


ramine ante dicto latius reciso interior cavitas in conspectum veniebat. Rotunda illa, amygdalum capiens, lanuginosa, membranulis subtilibus binis instar valvularum distincta. An ista membranula ex pilis Zibetho imprægnatis emerferit, quia faciliè filorum instar discerpebatur, non auisim determinare. In limbo hujus cavitatis & in reliquo vasculi corpore glandulæ comparebant quam plurimæ, modò majores, modò minores sua cavitare singulari præditæ, quasi vesiculæ Zibethicæ, quibus apertis liquor odoratus olei instar candicans effluxit, odore fragrantissimo spirans, qui chartæ exceptus candicabat; post aliquot deinde dies mutato in flavum colore consistentia firmabatur. Externam quoque vasculi solidioris partem dissecuri, vesiculasque copiosè ibidem dispersas simili liquore inveni refertas. Infra testiculos prope anum ad finem urethræ, duæ glandulæ sitæ sunt rotundæ nucis minoris magnitudine, quæ intus cavæ sperma effundebant, quas vesiculas credidi esse seminales, supra verò infra collum vesicæ minores aliæ glandulæ collocabantur, quas pro Prostatis habui.


Curiosa industria his visis occupabar in inquirendis viis per quas liquorem vesiculæ Zibethicæ attraherent. Separatis urethra & testiculis à vasculo, singulisque examinatis nullum inveni commercium nisi per membranas, quibus invicem omnia junguntur, sed faciliè separabiles. Nul-
la

la alia vasa patentia aderant, nec ulla in toto corpore particula odorem istum spirabat, præter solum vasculum. Anigitur ex vesiculis femina-riis? Vicinæ quidem sunt, nec liquor diversus, si odorem excipias. An ex vasis præparantibus? Sed hæc solito more testiculis & Epididymidi-bus inferuntur. Non ex alvi excrementis, quia urethra intercedit inter rectum intestinum & vasculum: adhæc fætent illa, non hæc; & hæc colore candicant, nigricant illa. Via igitur in-certa est. Certum tamen videtur in vesiculis Zi-bethicis confici istum liquorem odoratum, sicut à testibus semen, à mammis lac, occulta quadam potestate & vasculi odorati proprietate. In qui-busdam vesiculis internis vasculi, loco liquoris, erat rubra materia instar concreti sanguinis, & friabilis. Unde suspicio nata ex sanguine con-fici Zibethum, qui propter affectum quemcun-que vesicularum istarum, in Zibethicum liquo-rem non potuit converti. Nam hæc hyæna nec tanto Zibetho abundarat, Mejeri confessi-one, nec tam fragrantem odorem, ut alia con-generis speciei animalia, emiserat. Ex vesiculis turgidis transudat liquor in cavitatem & lanugini adhæret, forsan ne citius excidat & ut diutius perficiatur, exinde statis vicibus vel sponte affri-ctu animalis excernitur, vel à ministris cochleari apto eximitur. Ex inodoro sanguine odoratum liquorem in vasculo, generari mirum videri

non

Fig. I.





non debet, quia & flores fructusque suaveolentes ex succo terræ plantæque inodoro emergunt, in parte propria plantæ arborisque alterato.

Ex oculolapide denique erui, de quo *Plinius* l. 37. c. 10. & *Albertus Magnus* referunt, linguæ hominis subditum futura prædicere. Nihil verò est, nisi humor crystallinus elegans & pellucidus, durusque. Sinister major dextro erat. Sed futura prædicere falsum, nisi augur accesserit. Ego auguria non novi, nec cælum aruspicum curo, ut loquitur *Petronius*.

FIGURARUM EXPLICATIO.

Fig. I. *Anteriorem vasculi Zibethici faciem externam exhibet, cujus singula particula literis signata hunc habent significatum.*

- aa. *Renes, dexter & sinister.*
- b. *Emulgens vena, cui arteria subjicitur.*
- cc. *Vena cava descendens.*
- dd. *Arteria magna descendens.*
- eeeeee. *Ureteres utrinque ex renibus enati & in vesicam inserti.*
- ffffff. *Vasa spermatica praparantia, ex truncis vena & arteria orta & in Epididymides desinentia.*
- g. *Vesica sursum elevata, ut conspici possit.*
- h. *Penis, cujus suprema pars acuminata ossea.*
- ii. *Vasa deferentia.*

K

kk. Te-

- kk. Testiculi bini oblongi.
 ll. Epididymides.
 mm. Vasculi Zibethici labia lanuginosa.
 nn. Vasculi Zibethici corpus cute pilosa nudatum.
 oo. Rima vasculi Zibethici.
 pp. Musculi duo dilatantes & aperientes vasculum
 Zibethicum.
 qq. Musculi duo alij, forsan constringentes.

Fig. II. Vasculum integrum diductis labiis ostenditur.

- aa. Foramen oblongum utrinque ad cavitates inter-
 nas vergens, per quod extrahitur cochleari
 Zibeticus liquor.

- bbbbbb. Ruga externa.
 cc. Labia pilosa reflexa.
 d. Fissura seu rima latior pars superior.
 e. Rimæ angustior pars inferna.

Fig. III. Vasculum monstrat per medium discissum, &
 ad latera reflexum.

- a. Foramen ad cavitatem internam tendens.
 b. Urethra sub vasculo descendens.
 c. Ossea penis extremitas.
 dd. Labia pilosa vasculi.
 eeee. Corpuscula alba glandulosa.

Fig. IV. Vasculi dextram partem aperit, labiis per me-
 dium discissis.

- a. Cavitas interna pilosa, in qua Zibethum col-
 ligitur quando eximitur.
 bb. Labia pilosa.

Fig. 2.




Fig. 3.





Fig. 4.



- cccc. *Vesicula glandulosa, in quibus Zibethicus liquor generatur & continetur.*
- dd. *Corpus vasculi nudum candicans.*
- Fig. V. *Posterior vasculi Zibethici facies visitur.*
- a. *Penis ossis.*
- b. *Urethra.*
- cc. *Membrana urethrae subtensa conjungens vasculum Zibethicum.*
- dd. *Prostata glandula.*
- e. *Vesica urinaria ad latus reflexa.*
- fff. *Vasculi Zibethici corpus externum.*
- ggg. *Glandulosum Zibethi corpus rescissum, multis hinc inde vesiculis refertum, liquorem Zibethicum profundens.*
- h. *Vesicula conspectior & major Zibethi.*
- ii. *Vesiculae seminales spermate plenae & cavitate praeditae.*
- kk. *Testiculi.*
- ll. *Vasculi Zibethici pars lanuginosa anterior.*


HISTORIA II.

Prolapsus uteri cum urinae incontinentia.

UXor statuarij de urinae ardore ejusque incontinentia apud me conqueritur. Uterus prolapsus modò recedit, modò relabitur. A difficili partu vitium contraxit, quo quinque diebus misere fuit torta. Jam verò uterus prolapsus vesicae orificium in transitu comprimens, facultati

retentrici remoram videtur addidisse. Vnde uterum prius reponendum suo locosuaſi, quam lotij haberetur ratio. Advocata obſetricice clyſter injectus, uteri pars prominula foliis lauri, & baccis, mentaſtro, artemiſia in vino adſtingente coctis elota, pulvisque adſtringens eidem adſperſus, mox digito obſetricis immiſſo, qui axungia gallinæ erat inunctus, reſoſitus uterus, cui extracto peſſarium ex ſætidis ſubſtitui, emplaſtrum matricale perinæo impoſui, cucurbitulam magnam ſiccā ſupra umbilicum duasque in iliis affigi curavi, & odorata naribus admovi. Hoc ſitu immotam per aliquot dies demiſi, & reverſus prodeuntem uterum non obſervavi. Deinde dum lotij gratia cautè progredior, viſa eſt urina in maſſupio, quod appenſum in lecto habebat, rubicunda, ſed cum ſedimento putrido, ſœtente, albo, & diſrupto. Nata inde ſuſpicio ulcus eſſe in veſica ex 4. *Aph.* 81. puſque prodiens vellicare ſpincterem, veſicæ muſculum, ad excretionem continuam: Nam in difficili partu inflammatio veſicæ meatui impreſſa fuit. Expurgato pure & deterſo ulcere ad meliorem ſtatum ſanitas diu deſiderata tandem rediit.

Fig. 5.



HISTORIA III.

Convulsiones Paralyticæ.

Affinis est convulsioni Paralysis, tam materiæ ratione, quam nervorum affectorum. Vnde sibi subinde invicem succedunt, subinde quoque se presso pede comitantur. Viro Clarissimo, amico nostro, circa vesperam ex linguæ Paralyfi sublata loquendi potestās. Postero die sinistrum latus resolutum, & os adeò firmiter constrictum fuit, ut nulla vi aperiri posset; dextrum verò latus convellebatur. Nempe materia maligna, cujus indicia perechiæ apparentes prodiderunt, sinistram principii spinalis partem prorsus obstruens, sensum motumque illius lateris abolevit, in dextram verò partem non ita copiose irruens membranas vellicando, quia nervum totum replere non potuit, ad convulsiones irritavit. Honestā alia Matrona, cui curandæ præfui, durante spasmo dextri cruris & pedis, in eadem parte Paralyfi tentabatur per ætatis decursum, ita tamen ut sensus in pede remanserit, motu sublato.

HISTORIA IV.

Unicornu Groenlandicum.

Celebris est de Unicornu apud veteres fama. Animal credebant terrestre quadrupes solo

cornu in fronte donatum, miramque cornu ad venena pellenda virtutem decantant, unde in tanto precio apud Magnates posteriores habitum, ut Romæ precio nonaginta millium coronatorum aliquando venerit, & pro thesauris hætenus sit æstimatum. Nostra vero memoria precium Unicornu imminutum, postquam & frequentiore mercatorum commercio copiosius advectum, & ipsum animal detectum fuit. Mercatores enim nostri in Islandiam & Groenlandiam magno studio navigantes invenerunt quod in India & Oriente toto veteres tantopere deprædicarunt, Unicornu nempe marinum, seu Balænam, Narvhal Islandis dictam à cadaveribus quibus vesci solet, quod in superiore maxilla dentem unicum habet longum crassumq; recta protensum, gyris intortum & striatis flexibus ex majori radice ad summum acumen desinentibus. Hic est dens, quem pro Unicornu vero antea omnes venditarunt, & ex animali terrestri deciduum crediderunt. Affirmare non dubito, ex balenæ dente desumpta fuisse Unicornua, quotquot hætenus hoc titulo prodierunt. Vidi plurimis in locis frustula, vidi & integra Unicornua in thesauris, Ultrajecti, in sano S. Dionisij, alibique sed tam similia huic balenæ denti, ut ovum ovo. Nolo plura de Unicornu hoc commentari, quia alibi in *Observationibus meis Novis de Unicornu* justum huic denti laborem impendi. Vires breviter libabo,

babo, quashuic Unicornu Gronlandico inesse experti sumus. Quum copiosus ad nos ex Gronlandiæ tractu septentrionali freti Davis, navibus Amplissimi Viri Henrici Mulleri Anno 1652 & 1653. adveheretur, felici successu observarunt Medici urbis potentissimè provocare sudores in febre maligna tum grassante, & cum sudore largo extinctas esse febres. Exhibitus pulvis ejusdem à scrupulo uno ad Drachmam semis in aqua cardui Benedicti, vel sambuci, vel cerevisia, etiam invitis insuetisque sudorem copiosius expressit. Dedi quamplurimis febricitantibus, rarò sine optato successu, ut in usum pauperum hujus Unicornu frustula non pauca consumserim. Experti sunt quoque eandem vim in ægris suis Medici consummati D. *Vormius* & *Mothius*, ut candidè mihi confessi sunt: Neque solum exhibitus pulvis profuit, sed collo appensa frustula, amuleti vicem sustinuerunt. Rogatus transmissi frustulum Cl. Viro *Alberto Kypero* Medico Professori Leideni, Amico meo, qui superiori anno 1655. magno successu in pulveris formam reductum cum aqua convenienti exhibuit ægrotis lue pestiferâ, quæ totum Belgium depopulabatur, correptis, ut aut illo convaluerint qui principiis obstitere, aut leviora experti symptomata morbum facilius tolerarint, aut certum exitum in aliquot dies distulerint. Tanta ejus in Gronlandia est proventus, ut ex Unicornu isto

varia instrumenta conficiant, jacula variae magnitudinis, pecten, cultros, piscatoria organa &c. quæ cum tribus feminis Gronlandicis ad nos per dictas naves delata sunt. Olim in Dania Episcopi Nobiliores ex Unicornu isto Groenlandico baculos suos Episcopales confici curarunt. Vidi Roeskildiae in Templi Cathedralis sacello hujusmodi scipionem ex Unicornu juxta magnitudinis, quem ferunt fuisse Episcopi Lucij, pretiosissimum illis seculis & magno ære redemptum, jam verò Augusto Regis nostri Clementissimi musæo dedicatum.

HISTORIA V.

Ex Æthiope natus.

ÆThiops Cerdo in Ergastulo Hafnienſi detentus, amore puellæ servæ accensus, clanculum illam compressit. Gravida inde legitimo partus tempore enixa est prolem virilis sexus, quæ matrem universo corpore cutis candore referebat, solus verò penis paternum genus nigrore prodebat, quod oculati testes plures & viderunt & mirati sunt. Imaginationi matris id universum assigno, quæ partem vehementius desideratam animo fixo comprehendens ejusdem colorem foetus impressit. Mixti aliàs coloris solent foetus ex Æthiope & alba procreari, quod sæpe nobis visum, si quidem uterque sexus divisum in generatione imperium habet.

HISTORIA VI.

Anatome Hominis sani.

V Irile cadaver strangulatum in Theatro nostro Anatomico 1656, mense Februarij, publice postremum dissecuri in gratiam spectatorum omnis Ordinis honoratissimorum, in primis Medicinæ Candidatorum, qui propter Anatomica exercitia frequentes apud nos sunt. In ipsa dissectione id rarum occurrebat & insolitum, quod prorsus fuerit corpus sanum, omniaque viscera ita disposita, ut mea libenter cum illo commutassem, si utroque sano & superstite fieri potuisset. Erat autem præpinguis, Musculis pyramidalibus destitutus, quia satis robusti & carnosi Recti, in quibus tres divisiones nerveæ. Vasorum mammariorum & Epigastriorum nulla anastomosis comparuit, sed longo spacio à se distabant. Omentum obæsiusculum ad superiora sub ventriculo & hepate retractum, quod distentis à flatu intestinis videtur adscribendum. Ventriculus capax phlegmate conspersus. Vas breve unicum oblongum splenico ramo prope lienem ingredienti insertum. In intestinis nihil singulare observatum, nisi quod flatu potius quam alio humore turgerent. Hinc nec in mesenterio præpingui lactææ comparebant, nec ob pinguedinis copiam facile Receptaculum Pecquetianum distinguebatur, in Vena

K 5 Portæ

Portæ prope Hepar fibrillæ quam plures notabantur, quas Vasa esse Lymphatica nullus dubitavi. Lien palmum unum longus sanus & subobscurus. Pancreatis ductu Virfungianus solitarius. Hepar ingentis magnitudinis, coloris rubicundi elegantissimi, quod tam arctè diaphragmati prope spinam necebat, ut sine læsione diaphragmatis separari nequiverit. Vesicula fells major quoque solito, bile subflava, sed ad viridem declinante, referta. Renes magni & fani, nisi quod in unica caruncula guttulas aliquot feri purulenti continerent, & exiguum lapillum conchylii minimi figura & magnitudine, ne scilicet mortis aliquando deesset causa. Emulgens arteria sinistra bifurcata mediam venam Emulgentem amplectebatur. Spermatice vasa ex Emulgentibus omnia enata. Intesticulis nullus humor, sed vesiculæ seminales spermatico liquore diffuebant. Ureterum in vesicam implantationi affigebatur unica valvula mitralis, exiguo orificio, tam arctè claudens & concidens, ut ex Ureteribus quidem admitteret stilum, sed in vesica nullus regressus adverteretur. In Thorace mediastinum adipe visebatur repletum undique, & pericardium. Cor vastum, audax tamen homo fuerat, ut cicatrices in capite frequentes & rimæ in cranio testabantur. Uterque ventriculus cordis sanguine abundabat. Fistula pulmonum spuma copiosa impleta ex strangu-

gu-

gulatione. Musculus frontis ferè aberat, cujus vicem supplevit panniculus carnosus. In cerebri lateralibus ventriculis copiosum sebum inventum. Cerebelli autem processus vermiformis vix merebatur oculos. Cætera omnia à naturali statu nulla parte deviabant, ut si tam sana misero crucis candidato mens fuisset, quam corpus sanum, & vivendi spacium longius protraxisset, & cum plerisque de valetudine prospera facile decertasset.

HISTORIA VII.

Epilepsia ex vermibus.

Observavi in Epileptica quadam mirandas planè vermium formas, teretes, latos, ovalis ferè formæ, multipedes: Illi ut plurimum erant rubri, hi viridi lanugine investiti, duas in capite prominentias habentes, quasi essent cornuti. Biberat sitibunda in itinere sæpiusculè de obvia sibi aqua avidissimè. Veniebat ex Italia cum marito, cui in captivitate Turcica omnes pedum digiti abscissi erant, in patriam suam Bataviam tendens. Cum non procul à nostris finibus abesset, prehensa fuit tam gravi Epilepsia, ut nec aquam nec ignem præterire posset, quin statim gravissimo insultu corripereetur. Temporis progressu adeò malum increvit, ut decies, in-

interdum sedecies in die convelleretur, miserando prorsus spectaculo. Venere tandem Gottorpium, perque supplices literas impetrarunt, ut meæ curæ Princeps beneficentissimus eam ferio committeret. Cum primum eam conspicerem, non parum animo consternabar. Totum enim corpus intumuerat tam tetro colore infestum, ut similem huic nunquam viderim, fuscus erat viridi dilutiore permixtus. Examinata à me paulo accuratius, statim morbi mincræm cognovi. Exhibui itaque præmissis præmittendis ea Antepileptica quæ specifica virtute ad Insecta exterminanda valerent; Referebat enim se statim post aquas improvidè ingestas pejus habuisse, ventris continua tormina persensisse, colorem corporis sensim sensimque degenerasse, & antequam Epilepsiâ corripere, sensisse semper in sinistro latere motum viventis cujusdam animalis. Movi dictis aliquid, sed nihil promovi, donec tandem Pilulas meas Mercuriales propinarem, quarum usu aliquoties repetito tantam multiformium vermium copiam deiecit, ut numerari haud protuerint: primi erant longi, rubro colore præditi, postmodum sequebantur minores semper, lati, virides, ejusdemque coloris quo infecta erat totius corporis cutis. Quamprimum hi hospitio suo exturbati fuerunt, Paroxysmi quoque Epileptici desinere, relictæ ingenti virium imbecillitate, quæ medi-

medicamentis Restaurantibus victuque Euchy-
mo paulatim fuerunt restitutæ, ita ut intra duos
menses afflictissima hæctenus mulier sana & in-
columis ad patrios lares reverteretur. Ita ad me
perscripsit D. Joël Langelotius Archiater Gottor-
pianus meritissimus, Amicus meus honorandus.

HISTORIA VIII.

Calculus ex scroto suppurato.

Post gravissimos dolores è vesica pueri Scani-
ci quadrimi in scrotum calculus protrudebatur
Anno 1628. exinde verò suppuratione facta fo-
ris rejectus, remanente fistula, per quam continue
urina exsudabat, vixitque hoc symptomate uri-
næque per fistulam stillicidio ad annum 1654.
Rotundus ille erat calculus & globosus, candi-
dus cretæ instar, sed durus solidusque, exterior
ramen cortex seu lamina nonnihil ad flavum co-
lorem vergebat. Mater lapidem cum puero cal-
culoso ad D. Nicolaum Fossium incomparabilem
Medicum nostrum detulit, cujus non degener
filius D. Janus Fossius amicus meus eundem lapi-
dem Augusto Reg. Maj. Musæo submissè dica-
vit. Longus est pollicem, rotunditati autem ali-
quid deest, quippe quod effractum est, parentes
puero ad comminuendos alios calculos exhibue-
runt.

HIS-

HISTORIA IX.

Emplastra magna.

IN tumoribus obfirmatis emolliendis commendantur luta thermalia, ea tamen cautione, ut 1. liberali imponantur manu, ne utique parca. 2. diutius in parte immorentur, minimum quatuor horis mane, totidemque vespere. 3. Ampliori spacio non partem tantum affectam, sed vicinas infra & supra tegant. Par ratio sit in Emplastris, quæ, ut emolliant induratas partes, non per lacinias, sed fusius applicentur. Hoc artificio circumforaneos nonnullos miracula videmus præstare in Tumorum curatione, quum tamen trita remedia & nota lippis tonsoribusque Emplastra ad usum suum revocent, variato applicandi modo, quippe emplastra non brachio v. g. circumdant, sed versa vice brachium emplastris involvunt. Ita amphoræ emplastris inductæ & incrustatæ impositum hominem tumoribus scatentem feliciter sanatum monuit me Io. Dom. Sala summus noster Patavii in Praxi Dux.

HIS-

HISTORIA X.

Anatome Monachi.

Monachus Franciscanus, olim Ebræus, ex febre lenta & respirationis difficultate post menses aliquot, cum delirio ad plures abiit. In cadavere aperto visi nobis sunt pulmones lividi & exsuccii. Lien cœruleus & exilis. Intestina hinc inde inflammata, sicut & interior vesicæ facies. Nihil tamen in urina viventis vitii comparuerat. Cætera sana videbantur, nisi quod torius corporis habitus fuerit extenuatus.

HISTORIA IX.

Lapides per alvum excreti.

LApillum ferè triangularem, durum & subflavum ad me nuper misit Ioël Langelotius Vir curiosissimus, quem attulerat ipsi vicinus ejus, affirmans se tres hujus generis excrevisse paulo postquam ipsum Deo benedicente à magna Pulmonum hæmorrhagia liberasset. Inquisivit quidem in horum lapidum excretionem scrupulosius, sed aliud non comperit à vicino, quam dolorem

rem quendam, obtusum in intestinis prius obortum, mox cum ad excretionem stimulare Naturam, nec posset fractus viribus lecto surgere, supposita pelvi huic usui accommodata, sensisse se aliquid duriusculi per sedem exire, lustratisque fecibus tres lapillos inventos. Fortasse calculi illi cum alimentis fuerunt assumpti, sicut hujus notæ plurimos in gallinarum ventriculis invenimus, vel ex crassis succis & calore intestinorum in lapideam duritiem concreverunt. *Galenus* l. 6. de Loc. Aff. c. 2. id nec vidit, neque alium qui viderit, unquam audivit.

HISTORIA XII.

Grucis Anatome.

GRus mensæ Regiæ destinatus quum cultum sectoris, clavicula firmiter ossi pectoris adhærente, eluderet, jussu Augustissimi Regis nostri ad ædes cl. V. D. *Simonis Paulli* nuper deferebatur, ut examinatis interioribus ossa artificiosa manu exsiccata compingerentur in sceleton. Ad spectaculum me invitavit solita sua humanitate laudatus Vir, mihi amicissimus. Visa nobis ibidem non pauca, quæ repetitam memoriam hic merentur. Clavicula in aliis avibus à pectoris osse libera, hic firmiter sterni connata erat.

erat. Sternum ipsum non simplici cavitate præditum erat, quemadmodum in Cygno observavimus, notavimusque Cent. 2. Hist. 79. Ad asperæ arteriæ oblongæ recursum, sed varijs ambagibus intus patebat. velut labyrinthicis flexibus, per quos incurvato ductu serpentis instar arteria sursum deorsumque ferebatur, jucundo plane & admirando spectaculo. Aspera arteria secundum colli longitudinem recta ad dextram sterni partem, protendebatur, illi deinde se insinuans immergebatur in sterni tubulum dextrum, qui aliquot gyris circumvolvebatur, donec ad sinistram exitum quæreret, & ad pulmones vergeret, præfixo tamen osse hyoide, quale in Cygno descripsimus. Tubuli hi sterni amplii erant pennæ anserinæ capacitatis, invicem distincti, per quos liquor quicunque cum sibilo distinctus ingrediebatur & egrediebatur, ut eadem ratione aer ad clangorem obambulet. In mesenterio id singulare erat, quod intestina mesenterio stellæ instar adnecterentur, radiis inæqualibus. Quinque radii longiores intestinorum protendebantur ex mesenterio, & totidem breves, alternatim sibi succedentes, quasi radium marinum videres, majoribus minoribusque eminentiis conspicuum. Præterea duplex intestinum cæcum, quemadmodum & in Cygno vidimus longum satis utrinque exporrectum. Nulla vesicula fellis, nec ullus in corpore adeps. Cætera non attinet hic referre, quæ aliis avibus communia

munia vidimus, & de cœco duplici, ejusque usu multa commentabitur laudatus vir in *Flora Latina* aucta.

HISTORIA XIII.

Aceti vires Alexipharmacæ.

NOlo fabulosas aceti vires recensere, quas veterum nonnulli extollunt. Saxum rumpere *Plinius* tradit, & de Hannibale nota apud *Livium* l. 20. traditio, qui Alpium

Diduxit scopulos, & montem rupit aceto.

ut *Juvenalis* Sat. 10. utar versiculo: Sed fabulæ huic laborem inclusit vetustas, quod nempe magna difficultate Alpium invias vias perruperit Annibal: Unde enim tanta aceti copia, quæ viam sterneret exercitui instructissimo. Scio ex *Ælio Spartiano* Pescennium Nigrum jussisse ut aceto miles in expeditione universus esset contentus, sine vino: Cæterum sitis necessitati ita consulebatur & viribus, neque tantum aceti poterant secum inter alias sarcinas vehere, quæ & necessitati sufficeret, & montium solutioni. Vini istud vitium in remedia transit, autore *Plinio* l. 23. c. 1. Fusius ea persequitur *Galenus* l. 1. de Simpl. Med. Fac. Nos Alexipharmacam vim imprimis miramur, quam in aceto deprehendimus, putredini adverso, quamvis ex vino corrupto credatur
gene-

generari. Aceto rosaceo naribus carpisque applicato per aliquot dies in summa virium dejectione fugienti vitæ remoram injectam non semel vidi. Quo fine & Aquam Analepticam Rulandi ingreditur. In pestilentia summum nonnullis est remedium. Novi quos solum acetum rosaceum ore sumptum carpoque illitum à peste præservavit. In eadem lue acetum Bezoarticum omne tulit punctum. Alii nostrates grassante contagio, aceto calendulæ solo se muniverunt, & incolumes evaserunt. Vermibus quoque & putredini resistit, non simplex tantum, sed aliis mixtum, ut passim Medici experti sunt. *Dioscorides* l. 5. c. 21. aurium vermes instillatum necare testatur, & adversus omnia venena esse efficax. *Celsus* l. 6. c. 27. ex casu cujusdam pueri didicit ab aspide ictum aceto curatum esse. His contraria videtur recentiorum observatio, inprimis *Dom. Panaroli* Medici Romani, qui *Pent.* 4. Obs. 36. microscopio observavit in omni aceto vermes esse, inprimis rosaceo, & quo acrius, eo copiosiores vermes fluitare figura oblonga, tenues, cum parvo capite, enecarique si aceto vel vinum vel Theriaca misceatur. *F. Pona* Prol. 8. Saturn: Vermes velut argenteos natare vidit pisciculorum instar, qui recedente aceto vitro adhærent. Ut autem utile acetum in peste, & febre maligna conficiatur, theriacam aceto mixtam in vase clauso per mensem soli exponit *Panarolus*, semel in die agitando, & postmodum relin-

dum relinquendo ut Theriaca in fundo remaneat, quo peracto diligenter decantat & ad usus laudatos servat. Mirabar cum legerem, quomodo vermibus scateret acetum, quod vermibus enecandis est opportunum: Excusabam tamen quicquid animo conceperam, quod vermes in pulverem attritos lumbricorum remedium scirem, ictui scorpionis scorpionem mederi, viperinam carnem venenis extrahendis esse commodam. Sed vermes non credidi, qui filamentorum specie in microscopio mihi ante oculos obversabantur. Filamenta illa aceti impuri, facile oblevitatem moventur, & fundum petunt. Inter has cogitationes commodè Io. Nardii Noctes Geniales offeruntur, qui Noct. 1. p. 75. microscopio in aliquibus aceti generibus vermes, in aliis nullos observavit: Vermibus enim scatere illa aceti genera, quæ ex vappa aut debilibus è vinis confecta fuere, unde nova potuit excitari putredo, reliqua verò ex generosis vinis penitus vermibus carere. A vermibus quomodo omnis aceto esse possit, non capio, quum enecatis illis acetum mordax maneat. Idem experimentum succedere si acetum aquæ limpidæ miscetur, me monuit frater D. Erasmus Bartholinus, fluitare enim longiusculos vermiculos in vitro & manifestè cerni.

HIS-

HISTORIA XIV.

Superfætatio rara.

Varia superfætationum exempla recensent *Rossetus* de Part. Cæs. sect. 6. c. 7. *Baubinus* in Append. 6. *Raynaudus* de sect. Cæs. c. 11. *Schenchius* l. 4. Obs. 126. causamque reddit *Hippocrates* l. de superfæt: In quibus exiguum tempus inter primi secundique fœtus exclusionem intercessit. At per annos superfætationem supputare, & primum diutissimè in utero hæsisse excluso posteriore fœtu, inter rarissima numeramus nullo scripto signatam. Mira tamen superfætatio in Venda urbe Livoniæ mulieri honestæ supervenit seculo superiori, quam à memoria nostra remotiorem, hætenusque sepultam in publicum protraham, lectu dignissimam. Uterum primo conceperat, & instantibus partus legitimi doloribus, nihil enixa est. Anno sequenti iterum gravida, justo puerperii tempore, masculum edidit. Anno demum insequente, morbo correpta primum conceptum exclusit, sed per partes & ossibus per vires exeuntibus. Superaret res fidem nostram, nisi publico instrumento Magistratus auctoritate sua firmasset, quod in pergamena sigillo publico munitum mihi exhibuit Vir Excellentissimus D. *Iohannus Below* Archiater Magni Moschoviæ Ducis experientissimus. Ut omnia sint lectori

certiora, verba autographi sistam ex Germania in Latium traducta.

Nos Consules & Senatores civitatis Venden, notum facimus omnibus & profitemur publicis his nostris literis, siquidem singulari providentia DEI Omnipotentis Patris nostri, præteritis annis in urbe nostra superfætatio (cujus icon præxa) cuidam civis nostri uxori contigit, ut omnibus fidelibus DEI omnipotentia innotesceret, & in periculo anxietateq; constitutis mulieribus certa firmaque spes in hac miseriarum valle afflueret: Nos nostri officii putavimus tantum DEI miraculum non silere, sed toti mundo propalare, ut in omnibus periculis malisque mortales discant soli DEO potenti fidere, spes suas illi soli commendare, in vera fide & pietate, qui omnia pro paterna voluntate, nobis profutura, novit disponere & communicare, quod evidentissimè testatum fecit in hac nostra cive, quæ unicè spem & in miseriis auxilium in DEO Immortali collocavit felicissimo eventu. Civis laudata anno quinquagesimo sexto instantibus feriis Pentecostes primum ventris onus sentijt, quod ad consuetum tempus gestavit, instante verò partus termino, quum signa parturientium mulieribus nota adessent, nullus tamen fœtus prodiit, quos dolores parturientium ad tertiū diem pertulit, ut non tantum præsentem feminæ desperarint, sed & puerpera ipsa maximo angore correpta, quod apud se quivis facile

æstimabit, Deo se totam commiserit, atque ita fœtus præsens in utero remansit. Anno sequenti, non obstante priore conceptu, iterum gravida. Anno seculi quinquagesimo octavo circa quadragessimale festum, filium enixa est completum pinguiusculumq; inter ossa prioris conceptus annuo ferè spacio delitescentem, qui ne unica hora superstes fuit, quippe per octo integros dies in difficili hoc partu hæsit mater dolorû plena antequam ex ossibus prioribus eluctari infans potuerit. Anno sexagesimo primo ante ferias Natalitias morbo gravissimo correpta mater, quum ossa primi fœtus in utero dimoveri cœperunt, & maximo cum dolore per partes sensim ex utero prolabi, primû minora, post majora, duravitq; ista ossium excretio à termino dicto anni sexagesimi primi, ad Quadragimas anni sexagesimi secundi, quum ultimo loco ossa cruris maxima tanta difficultate excrevit, ut ferè in vitæ incurreret periculum. Sex annos continuos ossa hæc fœtus in utero suo gestavit civis nostra, quæ deinde prodierunt cum maximis doloribus & cruciatibus, sicut facilè quivis novit, aded ut ex liberis quidam octo annorum mulieri huic tantis angoribus pressæ in ventrem se projecit, inquiens: Ah mater! utinam tantos cruciatu, morbos & mœrores liceret ex corpore tuo exfugere, libenter pro te perferrem; quod mater magno cum gaudio audivit, & filii amorè deprecavit, quo etiam factum est, ut constanti illius fi-

de permotus DEUS omnipotens, clementer ex his miseriis illam extraxerit & ægritudines septem annorum sexagesimo secundo seculi anno depulerit, ut prædicta mulier pristinam valetudinem recuperaverit, & adhuc integrâ eâ fruatur. Illi soli, omnipotenti DEO sit laus, honor & gloria pro tam immensa paternaque gratia, bonitate & misericordia, quem supplices veneramur, velit omnibus miseris, oppressis, infirmis & in periculo constitutis auxilio suo adesse, in sui nominis gloriam & nostram salutem æternam, Amen. Hæc omnia acta sunt & completa supradictis annis in nostra civitate Venden in Livonia, & Lubecæ Imperiali civitate libera anno hoc sexagesimo sexto divulgata. In rerum dictarum fidem certiore præsentis literas civitatis nostræ sigillo munivimus tertio die Augusti, anno dicto.



Appicta est huic autographo figura ossium solutorum, eo ordine quo ex utero prodierunt, separata, singula, & soluta suis compagibus, Primum locum capitis ossa occupant numero 23. succedunt claviculæ & scapulæ, mox costæ effigiata cernuntur, & brachiorum ossa, tum ossa coxendicis, crurum, pedesque. Quod verò miror, est spinæ dorsalis defectus, quæ forsan in utero remanens morbi insequentis occasionē dederat.

rat. In universum ossa excreta numerantur 71. Altera figura foetum alterum ostendit, qui integer secundo partu naturali exclusus fuit. Carnosus is est, & boni sanique coloris, quinque palmos longus, duosque latus, si brachia lateribus applicata adjungantur. Difficile dictum est, ubi prior conceptus delituerit, in superfætatione sequenti. Qui uterum humanam bipartitum credunt facilius se expedient. Rara vero ea est uteri fabrica in homine quæ in brutis, ubi, quia plures foetus generant, per cellulas distinguitur uterus. Talem tamen uteri conformationem in quadam puella circa annum 1565. Lugduni observavit *Ioh. Bauhinus*, ut testatur frater incomparabilis *Casp. Bauhinus*. in App. ad Ross. *Riolanus* quoque notat l. 2. Anthrop. c. 35. anno 1615. mense Junio in oppido Steinio milliari ultra urbem S. Dionysii, hermaphroditam à se dissectam, duplicem habuisse matricem, mediano pariete secretam. Linea simplici uterinum corpus dividi per medium observavi. An verò duplicatus in hoc muliere Vendenſe fuerit uterus, ignorare cogor, quia post mortem dissecta non fuit. Non sanè necessarium id existimo, siquidem in superfætationibus, quando interjecto tempore & conceptus sit & partus, singuli foetus suis membranis includuntur, uterique loco separato adhærent, ut excludi unus possit remanente altero, secus ac contingit in gemellorum partu, qui sola

membrana acquiescunt, unoque loco juncti includuntur. Forſan prior conceptus in tuba uteri delituit, poſterior verò in utero, unde prius in lucem prodiit. Nam in tuba uteri conceptus quoque factos variis exemplis demonſtrat *Ioh. Riolanus* in *Anthropographia*. Impeditus prioris partus fuerat, ſive matris imbecillitate, ſive foetus ipſius, ſive arctioribus vinculis, ſive denique membranarum circumvolventium robore, quæ inſtante partus tempore diſrumpi non potuerunt, unde accedente ſive putredine ſive intemperie ſicca calidaque abſumpta caro nuda oſſa reliquit in utero, ſequenti demum anno excluſa ob auctam membranæ exſiccationem & diſruptam, roburque matris auctum.

HISTORIA XV.

Viperarum ingluvies.

GUloſiſſimos animalium ſerpentes *Ariſtoteles* dixit, quia obvia quæque etiam magnitudine conſpicua devorant. Vidi in Muſæo Auguſto Sereniſſimi Regis noſtri ſkeleton viperæ noſtratis à *D. Petro Bulichio* Archiatro Regio conſtructum, quæ buſonem deglutiverat, cujus etiam ſkeleton alteri neſcitur. Vidi quoque *Helsingoræ* apud *Sylveſtrum Pharmacopæum* induſtrium

vi-

viperam nostratem exsiccatam , quæ quatuor alaudas cum plumis in ventriculo congefferat adhuc ibidem conspicuas. Ova integra & lacertos deglutivisse , & passerem cum pennis observatum *M. Aur. Severino* in *Vip. Pyth.* c. 12. Quanquam enim angustum videatur illis corpus & os non adeò amplum , rictus tamen diductior est , & gula valdè dilatari potest pro excipiendis grandioribus esculentis. Gula ipsa membranosa robustior , ut distendi possit & ampliari, præsertim ubi assumpta facilè cedunt & comprimuntur , ut ranæ , aves juniores, lacerti, &c. Ranas dexteritate quadam deglutiunt , caput enim primum intrudunt , pedibus ad posticam partem compressis , qui deinde corpore compresso facilè succedunt , quod aliquoties in prædio Rodiano fratris mei amantissimi *Bartoli Bartholini* Regii Eloq. Professoris observatum.

HISTORIA XVI.

De Pane observationes.

PANIS commune est alimentum & perutile tam hominibus quam animalibus. Soli accipitres ingesto pane moriuntur , sive quod durities panis comprimendo asperam arteriam stranguet,

gulet, sive quod occulta antipathia illis adverte-
tur, nam multa sunt nobis amica, quæ animalibus nonnullis nocent, ita baccæ sambuci gallinas enecant, quod malo suo rustici nostri sæpe experiuntur. In medicamentorum censu quoque venit. Pane solo in itinere suo Brutus à bulimo curatus. *Plutarchus* etiam auctor est, equos & asinos hac affectione correptos, oblato pane statim è terra surrexisse & ad consuetum iter reversos. Experiuntur id aurigæ nostri, qui de lassatos equos pane recreant. Odorem ejusdem in nimia ciborum appetentia cum lipothymia commendat *Galenus*. Certè in metu syncopes optimo successu panis vino vel aceto maceratus naribus apponitur, & ventriculo roborando tam intus sumptus quam extra impositus confert.

Panis ex variis herbis fructibusque conficitur. Notissima panis genera tricum, secale, hordeum, avenam recipiunt, de quibus veteres recentioresque consulantur. In montibus Appenninis ex Castaneis, quarum copiosus ibi proventus, panis pinsitur candidus & sapore dulcis. Ex iisdem cum lacte & jusculo cibum gratum coquunt. Ex amygdalis, juglandibus, nucleis pinus & pistaciis commodus est panis atrophis laborantibus. Semina plantarum salubrium quæcunque in massam panis compingi possunt eadem facilitate & felicitate qua hordeum, tricum, &c.

Salu-

Salubrior certè foret panis ex feminibus lactucæ, quam acetarium ex cruda lactuca. In Norwegia ex corticibus arborum placentas solidas durasque conficiunt incolæ, ubi parciore est frumenti proventus, quemadmodum Æthiopes circa promontorium Bonæ Spei ex piscibus sole exsiccatis panes sibi conficere feruntur frumenti inopia. Iisdem exsiccatis piscibus Islandi vescuntur loco panis. In insulis Feroensibus quoque, ubi sterile est solum propter rupium frequentiam, at inter rupium asperitatem si tantillum terræ emineat, tam uberi proventu commissum hordeum reddit, ut ex unico semine quinquaginta & amplius spicæ exsurgant totidemque aristæ glumis seminibusque secundæ. Urgente durissimo necessitatis telo ex paleis panis conficitur, quod in obsidionibus peropportunit. Fuit nuper qui pro secreto habuit trabes asseresque, quibus in obsidionibus famem sedari posse existimavit. Singulare divinæ bonitatis est argumentum, quod in annonæ defectu subinde ad solatium mortalium frumentum depluat. Tale collegerunt incolæ Wustenhansani in Marchionatu Brandenburgico, & in urbe Neustad & Pörlitz paulo ante festum Paschatis seculo superiori, ut publici Annales testantur. In Scania nostra nuperis annis similis frumenti pluvia observata, sine dubio aliunde per ventos transportato frumento, nam propter

solis

solis calorem & ventorum siccitatem assatum videbatur quasi in clibano tostum. Commis-
sum autem terræ, copiosius quam pro terræ
nostræ consuetudine emergebat. Visum præ-
terea prioribus annis in patria arboribus frumen-
tum inhæsisse & germinasse in summa annonæ
penuria, sive cœlo delapsum, sive per aves ad-
portatum, quemadmodum ex furtivis avium
feminibus aliæ herbæ in arboribus, muris, pa-
rietibusque, florere observantur. *Plinius* l. 18.
c. 18. auctor est, quo anno superatus est Anni-
bal, in arboribus nata frumenta. I. *Obsequens* quo-
que l. de Prod. Bononiæ fruges in arboribus na-
tas memorat.

HISTORIA XVII.

Pus & sanguis sine pthisi.

EXspuunt non semel statis temporibus qui-
dam cum pure sanguinem, nec tamen pthi-
fici sunt, nec ulcus ullam in pulmonibus ha-
bent. Hujus census tres novit *Sala* præceptor
meus, quorum duo expuerunt statis vicibus pus
& sanguinem, sine pulmonis ulcere, quippe
sanati sunt & benè valuerunt, tertius adhuc vi-
vit sanus, nam ex rupto abscessu in thorace per
pulmones quidem expurgata est materia, sed
sine ejus læsione, quod in cadaveribus duorum
disse-

dissectis eidem laudato Viro apparuit. Adest quidem in hujusmodi impedita respiratio, febrisque lenta, sed absterfo pure & exsiccato ista signa disparent.

HISTORIA XVIII.

Anatome febricitantis.

CONquerebatur quidam aliquot abhinc annis Patavii de febricula, nullis remediis cedente. Dolor tandem successit in hypochondrio dextro, tumorque jecoris cum difficili respiratio-
ne. Existimabat non nemo esse inflammatio-
nem jecoris : contra Sala noster, esse jecoris abscessum divinabat, qui se per venam cavam in thoracem expurgaret, unde difficilis respira-
tio & copia puris. Post paulò æger morti cessit. In aperto cadavere ingens abscessus in jecore in-
ventus, unde prorsus computruerat, & totus venæ cavæ ramus superior illo pure repletus cer-
nebatur, thoraxque humiditate ista abundabat.

HISTORIA XIX.

Vomitus Bufonum.

SUPERioribus annis Altenburgi miserè vexaba-
tur paupercula puella periodica bufonum in
ven-

ventriculo generatione & eorundem per vomitum rejectione. Dignissimam posterorum memoriarum historiam ad me misit vernacula lingua Vir insignis D. *Ioel Langelotius* Achiater Gottorpianus, manu Medicorum assistentium D. *Ioh. Michaelis* Prof. Med. in Acad. Lipsensi, & Archiatri Saxo Altenburgici, ut & D. *Iosephi Clauderi* Medici Aulici ibidem signatam & confirmatam, quam breviori sermone ad me quoque Lipsia perscripsit Cl. V. D. *Michael Lyserus* Prof. Lipsensis, amicus meus. Actæ rei seriem paucis pertexam, laudatorum Virorum ductum sequutus. Catharina Geileria ancilla 30. annorum, temperamento cholericò & sanguineo, grassante in urbe contagioso morbo, à Domina cum morbo eodè affligeretur, in vicinam villam mittitur, sed ab incolis pagi metu infectionis non admittitur. Exclusa igitur hospitio pratum eligit, ubi circa acervum fœni profundo somno lassâ opprimitur. Excitata somno nescio qua tempestate oborta, siti urgente aquam in loco vicino stagnantem avidius haurit. Cessavit quidem hinc morbus, quo tenebatur, sed non omni parte sana evasit, siquidem verno tempore recurrebant morbi reliquia & sanitatis fractæ indicia, cum alvi torminibus, cardialgia, inappetentia, dolorifico quodam intra corpus velut viventis animalis motu, nec præter aquam, lac ebutyratum & fructus horarios quidquam in cibis assumere

mere potuit. Menfes interea fuppreffi, fruſtraque tentata venæ ſectio & cucurbitulæ, nam motus ille velut animantis progredientis in corpore & quaſi unguibus lancinantis ſenſim auctus eſt. poſt biennium 25. Jun. 1647. ſuaſu Chirurgi ad ſudorem ſe compoſitura in aqua fumarix parum Mithridatij ſumſit, unde poſt bihorium graviffimas perpeſſa anxietates, vomitus, ardores, & cum periculo vitæ buſonem magnum duosque parvos cum duobus lacertis viridibus per os rejecit, quo tempore *D. Joſephus Clauderus* Medicus Saxo Altenburgicus accitus neceſſaria tum corroboracionis, tum infectorum expulſionis gratia præſcripſit. Hinc ſequenti die tres mediocris magnitudinis ſeptemque buſones parvos partim vivos partim mortuos rejecit. Interea Bezoardicis & ſpecificis contra vermes pugnatum eſt, donec 12. Julij unus prægrandis & duo parvi buſones mortui expulſi eſſent. Tum in conſilium advocatus Vir Celeberrimus *D. Thomas Reineſius* Phyſicus ordinarius cum laudato *Claudato* neceſſaria tentavit remediorum genera, ſed tota iſta æſtate nullo amplius infectum obſervarunt, quanquam ſtrenuè tam per ſuperiora quam inferiora medicamentis educta ſit materia. Tandem *D. Iohannes Michaelis* ſpecifica ſua medicamenta ſuppeditavit. unde 19 Septembr. fruſtulatim cum excrementis naturalibus aliquid excretum fuit, de quo dubitatum, an lacerti aut buſonis fuerit portio.

M

De

De cætero mediocriter valuit.

Auno 1648. mense Martio denuo quasi sursum repentia animalia sentiens, assumptis aloeticis Bezoardicis in magna quantitate, tria animalia ranis similia, colore luteo, maculis nigris ac griseis variegato, vomitu cum magna aquæ, pituitæ & spermatis ranarum copia Julio mense reddidit, posteroque die decem minora sequuta sunt, sed mox in matula mortua. Deinde per autumnum & hyemem mediocri utebatur valetudine.

Anno 1649. mense Januario, lactis ebutyrati appetitum maximo correpta duas libras ejusdem lactis frigidi uno haustu absorbet, cujus impatiens ventriculus, cum quinque animalibus mediocris magnitudinis idem lac revomit. Mense Martio curatio redintegrata. 18. Aprilis, duo grandiora & unum exilius excrevit. Altero die, ope Mercurij magna spermatis ranarum successit copia. 20. Junij, decem & novem recens nata exierunt, qualia solent per pluvias decidere. In usu autem medicamentorum æstate & autumnno persistit.

Anno 1650. Mense Martio iterum curationem aggressi sunt Medici laudati, multumque spermatis, sed quinq; tantum animalcula eduxerunt per vomitum, quæ ipsa ægra manu è faucium angustiiis protraxit, ut nonnullis intestina per vim sint elisa.

Annis

Annis 1651. 1652. absente Medico *Claudero*. & medicamentis propter inopiam destituta, nihil per os reddidit, nisi parum aquæ citrinæ cruentæ & amaræ.

Anno 1653. querelis ejus permotus D. *Clauderus* denuo curam suscepit, & succum expressum Iridis nostratis potissimum exhibuit, unde 24. Martij plurimum aquæ virentis instar succi herbæ expressi ultra sex libras cum spermate multo reddidit. 9. Aprilis, iterum multam aquam & pituitam cum semi corrupto animali vomitu rejecit. 20. Aprilis duo animalia copioso muco involuta evomit. 22. 23. & 24. Aprilis continuatus succus Iridis nostratis. Hinc 25. Aprilis mane sex animalia rubris maculis insignita, egrediebantur ranarum more coaxantia. Duo ex his lacti immersa per diem vixerunt, reliqua quatuor vino injecta subito tumefacta obierunt, quæ dissecta nihil singulare monstrarunt, nisi quod unius ventriculus repletus fuerit 30. & amplius vermiculis nigricantibus alatis. Hinc invento genuino alexipharmaco, continuatoque usu vini Rhenani & spiritus Vini, aliorumque specificorum, mense Majo plusscula animalia semi putrida & valdè færentia per partes rejecta sunt. Interim in ventriculo gravitatem sensit, quasi massam conglobatam contineret, omnesque cibos etiam hætenus amicos aversabatur, sive nausea corporum

rum heterogeneousorum, sive quod in coquendis dissolvendisque animalibus occuparetur. Exhibitum tamen est vinum, spiritusque vini à Panchymagogo Medicorum assistentium abstractus cum Spiritu Vitrioli, unde tandem mense Junio copiosè horum animalium frustra, pedes, ossa, intestina, duo capita magna per vices educata sunt.

Anno 1654. & 1655. ab animalibus nulla ipsi molestia. Vomitu tantum & secessu nonnulla exilia officula prodierunt. Ex hoc tempore pedum tumores & exulcerationes passa est, tumorque adhuc perdurat, difficilis sine dubio curationis, siquidem his annis menses sunt suppressi frequenti usu medicamentorum. Vivit interim valetudinaria, lana victum quæritans, cerevisiam potat, aliosque assumit cibos quos antea ægrè expetebat.

Ad Calculum si reducantur excreta animalia, octuagesimum numerum superabunt, præter ossa, aquam, mucum, sperma, aliaque his annis rejecta. Quin seminarium horum animalium cum aquis haustis intra corpus sit receptum, dubitari non potest, quod sæpe aliàs observatum. Auctum illud in corpore à bufonibus, excrementa docent, quibus semen ranarum subinde fuit admixtum. Curatio denique testatur naturalem bufonum fuisse generationem: Nihil enim vino & spiritu vini præstantius ad enecandos in corpore vermes, quibus etiam in lumbricis felici
suc-

successu utimur. Vermes enim quicumque vinum averfantur, fugiuntque ex antris terræ, vino irrigatæ. Quo loco hæserint, difficile dictu. Si in cellulis intestinorum, vel cæco intestino immorari nequiverunt, sine dubio folliculis inclusa ventriculi membranis humidioribus sese affixerunt, quibus ruptis adulta prodierunt. Ad incantamenta reducerem si superstitioso esse liceret. Varia hoc Dæmonum astu corporibus humanis inducuntur, ut alibi demonstratum. Sed piam hanc esseferunt, sæpiusque devota mente sacra cœna privatim usa est, quia publico piorum cœtu propter urgentia symptomata abstinuit, ita referente ejus Confessionario. Ego certè libentius causis naturalibus manifestis raros hujusmodi casus assigno, quam miraculosis, ne Dæmoni plus quam Naturæ, ejusque Autori omnipotenti, tribuatur. Fallit vana specie Dæmon & umbra ludit; ejusque Magi, ut loquitur *Lactantius* l. 2. de Orig. Err. c. 15. Visus hominum præstigiis obcæcantibus fallunt, ut non videant ea quæ sunt, & videre se putent illa quæ non sunt. At veros bufones ex faucibus extractos, ægra manibus experta est, Medici astantes viderunt, & dissectio indubitatam fidem fecit.

HISTORIA XX.

*De septo cordis pervio experimentum,
& Anatomæ Hydropicæ.*

LAudandum illorum studium qui cadavera eviscerant, præsertim morbo denata. Sedes enim morborum ita optimè investigantur, quas Anatomæ hujus imperiti conjectura rarò assequuntur. Itali Gallicque & Belgæ his sectionibus præclaram operam locant, quos Nosodochia instructa invitant. Nos in Dania eandem sectionem strenuè urgemus. Neque Germanis sua laus ex isto studiorum genere deest. Miramur enim Plateri, Horstij, Salmuthi, Hildani, aliorumque labores. His succedere alij quibus parem felicitatem opto. Excitatus præclaro illorum exemplo Vir doctus pariter & curiosus D. Brodbeck in Academia Tubingensi Professor meritissimus Hydropicam aperuit, mihiq; per Cl. V. M. VVilh. VVormium observationes sequentes transmitti curavit.

Femina quædam in pago præfecturæ Tubingensis, cum imprægnationis suspicione intumesceret, spe delusa, in hydropem incidit, quo etiam juvencula adhuc laboravit. Variis interea symptomatis exagitata post triennij decubitum vitam finivit. Susceptâ itaque præter lapso Februario sectione, apparuerunt sequentia notatu digna.

1. Exhausta colluyie aquarum denudata fuerunt
inte-

intestina, & viscera infimi ventris omnia, exceptis renibus testibusque, se vaceo adipe, steatomatis instar, incrustata, ut visum effugerent.

2. Ex adipis crassitie intestinorum cavitates, angustas in morem, coarctatæ erant.

3. Stomachus cataphracta eadem vestitus se coarctare nequit.

4. Hepar diaphragmati mediante sevo illo arctè adhærebat. Parenchyma ex sanguine, semiputridum, contractum ac subnigrum apparebat.

5. Thorax apertus omni aqua destitutus erat. Pulmones verò undique costis ac diaphragmati adnati, & per superficiem externam grandinibus albis atque se vaceis, tanquam margaritis, confiti, plus tamen hic sanguinis quam in jecore aut liene inventum.

6. Cor pericardio planè denudatum, quod & semel *Columbo* observatum. Dextra auricula circa venæ arteriosæ orificium aneurysmatis modo ultra juglandis magnitudinem distenta erat. Sinister thalamus durior, crassior, tumentiorq; sanguinem grumosum, subnigrum ac paucum continebat, secus quam in dextro, qui adhuc purpureus erat. Frustulum quoque adiposum, subluteum, molle ac lentum in duos ramos, tanquam digitos longiusculos abiens, inq; truncorum cavitatem se insinuans, ipsis arteriæ venosæ aortæq; ostiis arctè adhærebat, eaq; occludendo sanguinis effluxum vel omnino impediverat, vel plurimum retardaverat. Hinc

7. Ar-

7. Arteriæ grumefactum eumque paucissimum sanguinem continebant.

8. Venæ succo pleniores, præcipue venæ arteriosa, & arteria venosa. Venæ etiam cordis coronariæ ac superficiariæ sanguine adhuc turgabant.

9. Ut sanguinis per septum transitus certius innotesceret, id operam dedit D. Brodbeck, ut vinculo vasis omnibus injecto, exceptâ venâ cavâ, cannam vel arundinem sambucinam, trunco hujus abscisso quam arctissimè alligaret, per quam dum cor inflare cœpit, non dexter tantum sed sinister ejus thalamus cum auriculis utriusque illico ad visum tactumq; omnium adstantium utrinque elevatus est, manifesto, ut credit, argumento, septum cordis nonnihil anfractuose cribrosum & perforatum esse.

HISTORIA XXI.

Cataracta rara.

DE Marchionissa uxore Regentis primi Curia Neapolitanæ olim cum Magno Chirurgo M. Aurelio Severino, hospite meo, consilia in commune contulimus, quæ Cataractæ initium habuit. Lumine illustrata objecta tantum videbat & splendores, subindeque velut aureas scintillas in opposito pariete. Varia pro salute ægræ remedia fuerant usurpata, sed in cassum omnia.

Inte-

Interiores palpebræ inflammatæ adhuc ruebant, & adnata tunica densior erat, humore inter corneam & albugineam impacto. Quia deponi non potuit, suadebat Severinus noster post aures vesicatorium, ad revulsionem & evacuationem, quod ex circulatione calculo meo comprobabam, deinde in futura coronali. Ulsionem Arabicam per fila. Addebam ego sectionem venæ anguli in oculo interni. Objiciebat assistens Medicus, debilitari magis oculum, nec posse resolvi à natura, quod concretum fuerat, præsertim quum non peccaret in oculo sanguis. Sed facilè respondebam, istis remediis impediri partim affluxurum sanguinem, partim affluxum evacuari, qui sine dubio visum impediabat, ut ex inflammatione apparebat, & depravabat, ut ex splendoribus & aureis scintillis liquebat, istas enim esse splendentis & incensi sanguinis indicia. Liberatam vero hoc onere naturam, promptius reliquias superaturam, si accesserint remediorum genera in suffusionum initiis consueta.

HISTORIA XXII.

Duplex Penis.

LUdit subinde natura in membris generationi servientibus, aliquando defectu, nonnumquam numero excedente quando abundantem materiam in certam formam effingit. Mirum

M 5,

non

non est, quod refert *Julius Obsequens* de Prodigiiis, *Coss. L. Furio & Attilio Sarrano*, puerum ex ancilla natum quatuor pedibus, manibus, oculis, auribus & duplici obscœno: gemellos enim intenderat Natura. At duplex colis in homine, cœtera simplici & perfecto, rarissimè observatus, ex partibus istius abundantia ortus. Quidam tamen Bononiæ aliquando dissectus, duplicem penem habuit, ut narrat *Patens* meus beatus l. 1. Institut. Anat. c. 24. Nuper admodum in Belgio puer bimulus publicè spectabatur, optimi habitus, cui penis geminus erat statim circa primum exortum è pube divisus, magnitudine pro ista ætate justâ, & sibi prorsus similis, ut nec ovum ovo, nec lac lacti esset similis. Per vices etiam per utrumque, interdum simul urinam excernebat. Testes, scrotum & cœtera omnia nihil à consueto naturæ tecessere, in penis quoque conformatione non nisi duplici numero peccaverat Natura. Vidit hunc Priapi nepotulum eruditissimus *Petrus Schumacherus*, amicus noster, ut in literis ad me testatur;

HISTORIA XXIII.

Testæ ovi Usus in calculo.

PRO calculo sive frangendo sive expellendo singulari successu exhibentur putamina ovorum exclusis pullis. Inter secreta sua hoc lithontripticum multi numerant. Testas ovorum quascunque

cunque in pulverem subtilissimum redactas non semel vidi optato eventu cum Aqua Juniperina propinatas. Rationem qui desiderat, forsan ex sequenti experimento eruet. Si ovum recens suo putamine tectum vini seu Gallici, seu Rhœnani cyatho immergatur, postridie totum vesiculis aqueis conspersum invenietur, exinde extractum novo cortice fusco obducitur, cui adhærent scilicet crystallizata, nullo sapore prædita. Cortex ille novus abradi potest, ex tartarea materia, calcis instar, conflatus. Extrahuntur hoc artificio scæces vini, sive mangonio cœnopolarum, sive vitio soli ibi congestæ, unde vinum purum putumque redditur & salubrius, quod sine damno ægri potant.

HISTORIA XXIV.

Cetorum genera.

Varia Cetorum seu Balænarum genera adduxerunt *Gesnerus*, *Aldrovandus*, *Ionstonus*, *Schoneveldius* ex Huberti Langueti & Harteny relationibus. Catalogum accuratiorem hic texam cetorum, quæ in portibus & sinibus Islandiæ nostræ, nostra memoria vel capta sunt vel visa, ex Manuscripta historia Piscium Islandiæ, quam ex Islandia Pastor curiosus ad Magnum nostrum *VVormium*, nunc cœlitibus adscriptum, nuperis annis transmisserat cum singulorum iconibus, datâ industriâ,

dustriâ , ut operæ parcerem, hic omiſſis.

Primum genus *Hnifa* dictum, tres habet species. Prima *Hnifa* est duarum ulnarum, altera *Hnifa* quatuor ulnarum, tertia *Hnifa*, *Hofrungs-nifa* vel *Hofrung*, septem, octo, & novem ulnarum. Hoc genus balenarum sæpissimè ibidem visum, dentatum, estque secundum quorundam sententiam idem cum *Haskardingur*, cujus codex legum Islandic. mentionem facit.

Alterum genus *Haa Hyrningur*, ab alto cornu dictum, ulnarum octodecim, quod codex Legum vocat *Hafuehual*, cete capri, fuerat enim res valdè controversa, cederene deberet illius terræ possessori in qua inveniebatur, an verò ei qui conduxerat terram.

Tertium *Hnydingur*, minus est, & majus. Inter majora quædam decem, nonnulla 20. ulnas æquant. Magnas Balenas dentibus petunt, iisdemque fixi adhærent, donec viribus exhaustæ moriantur, licet non rarò permulti intereant, priusquam victores recedant. Dentes habent instar canum, quorum magnitudo moli corporis respondet, reliquasque balenas ita insequuntur, ut canes cætera animalia. Sæpe ab hominibus fugantur & ad littora compelluntur.

Quartum genus *Skialldhualur* (à macula alba scutum referente) ulnarum XVIII. Midamial-cur, à mid, loco, quem piscatores à piscibus præ reliquis amari frequentariq; observant, & mioll, quod

quod candidissimam & nondum condensatam nivem notat. Hoc genus Balenæ vocat speculum Huytinga, album, crediturque injuriam sibi illatam post 18. annos ultum esse.

Quintum *Vognuhualur*. Quidam Vagna appellant ob natandi modum. XV. XVI. XVII, ulnas longum. Hoc genus Ceti valdè preciosum est, ascenditque faciliè terram si navibus & lapidum jactu urgeatur, nunquam enim nisi coactum, unum alterum deserit. Quodam tempore 40. simul offendit Pastor loci, omnesq; in littora Biar-noensia coegit. Ex respiratione inæquali facile dignoscitur. Haud celeriter natat ob pinnas difficiliore, sed pedetentim, velut phocarum genus quod resupinū fertur, dimoveretur convolviturq;.

Sextum *Andhualur* seu Andarnesia, quod rostrum habeat anati simile. XV ulnas, quæ maxima est longitudo, non excedit.

Septimum *Suinhualur*, sive Durner XXX cubitorum. Maximum XXXV ulnas assequitur. Hic cetus, ut & Andhualur, inter eos non numerantur, quibus hominibus vesci permissum, eorum namque pinguedinem concoquere non possunt, aut ullum aliud animal, penetrat enim omnia. Hic Durner dentibus præditus est optimis, nisi ob senectutem corrumpantur. Ipsius mortis causa proprii capitis moles plerumque existit.

Octavum *Burhualur*, à gibbo quem in capite habet, seu Nauthualur, ob boatum, LX ulnas longum,

longum, LXX dentes habet, omnes tamen adeo parvos, ut ex illis commode fabricari non possit quicquam, nisi calculi scacchici & cultrorum manubria. Ejus caput oleo repletum est. Immani rictu non aliter ac Bos horrendum edit boatum. Duas habet fistulas longè invicem distantes, quibus fit ut duplicem, cum respirat, in aerem mittat fumum. In plano ejus capite gibbus prægrandis, instar domunculæ eminet. Hinc credo sperma ceti copiosius exscindi, quod in Insulis Ferrensibus olim vidit socer meus honorandus Christophorus Johannæus, consul urbis nostræ spectatissimus. Naviculis damnum non infert ullum.

Nonum *Raudkemlingur*, à rubra crista, viginti cubitorum longitudine, humani generis hostis insatiabilis.

Decimum *Hrøshualur*. Superiori haud ab simile, mira humanæ carnis orexi laborans, cum ex mari in aerem profilit, grande quod habet supercilium demittitur, oculumque ipsi obturat. XX ulnas in longitudine habet. Ab hominibus non comeditur.

Undecimum *Narhvalur*, à Nar cadaver, nam ipsius caro si comedatur, mortifera est. Innocens & pacificum, ea propter naviculis non metuentum. Dentem habet prægrandem VII. ulnas longum, cujus tota corporis moles in longitudinem XX. ulnarum protenditur. Hunc dentem dili-

diligentissimè à sordibus & omnibus injuriis defendit, niveo est colore, & in morem cochlear striatus, crediturque multis pollere virtutibus, quod reapse verum deprehendimus, ut supra Hist. IV. annotavimus. Verum si ullum animal hujus ceti carnis vel minimam gustaverit particulam, velut veneno hausto, continuo exspirare creditur. Contrarium tamen habet relatio Hartenij, & aliter observatum quoque in Islandia Anno 1650. in eo cujus cranium dono serenissimi Regis nostri in Musæum Wormianum transiit, ex eo enim sine periculo Islandi comederant. Pinguedo ollæ infusa, & igni imposita, evanescit, quod aliter se habere, nunquam ullus inveniet.

Duodecimum *Skjeljungur*. à testis quibus depictum est, LX ulnarum longitudine, pingue est & hominibus esui aptum, omnium tamen Cetorum qui ab hominibus consumuntur, naviculis periculosissimum. Ex nimia superbia & feritate, naves evertere studet, quas vel pinnis percussurus aggreditur, vel in via qua necessario navigandum est, immotus præstolatur, ut necessum habeant, aut in illum impingere, aut intrepide obviam ire, & si fieri potest malum declinare, eumq; intactum præternavigare. Asperis testis non secus ac rosis aut stellis exterius ornatus est & depictus, velut reliqua Sletbakorum, qui pinnis in dorso carent, genera, quæ vulgo Ceti aquatici nuncupantur, sed minus proprie, excepto Nordhual, qui solo rore victitat.

De-

Decimum tertium *Hoddunefur*, ab incurvo rostro, seu *Slettebackur*. minor XXXV ulnas longus, omnium sæpissime captus & inventus. Hujus generis, ut & reliquos *Sletbakos*, qui esui apti sunt, venantur Hispani & Galli. Ipsorum lardum incorruptum asservari non potest. Quamprimum enim in frustra dissecatur, sive suspendatur, sive in solo collocetur, in oleum resolvitur. Unde fit ut hujusmodi carnis frustulum quod pondo Islandicum majus pendet, 24. tantum aut circiter solidis veneat. Hic 500. in rostro corneas laminas habet, omnes tenues quinque cubitos longas, sed leviter velut glutine cohærentes, quibus sartores nostri utuntur in vestibis consuendis.

Decimum Quartum *Nordhualar*, Cetus non immerito aquaticus appellari solitus, LXXX ulnas longus est totidemq; crassus, cujus corporis maximam partem caput constituit. Nostri mercatores ex sola lingua XVIII tonnas olei exprimunt. Corneas laminas XIII. ulnarum longas habet, ac carnem præ reliquis optimam. Solo rore creditur vivere, omnes tamen Cetos lardi copia superat: Sed quantum ad adipem & oleum quod ex ossibus confici solet, Balenas quæ *Reidar* seu *Reingufiskar* (à ventre corrugato, quod carnis mediocriter pinguis indicium est) nuncupantur, non adæquat. Si rictum nimium expandit, sæpe moritur, tunc enim laminæ corneæ, quibus præditus est, ipsi per fauces trans-

transversim eriguntur, adeo ut urgente siti, os claudere nequeat.

Decimum quintum, *Sandleja*, quod in arenis quiescat, viginti aut fere triginta cubitorum longitudine, arenis impensè gaudet, minutissimos enim pisciculos, qui eos pervadunt, avidè quærit. Laminis corneis instructa est, & quamquam ab hominibus comedatur, nec grati est saporis, nec admodum pinguis. Vita difficulter spoliatur, lenta enim morte instar Phocæ perit. In terra libenter quiescit. Si in arenisprehendatur, inaccessa manet, arenas enim undequaque turbando, mirum in modum commovet. In angustias verò sinuum vi fluctuum pulsa, spiculis non raro transforata occubuit.

Dicimum sextum *Hrafn Reidur*, à carvo denominatum, XVIII. cubitos longum, Reidarum omnium minimum.

Decimum septimum *Geirreidur* in longitudinem 50, ulnarum extenditur, interdum longius.

Decimum octavum *Sildarreki*, halecum pulfor, LX cubitos longus, iudicio & ingenii solentia philosophus. Haleces aliaque piscium genera ad piscatores compellit, qui si discordes invicem facti pugnaverint, omnia ex transverso in altum maris pellit. Ob huiusmodi commodum, nefas olim erat hunc Cetum vexari. Delicatus admodum est, & pinguis.

N

De-

Decimum Nonum *Haffur-Kitte*, maximum LX cubitos, minimum L longum, hoc præ reliquis Reidis peculiare habet, quod adipe plenum sit, mediocri pinguedine, saporis gratia nulli Reidarum cedens. Notandum vero omnes Balenas, quæ à carne mediocriter pingui & ventre corrugato, *Reinguhualur* vocantur, pinnam in dorso ad similitudinem cornu erectam & acuminatam habere, carumque lardum, vel diutissimè asservatum, oleum non effundere, aut ullo modo corrumpi.

Vigesimum *Hafreidur* apud Islandos in littora dejectum 50 cubitos longitudine superavit. Steipireidam quoad staturam, pinguedinem & reliquas virtutes proximè accedit. Omnes huiusmodi Reidæ & *Reinguhualur*, laminas corneas breviusculas habent & latas. Carne jugulo subiecta præditæ sunt delicatissima, quæ digitis avelli & in pastillos redigi potest, instar butyri recentis optimi. Igni admoveri non debet. Quapropter huiusmodi carnis arefactæ pondo Islandicum majus, duobus thaleris simplicibus venit. Ex lardo puro & paululum aëri exposito duabus marcis. Sed lardum & intermedia substantiæ caro, simul sumpta, pendens tria ejusmodi pondo, thalero simplice emitur.

Vigesimum primum *Stepireidur*. Hæc Sancta Balena vocatur, defendit enim naves à malorum cetorum injuriis. Sapiens est & virtutibus ple-

plena. Speculum Islandicum testatur eam quæ maxima est, 130. ulnas longitudine superare, quanquam adhuc longior inveniri possit. Ex hujus Balenæ anteriore superioris maxillæ parte, usque ad fistulam dissecta caro, nostro tempore 50. pondera Islandica majora ponderavit. In Aquilonari verò Islandiæ parte, inventa est una, cujus universa caro pondo 800. pependit. Hujus belluæ sperma, ex nimia copia effusum, contra lepram, oculorum infirmitatem & ple-rosq; morbos, qui humanum corpus infestare solent, efficax esse creditur medicamentum, & quamvis multi sint pisces cetacei, quorum sperma commendatur, nullus tamen hujus semen viribus æquat. Carnem habet circa maxillas preciosam Kialkameidur appellatam, sed apud jugulum adhuc delicatorem, Kuerkmeidur dictam: Illa verò carnis substantia quæ Bakmeidur vocatur, in omnibus cetis qui edules sunt, pinnam dorsi in modum cornu erectam ambit.

Vigesimum secundum *Hafgusa*, vapor marinus, quibusdam Lyngbæk, quod ejus dorsum Ericeto sit simile. Extat historia de Episcopo quodam Brandano, qui in hujus belluæ dorso tabernam fixit, missam celebravit, & non multo post hanc, ut putabant, insulam submersâ esse. Quando cibû capere constituit, quod semel tantû in anno contingit, horrendum emittit ructû, quæ tanta sequitur fragrantia, ut omnia quæ in

propinquo sunt piscium genera, ad eum congregentur. Ipse verò rictum aperit, quem instar sinus aut freti catervatim intrant. Quo stragemate omnes capiuntur. Terram potius, quam Balenam similitudine refert. Duo tantum esse existimantur, sed non multiplicari, alias metuendum esset, ne victus aut locus ipsis suffectura essent.

HISTORIA XXV.

Anatome Hydropicæ.

Nobilissima quædam apud nos Matrona diu graviterque tumidum ventrem gestaverat, qui nullis remediis præstantissimorum Medicorum cessit. Mortuæ nuper cadaver privatim aperuit *D. Paulus Moth*, amicus meus integerrimus, reperitque singularem interiorum constitutionem. Levi vulnere in hypochondrio dextro inflicto, copiosissima aqua effluxit velut ex fonte, quæ mediam nostram tonnam facile implevisset. Postea ampliato vulnere & per medium discisso abdomine reliquum evacuatum spongiis inter peritonæum & intestina, quæ curiosius investigaturus, nulla invenit, sed membranam densiorem protensam ob ossẽ Xiphoidæ ad inguina usque universum ventrem inferiorem regentem, venis copiosis & amplis refertam

fertam ut placentam uterinam æmula vasorum copia referret. Ex quibus copiosus ichor ad hydropem exsudarat, Unde toto curationis decursu nunquam tentata diuretica, alias proficua, quicquam feri eduxerunt, aut morbum levarunt. Hac membrana resecta, demum in conspectum prodierunt & reliqua desiderata abdominis viscera. Sed in dextra parte ad hepatis regionem membranæ adnatus erat abscessus magnus pure foetido repletus, unde de dextri lateris dolore ægra sæpius conquesta fuerat, nec in illud latus decumbere potuit. Tres alii abscessus seu vesiculæ minores inferiorem membranæ partem occuparunt prope inguina, sed necdum ad maturitatem perductæ, discissæ enim aquam continebant. Lien quoque apostemate infectus pressusq; puris copiâ effundebat:

HISTORIA XXVI.

Corona Urinæ.

Non prorsus damnanda est corona lotio subinde innatans, quia affectus capitis solet demonstrare. Nam licet oriatur quidam circulus ex vitri reflexione, quod observavit *Platerus* Quæst. Med. 70. tamen præter illam umbram, quæ discerni potest, alia corona non nihil differens, observatur in ægrorum lotio, de cujus

judiciis & differentiis tractant *Actuarius* l. 2. de Jud. Ur. c. 15. *Fr. Joel* l. 4. f. 3. n. 38. Corona autem ista caput respicit, quia supremo loco effertur, ex quo serum ad vesicam amandatur. Dolet interdum caput, quanquam non doleant reliquæ partes, unde serum suum effundit dolore pressum. Cur autem Matulæ supremam occupet partem, ratio in obscuro, nisi quod leviora omnia suprema petant, sicut in corpore, ita & in matula. Multa sacræ regit involucri Natura, & plurima ex eventu sine ratione scimus. Experientia nos docuit, coronas urinæ affectuum capitis esse indices. Videmus in magnis febribus, si parum doleat caput, coronam parvam esse, in febribus parvis cum ingenti dolore capitis magnam quoque esse lotii coronam. Nuper admodum Epileptici Nobilis præfui curationi, cujus lotio innatabat semper corona finito paroxysmo trepidans, colore vario, cæruleo, flavo, & pennarum pavonis æmulo, qualis alias non comparebat urina quando ab insultu hoc per vices liber erat. Caput hic affectum, nulli dubitamus, & pulsatio frequens, dolor, vigiliæ, mœstitia, aliaque signa indubiam fidem faciunt, unde per crisin quandam materia morbigica ex capite ad vesicam protrusa fuit, & in suprema urinæ parte in circulum à lotio prorsus diversum coarctata.

HISTO-

HISTORIA XXVII:

Anatomie Gravidæ.

G Ravida quinto mense Mulier paralyti totius corporis inferioris à coxis ad extremos pedes tentatur. Propter longam in decubitu moram gangræna nates de repente occupat, qua generosioribus remediis ablata, quum nulla spes vitæ superfit, calore nativo à fædis evaporationibus infecto, prorsus deficiente, ad extrahendum fœtum quinquemestrem, cujus nuper motum ægra Mater senserat, operas suas manusque certatim conferunt Medici pariter & Obstetrices. Hæ igitur immissa manu nullum fœtum in utero adesse clamant, nisi molam fortassis: At peritior Medicus, tumorem statim deprehendit ex intestino recto fœcibus induratis repleto, ad uterum verò progrediens nulla vi manum intrudere potest. Mortuæ cadaver apertum, visumque os uteri arctissimè clausum, fœtusque optimi coloris & habitus in utero mortuus, nec vicinarum partium fæditate ulla parte putridus, membranarum uterique densitate inter tot molestias tutus.

HISTORIA XXVIII.

Anatome calculosi & herniosi.

CAlculus in vesica exploratur syringe vel candela cerea. Interdum tamen id remedii exploratorii genus Medicos fallit, quando calculus subterfugit & remotiora petit loca. Nam Venetiis quendam herniosum novit viditque *Io. Dom. Sala*, Præceptor olim & amicus noster, cui omnia signa calculi vesicæ videbantur adesse, nec tamen catethere aut candela potuit deprehendi. In mortui cadavere calculus cum ipsa vesica, unam scroti partem impleverat, intestina omnia tenuia alteram, adeo ut semper calculus introrsum in scrotum cesserit & exploratores suos deceperit.

HISTORIA XXIX.

Tympani ruptura.

Mulier honesta Hafnienfis, auriscalpio aurium sordes expurgatura, per imprudentiam accurrentis ancillæ perculsa, stilo profundius adacto tympanum auri prætensum diffregit, unde auditus illi postea remansit difficultas. Frequens infortunium in Italia, ubi studiosissimi barbitonfores in tonstrinis suis aures solent
à ceru-

à cerumine mundare, lædi subinde tympanum & inflammari, à quo metu pauci evadunt nitore cultusque studiosi. Læditur & à vehementi bombardarum, campanarumque sonitu, quod malo suo milites aliique experiuntur. Cur auditus lædatur, in promptu causa est, non tam quod medium sit soni, quam quod membranæ huic affigatur malleus, cujus motu pereunte, auditus hebetetur. *Mullerus* tamen apud *Horstium* Patrem lib. 4. part. 2. Obs. 7. pag. 345. observavit tympanum putrefactum sine auditus læsione, quod juxta cum illo miror: Neque enim tantum ingenuus aër exhalat, medium idoneum deficit, auditus ossicula quiescunt; Sed nervus auditorius externis injurijs omnibus patet.

Retulit mihi amicus, Vir Doctus, vidisse se puellam tanto dolore capitis vexatam, ut ex osse petroso tria ossicula auditus, incus, stapes & malleus exsilierint, magno sequentis ætatis auditus incommodo.

HISTORIA XXX.

Anatome Gulonis.

GULO animal in Lithuania & Moscovia frequens, quod Germani *Dielsrasz* / Sueones *Lerff* appellant, *Olaus Magnus* ad imitationem Germanicæ vocis Gulonem vocavit. A *Matthia*

Michou lib. 2. Sarmatiæ Europææ ita describitur. In Lithuania & Moscovia est animal voracissimum & inutile, quod alibi non compareret, Rossomaca nominatum, magnitudine canis, facie cati, corpore & cauda vulpis, colore nigro, vescitur cadaveribus. Invento cadavere tantum vorat ut extendatur & infletur tympani instar: Itaque angustiam aliquam inter arbores ingreditur & per vim seipsum intrudit, ac ventrem premens stringensque exonerat, ut violenter ingesta, violentius egerat: sic extenuatum rursus ad cadaver properat & rursus impletur, ita ut vicissim de cadavere quantum potest devoret & excernat donec totum absorpserit. Historiam illius breviter concinnavit *Apollonius Menabenus*. Figuram ex Olao mutuatus est *Gesnerus* l. 1. de Quadrup. Sed ipsi non viderunt. Animal ipsum *Io. de Laet* Vir celeberrimus & amicus, dum vixit, mihi suspiciendus, olim secari vidit à *P. Pario*, in quo, ut mihi testabatur, præter admirabilem cum humano corpore similitudinem, hæc tria admiranda observavit.

1. Ductus umbilicalis nusquam apparuit, unde mirabantur, quomodo in utero nutrimentum possit accipere.

2. Cum omnia bruta ligamento suspensorio Jecoris ab homine differat, hujus animalis jecur validissime ligamento diaphragmati necitur, ideoq; etiam cum hominis interna jecoris constitutione consentit.

3. Cum

3. Cum intestina tam humana quam brutorum, partim in tenuia & crassa, partim in sex partes dividantur; in hoc bruto nihil tale apparuit; Sed Intestinum ab exortu usque ad exitum undique sibi simile figura inventum, nec formam ullo pacto mutari, quæ causa est, quod hoc brutum ingesta compressu abdominis egere possit, quum & cæco careat intestino, & reliqua recta sint.

HISTORIA XXXI.

Prognosticum Lethale.

Prognostici lethalis meminit *Petrus Pachecus* Medicus Lunellensis eruditus Obs. 26. apud *Cl. Riverium* in Appendice Observationum elegantissimarum; Si nempe ægroti non sint similes atavis, avis aut parentibus in sano statu, at in morbo eos referant. Probat id de filio D. Engarrano, & nepte sua. Idem passim observavi in plurimis, evenitque filiæ meæ Annæ Margarethæ, quæ sano statu facie vultuque non referebat aviam maternam, at instante fato, diarrhæa maligna prostrata, prorsus illi similis de facie videbatur. Unde mœsta Mater, conjunx mea charissima, certum instantis mortis cepit augurium.

HISTO-

HISTORIA XXXII.

Periculosa tumulorum apertio.

Magna passim in collibus patriis monumentorum antiquorum est copia, quæ per saxa eminentia & cippos peregrinantibus obvia sunt, quorum quædam aræ erant Paganorum, sacrificijs Deorum dicatæ, quædam sepulchra feruntur gigantum & Principum Virorum, quibus effossis urnæ sepulchrales cum ossibus & cineribus defunctorum eruntur. De hujus modi monumentis fusus est pariter & eruditus *Olaus Wormius* heu quondam noster, in Monum. Danicis ære perennioribus, nec quidquam addo. Apud vulgus nostrum superstitio potius quam religio est, sine damno monumenta ista tot seculis clausa, aperiri non posse, tantaque devotione colunt ista & inviolata servant, ut pro certo sibi persuadeant, cœcitatem illi imminere, qui ausus sit aperire. Parens meus memoriæ beatæ, curiositate ductus colonos suos vicinum morumentum jussit effodere. Recusabant illi imperium, oculis suis metuentes. Ille verò, ut hujusmodi superstitionem eluderet, primus ligone opus aggressus est, sicque reliquos ad perficiendum animavit. Nulla parenti cœcitas oborta inde est, sed tamen nescio quæ caligo oculis obver-

obversabatur, brevi deinde dissipata, five calore motu excitato, five ex vaporibus longo seculorum decursu in tumultu delitescantibus. Invenit in hoc collo urnam sepulchralem cum cineribus & ossibus defuncti Plurimis aliis curiositas illa sepulchrorum exitio fuit, in quibus tetri vapores occlusi vel vertiginem vel syncopen ipsamque mortem intulerunt. In cujus rei fidem dignissima est Lectorum oculis historia à *Fortunio Liceto* sene incomparabili, Amico nostro honorando non ita pridem descripta l. *de Annul. Antiq. c. 23.* hic iterum recitanda: In medio Cathedralis Ecclesiæ Palvæ Novæ (munitissima Venetorū in Foro Julio arce) sepulchrum amplum excavatum est ad humanda cujusq; generis humana cadavera, proindeque profundum ad surgentis aquæ scaturiginem, quæ defunctorum putredine coinquinata tetris, & crassis admodum vaporibus caveam replebat, nam ad centum fere busta continebat, & quum ante sex menses non esset apertum os tumuli, A°. 1638. die 19. Aprilis circiter horam primam noctis, dum sepulturæ daretur Jacobus quidam famulus Illustrissimi D. Francisci Badoarij Thesaurarij, à tribus Vespillonibus, Joanne Ripa, Francisco Mauro, & Joanne Hortulano; Ripa descendens in criptam per scalam, vel ut solveret cadaver à reste, vel potius ut ipsum spoliaret indumentis, illico suffocatus interiit. Animadver-

tentes

tentes postea focij Ripā nec eloqui, nec adscendere de sepulchro, post aliquam temporis interapedinem Maurus & ipse descendit in foveam auxilium Ripæ laturus, existimans enim occupatum esse in extricando funiculo, quo vinctum fuerat cadaver, aut illi mali quidpiam accidisse. Hoc etiam neque vocem edente, neque fursum adscendente, timor præsentis invasit, & inde plebecula vocem tollere. Sed Joannes Hortulanus ille tertius vespillo clamavit intrepide, volo quodvis ego periculum subire in auxilium meorum comitum, & signo crucis munitus ait, Domine DEUS vobis commendo filios meos, & hoc effatus descendit scalam. Circumstantes animadvertentes etiam hunc post certum temporis intervallum nihil dicere, nec ascendere, confusione stuporeque capti, nonnulli currerunt ad nunciandum facinus Illustrissimo & Excellentissimo D. Bertucio Valerio Generali illius temporis, qui auditis quæ acciderant, censens ab aëre intra sepulchrum corrupto & putrido Vespillones interemptos fuisse, ad tetrum & crassum aërem attenuandum & utcunque purificandum iussit in criptam displodi simul pleraque tormenta bellica, quos Moschetos vocant, & mane proxime sequenti iussit è sepulchro tres illos Vespillones extrahi, ut in eorum corporibus inquirerentur indicia, si quæ forent, adeò repentinæ mortis. Injun-

ctum

atum fuit id muneris cuidam Francisco & socijs, quorum nomina latent: hi longioribus uncis hastatis eduxerunt vespillonum corpora, in quibus nihil aliud quam insignis nigredo conspici potuit. Exposita fuere tria ista cadavera mane præ foribus Ecclesiæ, quibus postea solita exequiarum solennia celebrata sunt, & alio loco sepulturæ tradita, nec ullus operariorum, aut assistentium quidquam detrimēti perpeffus fuit. Medicorum opinio fuit, aërem clausum in sepulchro, sine debita ventilatione computruisse veneficamque qualitatem contraxisse, aut admittione crassiorum vaporum adeò densum evasisse, ut respirationi penitus ineptus continuo viventes illos in sepulchro suffocaverit. Et observatum fuit à circumstantibus, tertium illum Hortulanum statim ac in descensu faciem habuit sub fornice caveæ, loqui voluisse, verum nequivisse, sed illico de summo scalæ præcipientem in imum foveæ cecidisse. Sepulchrum obturatum fuit, & ita supernè lapidibus constratum, ut nullum ambulantibus appareat ejus vestigium. Cerrè malus hujusmodi teterque vapor cadaverum, plurimorum in Republica morborum causa est. Vespillones id testantur, quos rarò vivido colore videas, unde perniciosus est in orbe Christiano mos sepeliendi infecta cadavera in urbibus, imo! quod pejus in templis, quæ confluunt religionis gratia mor-

mortales, ut pro salute mortem reportent. Invehitur in hunc morem *Andreas Rivetus*, in Epist. ad Amic. de Peste, lectu dignissima, probatq; ab omni antiquitate & humanitate alienum esse, paulumque abesse eorum moribus qui fontes publicos inficiunt. Apertis monumentis vetustissimis tetros vapores exortos, & ipsam pestilentiam humano generi incubuisse, alij prodiderunt. Quid de novis dicam, quibus recentia cadavera maligna committuntur, quæque in publico conventu sæpius aperiuntur. Ita multi innoxie pereunt, dum nimia vel humanitate vel pompa in veterata peccamus, vel fanorum lucro inhiamus. *Angelutius* l. 1. de Febr. Malign. c. 2. auctor est, Romæ Gregorio XIII. Pontifice, cum plures unus post alium in puteum putris & antiqui limi plenissimum descendissent, singulos momento extinctos esse, succensis verò ignibus evanuisse putrem ex cæno halitum. Alia in eandem ferè sententiam exempla congessit *Dan. Sennertus* l. 6. Prax. part. 3. c. 2.

HISTORIA XXXIII.

Venæsectio & Fontanella in Dorso.

R Ara venæsectio in dorso, quia partim crassior ibidem cutis, partim venæ obscuriores, partim deniq; quia majori emolumento videntur

tur aperiri venæ five jugulares five brachij, quæ communi trunco junguntur. Sunt tamen qui venarum in dorso suadeant sectionem, præsertim in capitis affectibus In Tetano aliisq; colli convulsionibus, ut & in Epilepsia secare venam quæ in prima dorsi vertebra conspicitur elata, author est *Rondeletius* l. 1. Meth. cut. morb. c. 37. Nec aliter sentit *Mercatus* qui l. 1. de Intern. Morb. Curat. c. 15. Oper. Tom. 3. in convulsione ex crassis viscidisq; humoribus orta, præsertim Tetano venam quæ in prima dorsi vertebra eminet in dorsum usque ad sacrum os per summum vertebrarum spinæ perreptat, ex aliorum auctorum fide jubet scindi, qua scissa per derivationem à collo quidquid humoris pituitosi musculos convellit, extrahatur. Obscura ea vena nec cuivis patula propter exilitatem. Certè per musculos externè reptat, & dignitate cedit axillari, quam nollem illi postponere in casu ancipiti. Ductus hujus venæ non usque obvios sibi curiosius perquirenti privatim ostendisse Patavij *Adrianum Spigelium* celebrem Anatomicum, *Io. Rhodius* noster, delictum Musarum, in *Analect.* ad *Septal. Caution.* l. 6. §. 76. testatur. In dorso affigi cucurbitulas, tam notum est omnibus, quam olim Martis lucus. At cauteria illi inuri seu fontanellas, nusquam innotuit ullo-
rum scriptis. Nemo enim chirurgorum aut Medicorum ultra tertiam aut quartam cervicis

O

verte-


vertebram progreditur. Novi tamen Virum Nobilissimum in patria, qui fontanella dorso inusta inter primam secundamque dorfi vertebram, à metu phtiseos, quam defluxiones à capite minabantur, nihil aliis proficientibus, liber evaserit, & sanus jam, laus Deo, vivit floretque.

HISTORIA XXXIV.

Orbes Majores Marini.

ORbis majoris piscis genera duo vidi ex Oceano nostro Septentrionali advecta. Prius solo ferè capite constat, caudaque lunata pinnis ordine in semicirculum dispositis, nomen Lunæ apud *Rondeletium* meruit. Alterum ex Islandia nuper missum, mihi Societatis Islandicæ Præfetti Amplissimi donarunt, & à priori & ab aliis *Gesnero*, *Aldrovando*, &c. descriptis diversum. Piscis hic insignis est magnitudinis, quippe spithamas meas XII. in circumferentia æquat, orbicularis, capite salmonis, sine dentibus, cauda bifurcata scombri instar, pinnam unam habet in dorso eminentem, in pectore similem & utrinque ad latera unam. Squamosus est, unaque corporis parte argenteo colore resplendet clarissime, altera aureo. Squamis derasis variegata subest cutis, lyncis instar, maculis multis rotundisque distincta. Caro illi densa, colore & odore

odore salmone similis, pinguis, pauperioribus,
ad esum expetita, nec ingrata. Rudio rem ideam
hic subjiendam curavi.



HISTORIA XXXV.

Scabies post Quartanam.

Quartanam ichore per sudores evaporante,
subinde terminari, quotidiana observamus

experientia. Crassior is si sit, loco sudoris, exanthemata & pustulæ in cute prorumpunt. Notat *Platerus* l. 2. Obs. p. 546. post quartanam cuidam Religioso Anno 1598. in universo corpore erupisse pustulas rubras, è quibus disruptis serofus humor effluebat, quæ tandem crustis obducebantur. Doctor Medicus apud *Ballonium* l. 2. Ephem. §. 15. certo affirmavit, vidisse se quendam quartanarium, cui in decursu febris ulcuscula toto corpore paruerunt maligna, quæ deinde frictionibus ex hydrargyro sanata cum febre. Capuccinum Patavij 1640. vidit *Bened. Sylvaticus*, Medicus summus, quem nunquam sine admiratione prælegentem audiui, qui scabie per totum corpus erumpente à quartana liberatus est. In obstinato igitur morbo, cutis spiracula diligenter servanda sunt aperta, inprimis imminente paroxysmo, ut si hanc viam elegerit Natura, morboſa materia facilius qua data porta egrediatur, quod multis saluti fuit.

HISTORIA XXXVI.

Hæmorrhagia in Pregnante.

JUvencula Uxor Mercatoris Hafniensis, boni habitus & animi, septimo graviditatis mense incidit in hæmorrhagiam narium satis copiosam, quæ per biduum perseveravit, continuò san-

sanguine stillante, ut sedari nulla arte potuerit : tertio die vomitus sanguinis liberalior successit, unde paucis interjectis horis vivere desuit. Non carebat fluxus malignitatis suspicione, quum eadem tempestate malignæ febres in urbe grassarentur, quibus hujusmodi symptomata solent succedere, & nisi supprimantur, plerumq; conclamatum est, quod in variis pestilentiis & febribus pestilentialibus alijs observarunt.

HISTORIA XXXVII.

Conceptus sine mensium ordinato fluxu.

RARò utero concipiunt mulieres, quibus seu morbo seu vitio nativo menses non fluunt, aut nuper non fluxerunt. De Muliere tamen quadam Patavina consultantes Medicos audi- vi, cui menses duobus olim annis continuis defecerant, quæ postea gravida filium enixa est sanum. In puerperio largius expurgatis lochiis, iterum substiterunt ex eo tempore menses, ad binos sequentes annos, ubi rursus imprægnata gemellos peperit. Nec exinde consuetos Naturæ fluxus passa est, quanquam subinde albus fluor fuerit molestus. Alterius historiam mihi retulit Excellentissimus *Sala*, Doctor noster, mulieris, quæ per septem annos menstruas nullas habuit evacuationes: Tandem venter intumuit.

muir. Existimans illa morbum alium seu obstructionem subesse, & venam sibi secari iussit, & purgantia aperientaq; validora sumpsit. Impleto gestationis termino, enixa est puerum robustum, diu superstitem, in duello deinde occisum. Novi mulieres quibus ante conceptionem nunquam comparuerunt menses, virginesque nuptas quanquam menstruatae nunquam fuerant, prole tamen familiam auxisse. Causa est, quod vel sanguis in illis superfluous non sit, qui expurgari debeat, vel quod angustiores sint venae uterinæ, quæ calore deinde in conceptione aucto dilatantur & aperiuntur.

HISTORIA XXXVIII.

Vasa Lymphatica Capitis.

Vasa Lymphatica in abdomine, thorace, & artubus hætenus innotuerunt. Solum caput iis carere præter æquum & fas visum est. Est quippe caput sedes humidi, & aquosis excrementis sæpe plenum, arteriisque refertum, ut quanquam patentibus palati, narium, pororum ductibus quotidie sic satis expurgetur; tamē communi cum reliquis ventribus lege gaudere debeat, iisdemq; vasis quæ per corpus reliquum dispersa notavimus. Hætenus tamen accurata diligentia nihil comparuit, quod nomen hoc meruerit, quanquam suo involucro ibidem delite-

delitescere, non ausi sumus dubitare. Pauciora tamen sint necesse est, partim quod emunctoriis aliis abundet caput, partim quod cum recurrēte per venas jugulares sanguine serum inferiora petat, partim deniq; quod phænomena morborum id evidentius testentur. Propter istam enim Lymphaticorum paucitatem aqua sæpe principio nervorum imminet, Paralyfin, Apoplēxiam, soporem, stuporem, aliasq; nervoso generi inimicas affectiones inducens. Testantur etiam Variolæ, nostris seculis quā antiquis notiores, ichoris plurimū caput occupare. Quærent eruditi, cur variolæ caput frequentius & copiosius infestent, quod damno suo puellæ experiuntur? Triplicem affert rationem *Mercurialis Doctissimus* l. 1. de Morb. Puer. c. 2. sed meo judicio non satis aptam. Primò inquit, in genis cutis ferè sine carne ossi adhæret. Certè major carneæ molis cōgeries in facie cernitur, quam occipite, in quo tamē parciores, quam in facie, variolæ apparent, & ista ratio de ulcerum curatione validior quā de eorundem copiosa generatione, cujus causam inquirimus. Altera ratio, à facultate naturali in facie infirmâ, valdè est infirma. Robustam illam esse in facie, vividus color testatur, & sanguinis ubertas roseo tingens genas colore. Hi autem variolis citius tentantur, quam pallidi, quam macilenti. Tertia ratio minus stringit. Putrescere enim humores facile in facie propter ossa,

quæ

mam induit, & continuo oris linguæq; motu non mirum est lympham istam in ductibus spiritu impleri & aërescere, ut barbare loquar. Hinc sæpe pura aqua sputatoribus exit, quum præ copia alterari nequit. Ista saliva masticationi ciborum inservit, & præviæ in ore præparationi, quemadmodum eandem vim Lymphæ alibi inesse, antea suspicatus sum. Quod glandulis immisceantur in ore contentis, res pro Lymphaticis est confecta, quorum pleraque glandulis in corpore gaudent. Per hæc igitur vasa sui generis, lymphæ ex sanguine capitis refluxo exsugitur, quanquam necdum commercium innotuerit seu cum venis jugularibus seu arteriis Carotidibus; Tamé mediantibus glandulis id fieri, vero est similis.

HISTORIA XXXIX.

Curationes Amethodicæ.

SÆpe multa eveniunt in morborum curatione quæ ad certam rationem frustra retuleris, sæpeq; quia signa fallunt & causæ occultæ sunt, à consueta Methodi via deflectendum est, nec quicquid aut intentio animi, aut prudentia exigit, protinus faciendum, iudice *Celso* l. 2. c. 10. Perpetua Medicorum lex jubet, ut obstructions referentur per aperientia. Experientia tamé non-

nonnunquā suadet, ut adstringētibus obstructi-
ones tollantur. Notā sibi mulierem mihi testa-
tur *D. Iacobus Ianus*, Archiater Regius, in artis
operibus exercitatissimus, Amicus meus ma-
gnus, mensium retentione detentam, quæ om-
nibus aperientibus frustra tentatis, tādē præ-
ter rationem assumptis corticibus granatorum
provocavit menstruos fluxus. Memoriae meæ
occurrit Protas Rhetor apud *Galenum* l. 2. Alim.
Facult. cui venter post esum pomorum ac piro-
rum austerorū deiciebatur. Adstringentia enim
postremo loco sumpta iis potissimū qui stoma-
chum habent imbecillem, dejectionis sunt cau-
sa, ventriculum roborantia, & ad expellendum
deorsum, quæ in sese continet, incitantia. An ea-
dem in granatorum cortice ratio, lectori com-
mitto. Sæpe tamen ex accidenti multa eveni-
unt, quæ huic illive remedio adscribimus. De
oculi rubore & inflammatione idem Vir lauda-
tus fidem fecit; non semel albumen ovi cum
alumine mistum, impositumq; nuchæ, ruborem
oculorum feliciter exterfisse & delevisse. Aliis
repellentia ejusmodi exitio forent, nam attra-
hentia in nucha magis probantur, nisi forsan
adstrictione ista & frigore externo impeditus
sit plurium humorum ad oculos fluxus. Vi-
di ventriculos debiles cibis facilipris conco-
ctionis læsos, sed duriores salitos fumoque
induratos sine noxa assumpsisse.

Occur-

Occurrunt nobis quam plurimi, quorum alvus obstinata citius lenioribus medicinis ex Manna movetur, quam purgantibus fortioribus. Multa exempla afferri possent in hanc rem, nisi operæ parcerem. Ut verbum de signis fallacibus addam; curæ Civis Hafniensis interfui, cujus urina sanorum similis, etiam ipso mortis die. Honestam Matronam novi Hystericam, cui urinæ nigerrimæ fluxerunt, brevi tamen sanitati restitutam.

HISTORIA XL.

Alvus nonnullorum obstinata.

UXor cujusdam à me visi, ægra querebatur, quotiens alvum deponeret, in febrem incidisse, quotiens verò per dies duos esset constricta, sanam se & incolumem vivere, materiam verò excretam nigram esse instar Terebinthi. Clysteribus educi jubebam materiam adustam intestinorum volvulis arctius impactam, quam, dum constrictis omnibus musculis summoque nisu excernere satagebat, turbato corpore impuro, febricula facile sequebatur. Nisi forsan ab hæmorrhoidibus coecis vel condylomatibus ani ita sphincter constrictus fuerit, ut duris excrementis transeuntibus excoriatio sit oborta, doloresq; ingentes, quod non ita pridem in alio ægro

ægro observavi. Monachum novi, quotiens al-
vum exonerat, adeò delassari, ut cibo restan-
te indigeat statim, nam extrema omnia instar
morientis frigent, & artus vacillant. Olim hy-
pochondriacus fuerat, & frequentî calidarum
sulphurearumq; aquarum usu vitium istud con-
traxerat, ut exsiccatas fibras, corrugataq; credam
intestina, & motum peristalticum impeditum,
& angustiam meatus inductam. Intestinum je-
junum in nobili pigra alvo vexato, ita in aper-
tione cadaveris apud *Ballonium* lib. 1. Epid. ad
An. 1574. angustum & cartilaginofum depre-
hensum est, ut vix per illud chylus deflueret.

HISTORIA XLI.

Aneurismata Varia.

Aneurisma cuidam in pectore Neapoli or-
tum. Quod cum curare Medici subterfu-
gerent, & ipse cordatus *M. Aur. Severinus*, hospes
tuum meus, exemplo *Fallopj* monitus, sponte
sua evanuit, dorsumq; inundans, gibbositatem
ægro invexit. Rusticus ibidem nobis oblatus,
cui jam per decennium in pectore sub claviculis
aneurysmatis vestigium extabat magnitudine
juglandis, quod ad ovi magnitudinem annuo
spacio excrevit rubicundius & vehementius
pulsans, cum scoliosi & lordosi, difficultate re-
spirandi,

spirandi, vigiliis, doloribus etiam ad medium abdomen protensis. Curationem dissuasimus, differri tamen posse mortem prædiximus, revulsionibus, adstringentibus & hujus census aliis. Pisis Aneurysma quidam habuit prope os sterni in pectore, sicut præsens mihi narravit *Io. Bapt. Ruschius* Anatomicus Pisanus, quod incrementum notabili pulsu sumebat circa vespërâ, vel tertia quaq; hora, quo tempore quoque universum crus dextrum una pulsabat. An hujus ratio ex circulatione petenda? Forsan & hypochondria sunt incusanda, quæ hujusmodi pulsu se produnt subinde, ut alibi demonstratum. Leidæ aneurisma, disruptâ arteriâ, quartam thoracis partem occuparat in *D. Iohanne Elemano* Medico experientissimo, undè miserè periit, quod & annotavit *Cl. Ioannes waleus* Præceptor olim meus & Amicus suspiciendus in *Epist. 1. de Mot. sang. ad me scripta*, ut sanguinem in arterias pelli aperto indicio demonstraret.

HISTORIA XLII.

Pulsus Intermittens.

IN Prognosi morborum sæpe falluntur Medici à pulsu, qui, si sit intermittens, exitium prædicunt. Remittit verò subinde in acutis morbis, oppresso sanguine in corde pulmonibus, &c. sed postliminiò redit, quando vel minuto

nuto sanguine vel revulso, liberiori per arterias cursu fertur. Exercitus Præfectus, cujus curæ Hafniæ interfui, in febre ardente, cum respirationis difficultate & molesta tussi, pulsu intermittente non rarò me turbavit, qui tamē extincta febre, redeuntibusque viribus, cum sanitate pristina cursum consuetum repetiit. *P. Servius* Medicus Romanus eruditissimus, Amicus meus, febre continuâ detentus, sex dierum spacio carebat pulsu, optimè tamen convaleuit. In moribundis pariter fallax indicium præbet. Civem curavi febricitantem, cujus pulsus modò remittebat per vices, ut mortem instantem minaretur, modo vegetior recurrebat, ut sanorum similis videretur, quo sæpius repetito, tertio demum die serió desit & pulsus & vita. Alios vidi chronico morbo enervatos tribus ante mortem diebus pulsu prorsus carentes. Febre maligna quidam æstuans toto ferme morbi cursu pulsu destituebatur, perrarò recurrente, quem tertio decimo demum die sustulit fati necessitas. Nempe malignitate ita sopiuntur sensus sanguisque, ut nullo ad arterias pulsu ferantur. In mortis verò confinio sanguis vel in corde vi caloris grumescit, ut fluere non possit, vel deficiens, arteriis relictis, cor auriculisque movendis vix sufficit. Quandoque & depressiores arteriæ & vitium quodcumque tangentes manus decipiunt, tumque vel
altera

altera manus pertentanda, vel aliæ partes consulendæ, in quibus micantes venæ solent conspici, ut signis aliis inter se comparatis certius fiat iudicium. Monuit id me olim Præceptor *Sala*. Exhibuerat puellæ ad expurgandum ferum copiosũ Elaterij grana viginti, sine damno. Pertransiens verò *Minadous*, quum forte consultus manum puellæ tangeret, absente pulsu, pro mortua vel brevi moritura proclamavit. At occurrens *Sala* eam puellæ manum pertentatam fuisse ostendit, quæ pulsu semper caruit.

HISTORIA XLIII.

Anatome Variolis denati.

Infans nuper natus variolis inficitur, quibus suffocatus interiit. Cadaveris resecti thorax aqua viridi repletus cernebatur, de cujus generatione egi in Dissertatione De *Latere Christi* c. 12. Parëtibz persuasum ex ulcere dimanasse, quod ex collo improvidè depulerant. Crediderim verius ex pustulis extrillasse, quibus in variolis etiam pulmones solent infestari, unde suffocatio. Vesicula biliaria versus intestinum duodenum obturata causam aperiebat obstinatæ alvi, quam infans passus fuerat. Hepar, ut in infantibus

fantibus solet, inusitatae & magnitudinis & figuræ, exsuccum tamen & pallidum supra intestina omenti instar sternebatur Lien à sano vix differebat. Pancreas pustulis plenum & cor circa basin profundius adipi immergebatur.

HISTORIA XLIV.

Vomitus Contagiosus.

Vomitus & diarrhæa contagiosa in ædibus amici non ita pridem oberrabat. Hujus media nocte filiam natu maximam ventriculi subversio invasit, de cujus gravitate pridie conqueſta fuerat, mox frequentes vomitus & diarrhæa, quæ in sequentem diem perseverabant magna virium jactura. Idem malum sororem ejusdem, fratremque infestabat, tandemq; Matri ipsi tam molestum fuit, ut subito gravissima symptomata sequerentur, spasmi pedum, lipothymia, pulsus remissio per horam & amplius, ut morti vicina Presbyterum advocari jussit ad meliorem vitam transitura. Remiserunt tamen symptomata, sequentibusque diebus cordialibus & cibis boni succi, somnoq; Deo juvante, convaluit. Idem vomitus cum diarrhæa plurimas alias familias eodem tempore hic in urbe corripuit, observatumque est pari tempore desinere, spacio enim 24. horarum vomitus

P

dura-

duravit. Febris malignæ nulla suspicio aderat, quam nec febres nudæ grassarentur, earumque nulla in ægris essent indicia. An ab assumptis? Aliàs vidimis pruna ex Pharmacopolio emta, quibus vel Elleborus, vel Nicotiani, vel Senna vel aliud purgans in vicinia adfuerunt, hujusmodi turbas catervatim excitasse.

HISTORIA XLV.

Mictio Cruenta.

Archigenes apud Aëtium Tetr. 3. Serm. 3. c. 3. tres cruentæ urinæ causas recenset, nempe renum imbecillitatem in ætate vigoris præsertim juvenibus qui licentius rebus veneris utuntur, deinde venæ rupturam, denique ejusdem erosione. Octo numerat Dononæus c. 32. Med. Obs. in Schol. quarum pleræque adjam numeratas referuntur. Non verò juvenibus solis, sed & grandioribus natu senibusque per urinas excernitur, non vitio externo, sed vel calculo provocatus, vel renum facultate retentrice laborante, vel denique acrimonia humorum concitatus. De calculo res in artis operibus exercitatis nota, sive in renibus, sive vesica ex Hippocrate 7. Aph. 39. Reliqua exemplis Virorum Magnorum illustrabo. Religiosissimus Episcopus noster D. Casparus Brohmmanus, Vir ad miraculum

culum doctus & eloquens, annos natus 67. mense Septembri 1651. post vini cerasorum potum urinam cruentam mingit, sine dolore ullo, aut aliis symptomatis, calculive suspitione. Putabatur quidem tinctura illa cerasorum inficisse lotium, quemadmodum sæpe sudores cruenti post haustum vini rubri apparent; cæterum sequentibus diebus videbatur urina in matula similis loturæ cruentæ, cui parū feri supernatabat, linteumque immersum veri sanguinis fidem faciebat. Quinto demum die urina sana cum optima hypostasi conspiciebatur. Hinc nata Medicis suspicio, siquidem magni Viri temperamentum, calidum & biliosum, calidum quoq; plurimumq; sanguinem fuisse generatū, quo retinendo renes impares erant. Adhæc cum præcedentibus diebus largius lotium emiserit, certum videbatur & indubitatum mictionem istam cruentam provenire à copia sanguinis ferrosi, & vehementi ureterum tractu & luctatione. Sanus cætera erat Vir incomparabilis, nec ex isto symptomate quidquā passus est gravius. At mense demū Novembri, prioris affectionis causa se prodidit, calculi enim prodierunt per partes & temporū intervalla complures magno ægri, vivere dignissimi, tormento, quos plerumq; prodituros urina sanguinolenta præcedebat; unde inter tot cruciatus vitæq; gloriosæ supplicia fratris viribus officijq; laboribus, circa Paschatos fe-

stum sequentis anni beatam animam cœlo reddidit. *D. Olaus wormius* Medicinæ in Academia hac Professor Regius, Collega noster multis nominibus æstimandus, superato climacterico Magno sæpe sanguinem mejebat & stranguria laborabat, præsertim post quemcunque etiam levem corporis motum vel sumptum haustum Vini Rhenani. Nulla aderat calculi suspicio, nullum ejusdem indicium. Nec dolor in alia parte, quam extremitate glandis, sentiebatur, unde nec vesicam ægrotare credidit. Suspicabar autem serosorum humorum corporis senilis acrimonia erosas esse venulas peni insertas, quale ferè exemplum narrat *Horstius* Pater l. 4. Obs. Med. singul. Obs. 9. Per vices iste affectus rediit remisitque, donec tandem An. 1654. mense Augusti, recurreret acerbius, comitatus febre maligna, quæ prostratis hætenus viribus quæ supererant, immortale patriæ & orbis ornamentum, esse inter mortales desuit. A venenata qualitate subinde mictus cruentus provocatur, quod inter pessima pestilentia signa habetur, observatumque fuit in pestilentia urbem nostram non ita pridem depopulante, & in Leidensi pestilentia annotat *H. Florentius* Additam. ad c. 1. Pavij de Peste. Variolæ quoque malignæ, hoc anno in urbe nostra grassantes, non paucos urina cruenta præcedente extinxerunt. Vidit simile *Salmuth* Cent. 2, Obs. 70. Post
gonor-

gonorrhæam virulentam vidi subsequutum copiose sanguinem serosum in Italo.

HISTORIA - XLVI.

Olus ex Mirrhide perniciosum.

OLus in prandio sibi præparaverat Vir Hafnienfis, ex cærefolio per ancillam in vallo urbis collecto. Sed finito prandio decetfit. Eodem die & mulierculæ duæ ex esu oleris cœcutientes evaserunt. Fridericiburgi Arcis Præfectus cum uxore, post hujusmodi olus, turbatus capite. Uxor delirare cœpit, quo delirio sedato, perpetuus capitis remansit dolor, cui mitigando in consilium postea vocatus sum. Cærefolio sine dubio cicuta seu Myrrhis fuit per imprudentiam ancillarum admixta, siquidem, auctore *Dioscoride* l. 6. c. 11. pota cicuta vertiginem excitat, oculisque caliginem offundit, & mentem turbat; similiaque exempla de cicutæ radicibus & foliis loco pastinacæ & petroselini comestis, plurimis exitiosis, recensent *Scaliger* Exerc. 152. n. 1. *Smetius* l. 10. Miscel. Med. ad An. 1591. *Matthiolus* comm. ad l. 6. Diosc. c. 11. aliique. Cavendum igitur ne imperitis collectio olerum committatur, nec temere in foro oleario emptæ herbæ esculentis incoquendæ.

HISTORIA XLVII.

Anatome Ebriof, & Valvuli.

E Briofus quidam verè Bibo pustulis in facie ubertim pullulantibus hepar dolere visus est, cui accessit insignis intestinorum dolor, gulæque molestia, ut cibum deglutire amplius nequiverit. In dissecto cadavere, lien intumuerat, copia potulentorum distentus, & intestina ad eas angustias compresserat, ut transituros cibos admittere non potuerint.

Romæ quendam aperuit *P. Servius* eruditus Medicus, quod præsentī mihi narravit. Is vomitu continuo vexabatur, ut quævis assumpta statim rejecerit. In dissecto cadavere pylorus calum visus est obduxisse. Alium puerum vidi fæces alvinas per os reddentem, cujus intestina volvulo erant impedita & invicem implicata.

HISTORIA XLVIII.

Colli distorsio.

A sſuetudine inconsiderata sæpe pueri col- lum distorquent, quod in habitum trans- ſit, nisi sensim reducatur. Convulsio hanc sub- inde colli formam inducit, ut mentum & ax- illæ

illæ conjungantur, quod in Viro aliquando in urbe nostra observavi. Quædam mulier in Hibernia caput ad sinistrum latus gerebat reclinatum, ut nasus & humerus recta quasi linea copularentur. Poterat quidem ab hoc situ depravato reduci manu, sed ea ablata redibat. Contraxerat hanc deformitatem ex unguento Mercuriali, sicut mihi retulit Vir Clarissimus D. Arnoldus Bootius, Medicus Dublinensis, qui vitium istud correxerat neuroticis & caput exsiccantibus. Sed consilio agyræ quum aliud unguentum, sine dubio Mercuriale, parti affectæ imposuisset mulier, rediit affectus pristina deformitate innovatus, nec deinceps remedia admisit. Aestimant hinc Mercurii noxas qui cum Mercurio volant, & si nervis suis velint consultum, in eos nervos artis intendant, ne fallaci Mercurio nimium tribuant.

HISTORIA XLIX.

Calculi per anum excreti, & de lapidum pluvia.

Mulier septuagenaria Regiomonti 1656. tres per secessum excrevit molæ avellanæ calculos, quales observantur in vesica biliaria leviores, forma triangulari, observante D. Christophoro Tinctorio Medico Professore eruditissimo,

qui rectè suspicatur per ductum cholidochum ad intestina venisse facta erosione, nam mulier multum conquesta fuit de dextri lateris dolore protenso ad intestina. Erosionis verò id indicium habet quod cum calculis excreverit materiam cruentam & purulentam, quanquam & sola ductus cholidochi dilatatione, quod aliàs vidi, protrudi possint. Hac occasione temperare mihi non possum, quin de pluvia lapidum non nihil addam, quæ frequens memoratur apud Romanæ historiæ conditorem *Livium*, & *Plinium* l. 2. c. 56. § 8. ad cujus ostenti procurationem novemdiale sacrificium indicebatur. Anno 1496. inter Cæsenam & Bertonorium tres lapides adusti coloris horrendo sonitu è cælo cecidisse *Sabellicus* refert. Inusitatæ erat magnitudinis, de quo *Cardanus* l. 14. de Rer. variet. c. 72. Vidimus, inquit, anno 1510. cum cecidissent è cælo lapides circiter 1200 in agrum fluvio Abduæ conterminum, ex his unum 120 pondo, alium sexaginta: color furrugineus, durities eximia, odor sulphureus: præcesserat in cælo ingens ignis hora tertia, decidentium lapidum strepitus hora quinta exauditus. Nuperis annis nempe 1637. 29. Novembris lapis in Gallia Provinciali in via publica prope Peoniam civitatem quæ Sabaudiam à Provincia discriminat, de cælo nullis nubibus aut ventis aspero forma ignis sed inæquali, ingenti crassitie,

fitie, pondere verò quinquaginta quatuor librarum delapsus fertur. Illum in rei fidem adhuc inter rariora alia Aquis sextijs servat *Borillius*. Non absimilem alium in Musæo Prætoris Illustris *Lierchai* Lugduni ad confluentem Rhodani & Araris vidimus. Anno 1654. die 30. Martij hora octava matutina in Fionia nostra tanta passim orta est tempestas, tonitru pluviiisque mixta, ut horribili sonitu omnia perstreperent. Cum Pluvia deciderunt lapides quamplures durissimi & ponderosi tanta vehementia, ut ædes contremiscerent, & ad alias Provincias vicinas fragor pervenerit. Incolæ urbium campanas pullarunt, incendio flagrare ædēs suspicati. Ex his lapidibus unum habeo, beneficio & dono Illustrissimi Cancellarij Regii *D. Christiani Thomæ*, Mæcenatis nostri, qui pendet libram civilem. Major alius ad serenissimum Regem nostrū missus fuit duplo ponderosior. Quantum video, pyritis est, & inspersis maculis scintillat, percussusque scintillas excutit. Exteriori facie induta est crusta, nigricans, quasi igne cremata. Intus ex flavo candicat. Figura inæqualis. Unde ex cælo lapides depluant, difficile dictu est. Ex sole lapidem venisse *Anaxagoræ* fuit commentum. Sed contra naturam ad nos ferretur. In aëre igitur vel generantur lapides ex vaporibus crassis calore subitaneo condensatis, quod suspicantur *Sennertus* l. 4. *Phys.* c. 6. *Fromondus* l. 5.

Meteor. art. 3. vel ex terra vi sursum trahuntur, quemadmodum carnes, ranæ, mures, vituli depluisse creduntur. Prior conjectura probabilior in lateribus coctis, quibus pluuisse *Plinius* testatur. At saxa solida contra naturæ conditionem sursum rapi, vix concipimus. Vapores salini in aëre condensari possunt, præsertim frigore accedente. Hinc sæpe cum grandine lapides devolvuntur, crustaque ex nive seu glacie inducuntur, quod non ita pridem in Falstria nostra observatum, sed friabiles illi fuere, non solidi aut densi. Grandiorum lapidum pluviam ita apud me concipio. Sunt in altissimis montibus & rupibus saxa malè cohærentia seu decidui lapides, qui cum pluviis eluuntur & decidunt, suborta verò tempestate cum pluviis vel nivi facile rapiuntur & aliorum transferuntur, siquidem motu à ventis impresso non sursum, sed deorsum, quanquam immutata rectitudine, propelluntur.

HISTORIA L.

Variolæ Epidemicæ.

Æ State anni currentis 1656. inconstante, calore pluviisque & ventis australibus mixta, aëre prioris pestilentiae reliquiis nonnihil adhuc inquinato multisq; puerperis exitioso, Variolæ
ex

ex sanguinis putridi ebullitione ingenti numero & foeditate non puerorum tantum corpuscula deturparunt, sed adultiores utriusque sexus, etiam qui antea immunitatem sibi polliciti fuerant, & gravidas & puerperas & fœtus in utero infecerunt, cum febre maligna & petechiis, quibus infiniti vel primo invasionis die, vel quarto, vel in declinatione variolarum in Libitinæ censum adscripti sunt. Quia variolæ istæ pessimæ erant moris & malignæ, varia symptomata viscebantur, in naturalibus functionibus vomitus & nausea, in vitalibus cordis palpitatio, lipothymia, in animalibus delirium, quo multi dempta crusta universam faciem sibi deturparunt, respiratio difficilis, tussis: in excrementis, urina cruenta & dysenteria, lachrymæ oculorum, qui variolis tam strenuè expugnabantur, ut visus sit humor crystallinus exinde expressus. Quarto die vel sumpto sudorifero cardiaco ex lapide Bezoardico, Cornu Cervi, Unicornu nostro Gronlandico, &c. vel sponte sua & robore naturæ erumpentibus, mitigata febre & symptomatibus cessantibus, sanitas quibusdam sperabatur, nisi negligentia frigidi aëris ad interiora recurrerent, & vel alvi fluxu vel suffocatione strangularent. Ingruente verò Autumno numerus ægrorum quidem æquabat æstatem, sed malignitas remisit & innoxie plurimi decubuerunt.

HISTORIA LI.

Lienis exsectio.

Vetus est traditio lienem eximi posse cursoribus, ut ad cursum expeditiores reddantur. Plinius l. 11. c. 37. *Peculiare cursus impedimentum aliquando in eo, quamobrem inuritur cursorum laborantibus, & per vulnus etiam exempto vivere animalia tradunt.* Chronicon Turcarum refert, cursoribus futuris lienem eximi modo Turcis secreto. Semper mihi dubia visa est relatio. Quippe ex Celso l. 5. c. 26. vix ad sanitatem perveniunt, quibus lien vulneratus, magis si prorsus auferatur. Nobiles ejus usus dissuadent, qui in sanguine acido depurando versantur, & fermento pro totius incolumitate, nisi vel Pancreati vel Hepati vel alij parti hoc officium resignet lien. Præterea metus sanguinis imminet in excisione. Abundat lien arteriis ex Cæliaca, & venis ex ramo splenico, quibus rescissis, & sanguinis cursus impeditus alias partes inundabit, & ingens hæmorrhagia provocabitur. Ad hæc tam arctè per peritonæi membranas & vasorum commercium partibus vicinus nectitur, ut sine metu inflammationis & vicinorū damno eximi non posse videatur. Optandum tamen omni voto esset, ut tot malorum fomes extirpari

pari posset. Sed meo iudicio parum proficere-
mus, si quidem humorū pravorum est vitium,
qui illo ablato aliam partem eodem damno in-
ficerent. In scirrho tamen proficua foret illius
exsectio, ubi pondere suo nimis est molestus, &
sæpe hydropem advocat. Id tentavit *Leonardus*
Fioravanti Eques, Medicus & Chirurgus Bono-
niensis, felixque Empiricus, qui Panormi in Si-
cilia cujusdam lienosæ mulieris ventrem disse-
cuit, atque lienem extraxit pendentem libras
3 2. sicque à maximo eoque interficiente scirrho
mulierem liberavit. Post Fioravantium nemo
in homine operationem ausus est aggredi, quia
tument in scirrho vasa ad lienem patula, & vires
rarò constant. In animalibus facilius succederet
negocium, quorum lien minor & liberior, in
quibus experimentum minus periculi habet.
Nuper in Anglia Medici periculum fecerunt, &
sine noxa brutis animantibus, canibus, felibus,
suibus, lienem exsecuerunt, sicut ad me perscri-
psit Doctissimus medicinæ Candidatus *Ioh. Chri-*
stianus Agricola, olim auditor meus & amicus di-
lectus. Modus autem à *Doctore Scarbourn* Ana-
tomico Londinensi & dignissimo magni *Harvei*
successore ipsi communicatus hic est: Sumatur
canis, felis vel sus, & sub diaphragmate in fini-
stro latere lienis vulnus oblongum infligatur,
cui digitus immittatur & lien cum vasis attra-
hatur, factaque ligatura lien abscindatur prope
vin-

vinculum: huic ligaturæ inungi poterit Balsamus Sulphuris tamdiu donec pus omne cum vinculo tandem effluxerit, postea confuitur vulnus. Alium modum aperuit ipsi *D. Iolivius* Clarissimus ibidem Medicus: Sumit enim canem, vulnusque oblongum eodem loco infert, postea separat lienem ab omento novaculâ, ita tamen ut sine læsione omenti fiat, postea lienem apprehensum cum vasis contorquet in modum convolvuli, sanguinem exprimit, & lienem unguibus abscindit. Nullo ille Balsamo utitur, sed canem fovet calido loco linteisque involvit ne aere externo vulnus lædatur, eumque à motu & ambulatione quietum servat; sic felici cum successu experimentum notavit *Agricola*; & frater meus charissimus *D. Erasmus Bartholinus* nuper redux, ibidem canem *D. Scharbourghi* vidit, cui lien excisus fuerat. Difficilius in humano corpore excinditur propter vasa ampliora, lienis magnitudinem, connexionem & necessarium usum. At quia in Eunuchis testiculi excinduntur, uterus, & cæsarea sectio succedit, forsan & lien, quo sæpe carere possunt splenetici, hydropici & scorbutici: ea cautione supra proposita eximi posset accuratis manibus. Sed illius operationis difficultatem tempori reservamus. *Ballonius* l. 2. Ephem. p. 251. rarum hujus sectionis notat exemplum: cuidam vulnerato ad nothas costas splen foràs apparuit. Ignor-

Ignorabat confor splenem esse. Intumuit valde & vitium contraxit. Alter venit audacior, qui secuit prius superiore parte ligatum, convaleuitque æger. *Fioravanti* fidem nonnulli suspectam habent. Fateor arrogantius subindefe gerere quam modestius. Hanc tamen operationem illis testibus, & aliis ad relationem fidam necessariis munivit, ut dubitare nequeamus. Extat historia in *Thesauro Vitæ humanæ* l. 2. c. 8. quam ex vernacula dialecto in Latinam transferam illorum in gratiam qui linguæ gravis sunt imperiti, vel operibus *Fioravanti* rarioribus carent.

Cura Mulie-is, cui lienem exemit

Fioravantius.

Anno 1549. mense Aprilis, vocatus sum ad mulierem Græcam, quæ habitabat Panormi prope hortum Marchionis de Terra Nova, uxorem Centurionis seu Capitanei Matii Græci, qui postea Anno 1551. in bello Africano occubuit. Nomen mulieris erat Marulla, nata annos 24. cui lien oppilatus, tanta mole increfcent, ut corpus amplio-rem non caperet, ex quo utrumque crus pessimè exulceratum, ut misera diutius non posset supervivere. Cum à variis Medicis inviseretur, ipsi dictum fuit, si curari vellet, necessario eximendum esse ex corpore

corpore lienem, quod facile fieri posset & sine periculo, & aliàs factum. Misera mulier, olim pulcherrima totius urbis & multum dilecta, apud se deliberavit an moriendum, an isto medio curanda: tandem Capitaneum, maritum suum rogavit ut quæreretur hominem, qui lienem sibi eximeret, tantoque urgentius rogavit, ut Capitaneus negotium hoc in se susceperit, quæfiveritque Medicum ad hanc operationem. Ad Me in ædibus meis venit, abduxitque secum ad proprias ædes ut viderem mulierem, hanc, quam vidi, cum ea loquutus sum, & quantum potui, consolatus eam sum. Interrogatus ab illa, an auderem eximere lienem, intrepidè affirmavi, quanquam nunquam antea ullum lienem corporibus extraxissem, sed postea Neapoli semel alium exemi, sicut (c. 53.) in loco describam. Ita dato hoc promisso, illa cottidie instare, & effectum urgere. Ego, ut verum fatear, quanquam promiserim, non magnopere curavi, ne me prostituerem. Sed hoc non obstante vocari jussi senem quendam ex Regno Neapolitano, ex urbe, quam vocant Palum, nomine Andrianum Zaccarellum, qui in eadem urbe herniosos excidit, & cataractas deposuit, magna artis suæ experientia. Advenienti subito ad meas ædes dixi, mi domini Andriane, cupido incessit mulierem Capitanei Matei Græci, lienem eximendi, scire vellem an sine periculo id fieri posset. Respondit
Senex,

Senex, ita domine, fieri potest, quia operatio est, quæ sæpius successit me vivente. Quum quærerem, an auderet id aggredi, respondit, se suscepturum, si me habiturus esset socium, alioquin non. Ita conclusimus junctas operas. Revisi mulierem, cunctisque cum muliere & marito ordinatis & compositis, adii curiam justitiæ, ut pro mortua seu desperata annotaretur, sicut moris erat. Impetrata ibidem licentia, simul ivimus ad ægram mulierem. Senex ille bonus novacula sumta, abdomen mulieris supra lienem secavit, statimque lien extra corpus profiliit. A membranis separatum, extraximus totum, corpusque consuimus, solo spiraculo exiguo relicto, & ego curavi oleo hypericonis, & pulvere thuris, mastichis, mirrhæ & sarco-collæ, præscripsique potionem ex aqua cocta cum melle communi, consolida, hypericone, betonica, & carduo sancto, & singulis diebus exhibui portionem theriacæ. Ita perrexi mulierem curare, quæ misera spacio viginti quatuor dierum fuit sanata, missamque audivit in templo B. Virginis de Miraculis, sana & salva. Lien ex corpore extractus Uncias duas & triginta pendebat, deportatus ad hospitium Mercatorum, per dies tres ab universa civitate fuit visus, gloriæque tanti experimenti mihi consensu cessit cunctorum.

HISTORIA LII.

Dolores post partum.

PArtus juvenulæ mulieris lectissimæ difficilior fuit. Omnia tamen ex voto succedere, fœtus masculus, secundina, lochia, quies. Sed sexta hebdomade dolere crus cœpit, cibos fastidire, noctes insomnes habere, hypochondrium incusare. Laxata uteri ligamenta credebantur, & uterus scatere humiditatibus. Injēctis clisteribus, datis infusionibus R habarbari, &c. excrevit copiosam pituitam, sed sine levamine. Cataplasmata, Emplastra, suffumigia, inunctiones frustra tentatæ. Obstetrix uteri prolapsum ad latus dolens digitis animadvertit, quo reposito pessarioque indito, (quod subinde pure conspersum extrahebatur,) modo cessare, modo redire dolores. Tandem Medicis nobis clysteres suadentibus, vel blandam infusionem, repugnante obstetrice, metu uteri commovendi, Natura sponte sua solvit alvum. Nullæ fæces. Excreta materia albumini ovorum similis, insperso pure, sine fœtore. Statim levata, doloribus cessantibus, lecto surgere, cibos appetere, & quieti reddita. Forſan intestinis abscesus hic cryſtallinus adhæſerat, vel meſenterij glandula aliqua materiam suggeſſerat.

HI-

HISTORIA LIII:

Spasmus Cynicus ex lue Venerea.

Misere lues nefanda deturpat corpora, & symptomatibus affligit, quæ passim obvia sunt. In Romano athleta miserâ faciem aliquando observavi Neapoli, quum ad illius curationem cum Magno Severino vocarer. Cachexia maligna pedes tumore œdematoso turgidi tangentium vestigia servabant. Penis veneno consumptus, successitque spasmus Cynicus, maxillâ sinistrâ cum oculis intortis ad dextram partem reflexâ. Versus talum sinistrum mollis ad tactum erat abscessus sua cavitate præditus. Capitis dolores ingentes, & cranii exostosis, cutisque depilis deformitatem auxerunt. Purgatus fuit potenti pharmaco ob alvi siccitatem, vomitusque ex vitro Antimonii provocatus, tandemque ad stufam demissus. Ad abscessus ossium & maxillæ articuli ustio Arabica per fila accensa Ægyptiis usitata & frequens Severino adhibita, qua sensim noxii humores exsiccantur, & robur partibus redditur.

HISTORIA LIV.

Scombrus Monstrosus.

ANno 1650. mense Septembri in Regia Norwegiæ Præfectura Oenfoën, prope Insulam Roën, cui præest Regio nomine Illustris *Ianus Bielke* Regni Norwegiæ Cancellarius, à piscatoribus captus fuit piscis *Scombrus*, nostris *Makreel* / in cuius ventre caput extabat simile vitulino, & dorsi facies depressior, ut & ventris. Conjiciebat *D. Olaus wormius* magnus olim Doctor noster, cui transmissa fuit piscis icon mecum deinde communicata, morfu cuiusdam piscis grandioris exrrusa esse pisci viscera, & sive intestina sive lactes hanc vitulini capitis figuram mentiri, quod confirmare videtur compressus piscis, in medio vestigium vulneris ostentans, deinde rubicundus quidam circa caput vitulinum circulus. Sed quia ipse piscis ad nos non transmissus fuit, difficilius est iudicium. Captum piscem in omen vertit Illustris *Bielke*, fore ut pisces & animalia terrestria simul in agris pascantur, quod statim quoque ibidem loci evenit. Inundatione enim aquarum pisces in terram expulsi, & animalia terrestria multa suffocata perierunt.

HISTORIA LV.

Tumor Vagus.

TUmores vago affligebatur non ita pridem minorennis Pastoris Reverendi in Scania. Modo venter in tumorem attollebatur, modo hoc subsidente thoracem elevabat, quo cessante etiam caput faciemque distendebat, modo ad pedes reliquis salvis commigrabat. Materiam scorbuticam subesse suspicabar, setumque flatulentum hinc inde incertis sedibus vagare. Nullum remedii utilis genus admisit, sed naturæ parentes negotium commisere. Tandem igitur quum singulas partes per vices tumor occupasset, circa dorsum subsedit, quo loci percurato tumore convaluit.

HISTORIA LVI.

Venarum intumescentia.

Tument venæ copiâ sanguinis distentæ in Plethora. Subinde & nimio sero turgent, quando vel copiosius ab arteriis recipiunt, vel receptum ad emunctoria expellere nequeunt. Per dies tredecim obstructione meatuum urinariorum laborabat Juvenis, ut nihil per lotium

excerneret. Venæ omnes corporis intumuerunt, ut varus crederetur, & ruptionis videretur imminere periculum. At procurato medicamentis diureticis lotio, cessavit venarum distensio & metus rupturæ.

HISTORIA LVII.

Abortus revocatus.

Oppidana mulier tertia & decima hebdomade imprægnationis cerevisiæ cocturæ adstans, siculamque pleniorē imprudentius tollens, abortum ferè rejecit, ruptis membranis & exitum embryone moliente. Forte Empiricus præsens, ad omnia audax, huic incommodo succurrere satagens, suavit sine mora & situ prægnantis & manus dexteritate reponendum foetum. Capite igitur gravidæ declivi, elatisque eruribus obstetrix subtili manuum opera embryonem proditurum intrusit, statimque peracta operatione in lecto composuit matrem, ut foetus repositus solitum locum repeteret. Fluxere tamen lochia ad tertium diem. Ad membranae ruptæ generationem, suavit idem Empiricus congressum cum marito. Hinc retentus foetus, julto tempore deinde fuit exclusus, adhuc superstes.

HISTO-

HISTORIA LVIII.

Colica ex Sero.

Superato catarrho Colicam passus est amicus noster summus, satis molestam, quæ circa vesperam incrementum sumpsit. Ante invasionem ab assumpto cibo per vomitum aliquot libras rejecit aquæ limpidæ, sine chyli crassioris admixtione. Causa colici doloris mihi visa est chyli crassities, quæ liquidi seri defectu, quum libero cursu per intestina ferri non posset, tormina concitavit. Apparet hinc liquidiorum chylum non necessario expectare solidioris concoctionem, nec trahi semper & exfugiri à liene. Non tamen credi velim assumi semper serum in colica passione. Vitio ventriculi & intestinorum vel colliquatur pituita, vel alimenta vitiantur. Presbyterum novi colicis doloribus divexatum, qui superveniente vomitu aqueæ materiæ, sanatus est. Unde hydragogorum usus non rarò advocandus in colicis torminibus, quorum beneficio sæpe per alvum liberavi ægros.

HISTORIA LIX.

Colica periodica.

PUella bimula ordinatis doloribus torquebatur circa inguina, ut nec cubans, nec sedens nec stans, nec ulnis gestata dolorum requiem sentiret. Redibat iste dolor statis vicibus à decima vespertina ad horam duodecimam. Interjecto tempore diurno nocturnoque sana erat solitis suis crepundiis læta. Tertio paroxysmo finito, nulla manifesta crisi apparente, postea immunis vixit. Vermium nulla fuera indicia. Flatulentam igitur colicam fuisse nullus dubitavi in musculis potius abdominis delitescentem, quam in colo. Alvus enim ex voto respondit. Inunctione abdominis ex oleo absinthii & cumini distillato, & exhibita theriaca in aqua Cornu Cervini sublevavi ægram.

HISTORIA LX.

Lien induratus.

MUlieris vi morbi profligatæ dissectioni interfui. Sublata verò fuerat diuturna viscerum obstructione. Lienem in cadavere defunctæ invenimus tantæ esse duritei, ut
vix

vix cultro cederet, nisi magna vi intruso. Inter
secundum non dissimilis audiebatur sonitus
quem in lignis spongiosis discissis animadverti-
mus, & si clarius loqui licet, & colore & duri-
tie carnem fumo diutino induratum lien refere-
bat, sive quod interceptis obstructisque vasis
spleneticis exaruerit, sive quod atro succo reple-
tus utriusq; fuerit induratus. Incurabiles illi lie-
nes spem Medicorum ægrorumq; fallunt. Sub-
inde extremus & tumor & durities summa ad
tactum offertur. Siquidem verò congestus in
splene sanguis tenuior est, patentq; venæ, cura-
tionem admittunt. Sic sudoriferis & laconico
duritiem contumacem lienis emollivi. Vidi &
ictero succedente imminutum. De hæmorrhoi-
dibus notum. Nonnunquam per vas breve ex-
purgatur largo sanguinis vomitu. Id sæpius à
me aliisq; fuit observatum. Sed memoria dignus
est amicissimus quidem & sanguine mihi con-
junctissimus, qui splenis duritiem sæpe & mole-
stè experitur. Ubi maximè intumuit lien, vomitu
sanguinis liberatur, induciasq; habet donec
recollecto sanguine fluido rursus turgeat. Sen-
serat nuperrimè sinistri hypochondrij tensionem
& duritiem. Subsequebatur post paulo vomitus
sanguinis secundo tertioq; die recurrens, ut tri-
dui spacio libras plus quam sexdecim rejecerit,
animaque purpurea in labiis hæreret. Exinde
quanquam pro mortuo habitus sit, sublevata

hypochondria, & tardæ vires rediere. An purus putusque sanguis fuerit, non ausim affirmare, quum in emaciato corpore vix sexdecim in universum libræ sanguis contineantur. Mixti fuere ichore, pituita, & alia ventriculi lienisq; liquida excrementa, cæterum maximam partem cruor conficiebat,

HISTORIA LXI.

Infans à glire erosus.

DE caprimulgis aliàs dictum, infantibus infestis. Majus verò illis à domesticis animalibus periculum, nisi nutricum diligenti curacunæ custodiantur, quod malo suo experiuntur non pauci negligentiores. In vico S. Spiritus ante perpaucos annos infans 20. hebdomadas natus, in cunis securè dormiebat, parentibus in lecto vicino decumbentibus. Nutrice absente, luminibusque extinctis, & omnibus ad quietem compositis, clam glis irrupit, sicut ex excrementis conjiciebant, totamque infantis faciem erosit carne omni nudatam, ut biduo interjecto miserè diem suum clausit infans.

HISTO-

HISTORIA LXII.

Sudor vini rubri.

Magna celeritate per ductus lacteos thoracicos ad cor, exinde per arterias ad ambitum corporis potulenta materia excernitur, & sudoris specie exprimitur. Hinc potatores si cutem habeant patulam, vel exercitio vel calore externo copiosè & celeriter sudant, nisi vias urinarias eligant, referuntque externo corpore colorem, odorem, saporemq; assumptorum. A liberaliori potu vini Hispanici rubri quidā studiosus Hafniensis mihi notus, postridie à crapula languere sibi visus est, & in sudorem solvi rubro colore tinctum, similemque illi qui vino hausto inerat. Timore perculsus sanguineum sudorem credidit, sed eodem die convalescens metum deposuit. Notavit *Salmuth* Cent. 2. Obs. 28. nobilem Roth dum indulgeret potui cerevisiæ, atque salutationibus corpus nimis commoveret, potum omninò crudum per sudorem evacuassee, ita quidem, ut & cerevisiam sapuerit, vestes tinxerit, & vestigia reliquerit. Observandum moneo, brevem esse ex ventriculo ad ambitum corporis hic transitum per vias pronuper detectas, deinde minus celeri transitu liquida alimenta in corde mutari, quam hactenus creditum, liquidem

liquidem & colorem servant & odorem, quod tamen de assumptis intelligendum, quæ copia exsuperant exitumq; urgent antequam immutari possint. Juvat expulsionem raritas texuræ. Observavit *Bennetus* Theat. Tabid. Vestibul. Excerc. 29. alij intus assumpti odorem, & aceti aut succi limoniorum & aurantiorum acorem tertia aut quarta à comestionis hora exhalando pervadere ad cutem, & in fonticulis labra vellicare. De sudoribus verò sanguineis Hypomn. 4. de Cruce Christi olim disputavi, nec actum ago.

HISTORIA LXIII.

Bubo Pestilens.

MULIERI in vico S. Petri ex bubone pestilenti dextrum inguen exulceratum, ex quo, præter malignam luis materiam, quidquid alimentorum assumpserat, egrediebatur. Tandem quum tractu temporis curato bubone viam istâ interceptisset Natura, tumor quidam remansit carnis callosæ vitio. Ita latè se malignus humor diffundit, ut intestina quoq; exulceret, quæ hic læsa fuisse, excreta alimenta testantur. In bubone Venereo nihil patiuntur, quia seminalis potius quam alimentalis materia prodit. Per ligamentum enim uterij in feminis cavum & in Viris per glandulas inguinis tumidis deducit *Riolanus* l. 2. Anthrop. c. 10.

HIS TO-

HISTORIA LXIV.

Lapis in utero.

MAttrona Martini Bierwolffi Senatoris Regionti semper conquesta de difficili respiratione, abdominis mole, suppressis uteri purgamentis, ante decennium fit Ascitica. Nihil profuerunt medicamenta. Moritur, mortua exenteratur à D. *Christophoro Tinctorio* Clarissimo & Eruditissimo Viro. Ex exenterata 15. stoffas aquarum detraxit, invenitq; epar 23. libras pendens schirrhosum, præterea duos tumores saxeos dependentes à suspensorio hepatis, alter librabat 16. alter 12. pondo. In utero lapidem quatuor librarum multis eminentiis lapideis, coloris fusci deprehēdit, quemadmodum nuper ad D. *Paulum Mothium* utriusq; amicum scripsit.

HISTORIA LXV.

Dentes decidui.

INter omina sinistra apud Oneirocriticos recensetur casus dentium, & rarò felicia sibi spondet vulgus nostrum si in somniis dens videatur deperditus. Vespasianus olim non vano augurio somniavit se Principem fore Romanorum,

rum, quando Cæsar Nero dentem amisisset. Nempe pro arcana principeq; parte Deus olim habitus, qui cremari non possit, & in quo semina futuræ resurrectionis delitescant, & ex quo robur cuiusq; videatur æstimandum. Duas matronas honestissimas novi, quæ totiens dentem exspuunt, quotiens liberos pariunt. Infantibus decidere & renasci quotidie observamus, siquidem in alveolis dentium deciduorum appendices remaneant, ex quibus novi repullulent. Tardius illi vel celerius redeunt pro vario infantum robore. Trium dierum intervallo renatos non semel inter nostros pueros observatum. De genuinis nihil addam, quos 20. 30. 50. 70. ætatis & amplius anno erupisse memini. Mulieri 20. annorum aliquot successive annis exitum cum dolore dentientium molitur, ruptisque gingivis se ostendit dens genuinus, sed iterum obducta carne se subducit.

HISTORIA LXVI.

Luxatio Costarum.

Monet *Fernelius* l. 5. Path. c. 12. palpitationis Cordis tantam esse vim, ut sæpe sit animadverta thoracis vicinas costas effregisse, sæpe & eas quæ supra mammam sunt de propria sede depulisse. Vicarias palpitationi operas præstant

motus

motus quicunq; vehementiores, qui ex articulis costas dimovent. *D. Simon Pauli* Vir Clarissimus, superata febre maligna 1652. vocatus in Scaniam ad nobilissimum ægrum *D. Henricum Huitfeldium*, in itinere salebroso & saxoso, sive crebris concussionibus, sive à defluxu humorum post morbum ad spinam dorsi, dolore ingenti lateris sinistri pro spinam corripitur, cum sterni tumore & protuberantia. Eo latere recumbere non potuit, nec prorsus sedere, stans verò dextroque lateri incumbens dolorum expers fuit. Tumor sublatus latentem prodidit affectum, accurate enim pertentantibus semi luxatio visa est octavæ costæ veræ. Tandem istis cruciatibus aliquot hebdomadum spacio masculè superatis, apparuit quoque fractura costæ octavæ ejusdem lateris, integra cute hætenus occulta, quæ per callum paulatim coaluit.

HISTORIA LXVII.

Tela capiti in hærentia.

T Eli residua frustula è capite ante evellenda sunt quâ curatio sperari possit. Raro tamen hanc injuriam cerebrum concoquit, & heterogeneas partes amicè complectitur. Erat quidem Patavii, cui ex vulnere in osse auris petroso cuspis gladioli infligti remanserat, qui tamen per
 meses

menes aliquot ibidem vixit, cum verò nulla arte extrahi posset, infectâ re discessit, quamdiu exinde mortis causam circumtulit, ignoro. Ingeniosam hic se subinde præbet Natura, quando deficit medentium felicitas. De femina mihi narravit *Cl. Vestlingius* amicus dum vixit magnus, cui amasius propter rivalis adventum, caput pugione vulnerarat. Quum cuspius pugionis extrahi non posset, cranium cui inhæsit, sponte in vicina solutum, ut forcipe apprehenderetur, quo cum cuspide elevato convaluit.

Retulit mihi *Io. Dom. Sala*, Præceptor in Re Medica meritissimus, in ipsa cerebri substantia gladioli impacti frustulum perpetuo cuidam, reliquo curato vulnere, sine detrimento hæsisse, nisi quod Comitiali morbo frequentius convelleretur.

HISTORIA LXVIII.

Clysteres ad ventriculum penetrantes.

Nonnullis clysteres adeo adscenderunt, ut vomitione rejicerentur, quemadmodum & sterminus per lethales volvulos, teste *Galeno* l. 3. de Sympt. Caus. c. 2. Hujus eventus plura extant testimonia apud recentiores, quos nolo compilare. In nephriticis doloribus colicisq; haud rarò evenit, quibus clysteres imperantur, ut vel clysteres ipsi, vel sapor clysmatum ad ventriculum pertin-

pertingant. Nuper amicissimus nephriticis doloribus miserè vexatus, clysterum usum nimis quam proficuum extimescebat. Aliàs enim observarat injecti clysteris saporem ad palatum pervenisse, jamq; in paroxysmi nephritici insultu injectum clyσμα vix continebat quin vomitu rejiceret, unde nausea statim oborta, & retentus in corpore clyster exitum per alvum non urgebat, cui ut occurreret, clysmati statim suppositorium super addidit. Attrahenti ventriculo adscribit *Galenus* l.c. si quidem vomitus in nephriticis doloribus concitatur, non mirum quod inverso intestinorum motu peristaltico sursum propellatur quicquid intestinis cōcreditur. Nec obstat valvula coli, quæ vel motu totius abdominis connivet, vel laxatur læditurq; humorum acrimonia, vel rariore textura facile adscendentes vapores injectorum admittit.

HISTORIA LXIX.

Amuleta Epilepsie.

Semina & radices Pœoniæ externo contractu Epilepticos insultus inhibere certa experientia didicimus. Aliud amuletum hætenus inter multos inter secreta servatum propalabo in commodum ægrorum, qui Medicos præsentis non habent, cujus vis indubitata fertur, & nunquam fallit, nisi inordinato victus, potusque

R

ratione

ratione & vehementioribus animi passionibus solâ ægrorum culpâ eludatur. Ramus est sambuci in salice antiquo nascentis, cujus frustula collo appensa felicissimo eventu Epilepsiam vel minuunt vel prorsus abigunt. Ne verò merita laude autores privemus, qui secreti ansam dederunt, ingenue fatemur extare amuleti hujus mirandi descriptionem, hætenus à multis neglectam, apud *Io. Hartmannum* Chymicum celeberrimum in Praxi Chymiatrica, qui & modum inveniendi & applicandi tradidit hoc nomine optime de mortalium salute meritis. Meminit etiam *Gabelchoverus* Cent. 4. Cur. 57. In antiquis salicetis diligenter inquirendi rami isti sambucini, à quovis facile dignoscendi, & colligendi mense Septembri & Octobri ante plenilunium, & usui deinde reservandi ad annos etiâ duodecim. Vnde rami isti aliena in arbore pululent, probabili ratione elicit. Nempe picus matura grana sambuci huc defert, quibus libenter vescitur, quæq; deinde furculorum sui generis in salice generationem procurant. Hinc prope hortos, ubi sambucus provenit, salices sunt solliciandi. Picum autem, quia Epilepsia laborat, vim periapto inpressisse ad similem morbum curandum, existimat *Hartmannus*. Nos non tam de ratione, sine dubio occulta, solliciti, quam de experientiæ veritate hætenus certissima, usum amuleti, illius ductu, reapse in multis Epilep-

Epilep-

Epilepticis probatum, signabimus. Secandus furculus unus ex salice decerptus in taleolos tenues, quorum novem nodulo lineo vel sericeo inclusi, collo ad orificium usque ventriculi appendantur sive ante sive post paroxysmum, & tamdiu gestentur donec sponte sua rumpantur decidantque. Nodulus delapsus non tangendus manu, sed forcipe apprehensus loco remoto sepe-
liendus, ne vel ab ægro transeunte vel aliis tangatur, inficiatq; convulsione. Transplantatione quadam videntur morbi miasmata nodulum occupasse, eademq; aliis posse communicare, si sine debita cautione tractetur. Ex furculis majoribus ejusdem sambuci excavatis solet laudatus Hartmannus cannas conficere, per quas tempore gestationis amuleti omnem potum hauriant adultiores ægri. Huic amuleto plurimi Epileptici salutem suam debent, quod in lucem jam protraho & multorum commodo repeto. Plurima sunt egregia à majoribus laudata, quæ negligimus, quia vel fidem superant, vel experientiâ confirmata non sunt. Arcano tamen hoc remedio mulierculas vidi feliciter cōvulsos percurasse. Et ut certius credamus, adducam communicata mihi exempla à *D. Ahasvero Payngk* Medico urbis nostræ & Chymico exercitatissimo, Amico in paucis charo, qui plusculos solo isto amuleto restituit, præmissis præmittendis, & intus quoq; exhibito oleo cranij humani, in liquore convenienti,

Vxori

Vxoris consulis Nestediensis sexagenariæ, boni habitus & genio liberalius indulgenti naries hæmorrhagia copiosè stillabant, qua argilla aceto mixta & venæ sectione sedata, interjectis aliquot mensibus Paralysis dextri lateris successit. Aqua Apoplestica resolutioni profuit externis artubus & collo illita. Tandem supervenit convulsio horrenda, qui extrema minabatur ut ad aliam vitam migratura videretur. Accersitus laudatus Vir, appenso amuleto supra descripto, brevi desperatam restituit, nec exinde quidquam mali hujus perpeffa est.

Sartor juvenis Hafnienfis tumido ventre diu aquam inter cutem collegerat, & ægrè corpusculum circumferebat. Nullis adjutus medicamentis, transmissio ad cerebrum sero copioso, Epilepticus evasit. Urgebat 24. horis paroxysmus & miserè torquebatur, sed appenso amuleto imminutus primum paroxysmus, mox planè remisit. Hydrops verò tractu temporis, alvi fluxu superveniente, detumuit. Alia exempla in urbe obvia silentio involvo, gratiam brevitate meriturus. Veribulo moneo non esse valde laborandum, an filum, quo nodulus consuitur, ab ipso ægro, vel alio sit tortum, modo usui sit aptum: Deinde si inducias largiatur morbus, internis medicamentis esse expurgandum corpus, ut amuletum conspectius fiat, deniq; antepilepticis ex cranio humano, ungula alcis, pœonia, aqua

aqua huridinum, liliorum convallium, &c. per os sumptis augendam esse amuleti virtutem, ut quæ non profunt singula, multa juvent.

HISTORIA LXX.

Gravida insomnis.

Nihil somno opportuno mortalibus utilius dulciusque, Deorum apud antiquos placidissimo & hominum delicio, quo fessa corpora mulcentur, & ad plures labores reparantur. Ægritudinis quoq; dulcis est medela, & malorum dolorumq; oblivio & levamen. Optatissimum accidit prægnantibus quod difficultates tumidi uteri sublevet, & robur pro futura partu firmet. Fulvis alis circumdatus fertur apud *Tibullum*. Nam celerrime homines occupat. Celerrimè quoq; eosdem deserit & alio detentus subinde reditum differt. Damno suo id experta fuit Nobilis Matrona, tertio mense gravida, quæ insomnes noctes diesq; & quadraginta transegit, unde infania oborta & Paralysis pedem crurumque, quibus prostrata vix partus operi sufficebat.

HISTORIA LXXI.

Ventriculi depressio.

Filia sexennis Viri Clarissimi post lentam talem, doloribus hypochondriorum & inappetentia

perentia seu prostrato ciborum desiderio, viribus fracta exspiravit. In dissectæ cadavere hepar universum ferè occupabát abdomen, ventriculumq; adeò ad inferiora depresserat, ut quasi ab œsophago videretur separatus. Pulmo sinister consumptus, tabis dederat occasionem. Neque enim ex salute hepatis dependet nutritio, sed à cordis pulmonumque sano statu. Cor sanguinis officina. Per pulmones verò universus sanguis circulatur, ex quorum vitio, hic detrimentum capit. Pondere igitur hepatis incrementis propter impeditam circulationem, depressus ventriculus, cibos vitæ necessarios respuit.

HISTORIA LXXII.

Insecta in lotio.

URinam verminosam in puerpera Cent. 1. hist. 89. annotavimus, ex putrido fœtu ortam. Vermes in lotio natantes vel in renibus generantur, ubi non rarò vermes vidi præsertim in canibus, vel in ipsa mātula ex materia putrida cum lotio excreta, sicut & in alvi fæcibus vermes nati conspiciuntur. Vermes innumeros in sanguine humano inveniri observavit *Athan: Kircherus* in illustri Arte Lucis & umbræ, & *P. Borellus* Centur. 3. Obs. 4. ut mirum non sit, si cum sanguine ad renes devolvantur. Ad illustranda ea, quæ supra protuli, afferam singulare exem-

exemplum Regiomonto nuper ad nos à D. Christophoro Tinctorio Archiatro Electorali missum: Nobilissimus Polonus nomine Binlobryski Cancellarius Episcopi Varniensis, homo plethoricus, carnosus, præterito anno gravissimè laborans scorbuto, in idem malum nuper incidit cum maximo lumborum dolore & calculi suspicione. Vsu medicamentorum Nephriticorū à laudato Tinctorio exhibitorum, arenulas excrevit cū vivis insectis nigricātibus forma scorpionis, sed magnitudine minima. Initio suspicabantur cimices desuper in matulam delapsos, verum nec figura nec color respondebat, imò matulā benè coopertā aliquoties dicta insecta invenerunt, numero septem, octo, decem. Lotiū redditurus semper in ductu urinario & circa lumbos deprehenderat æger dolorem verniculantem. Vixerant hæc insecta per triduum.

HISTORIA LXXIII.

Filum purpureum in Angina.

DE Transplantatione morborum in loco edigimus. Videtur in Anginæ curatione quædā ejusdem indicia. Summis laudibus ad Anginam commendatur filum purpureum, quo viperæ strangulantur, in quem finem nonnulla intorta fila Patavio mecum attuli, quibus vipersas

R 4

vidi

vidi strangulatas. Ne pro novo secreto habeamus, producam veterum testimonia, qui effectū suā experientia confirmarunt in affectibus colli. *Galenī* est observatio l. 6. *Simpl. Med. facult. lit. G. in Glycyfida*: Si compluribus linis & maxime marinæ purpuræ collo viperæ injectis viperam præfoces, eaq; postea cuiuspiam collo obvincias, mirificè profuerit tum paristhmiis, tum omnibus iis quæ in collo expullulant. Consentit *Ægineta* l. 3. de *Re Med. c. 26*. Filum lanæ purpura marina infectæ, quod obligatum est collo viperæ, ipsamq; strangulavit, deinde pro amuleto appensum est, mirificè quodammodo juvat tonsillas & colli affectiones, velut *Galenus* testatur. *Plinius Secundus* ad strumas idem amuletum laudat l. 30. c. 5. si circumligentur lino quo præligata infra caput vipera pependerit, donec exanimetur. Cui assentitur sine coloris additione *Plinius Valerianus* l. 3. c. 29. Rationem si quæramus, in occulto latebit. Vel ex vipera emanat curandi vis, vel à colore filii, vel ab utroq;. Vipera sola affectū expiat discutiendi vi & Alexipharmaca. Unde nonnulli caput viperæ torridū pro amuleto collo appendūt. Imprimitur illa vis filo extremo strangulationis conatu, quo ad extima colli latentes virtutes extruduntur. Fili color purpureus quid possit ad evocandum calorem sedandasque inflammationes tam calore quam similitudine coloris attrahentis paucis ignotum.

tum. Epithemata cordis rubro panno illinuntur. In extreno partium marcore fricationes ex eodem panno feliciter fiunt. Imbecilli ventriculo stragula occinea imponitur. *Marcellus Empiricus* c. 22. magdalia inducit phœnicio stomachoq; imponi jubet. Idem c. 1. Hemicraniae efficaciter mederi testatur herbam quandam in in capite statuæ cujuslibet nasci solitam, si in panno rufo lino rufo ligata capiti vel temporibus alligetur. Ad ani vitia tollenda idem laudat c. 31. plantaginis radicem pellicula vel panno phœnicio obvolutam lumbisque circumdatam. In variolis aliisq; exathematis provocandis non sine successu stragulas rubras lecto ægrisq; applicamus. Mulieres pulchritudinis studiosæ simili panno genas fricant ut splendido rubore facies niteat. Hinc oculis nostris inimicus est color, quo evocantur spiritus lucidi & ex aliorum sententia rubri, ut etiam in furorem animalia nonnulla adigat. Similitudine multi in natura adscribendi effectus. Calida & urentia ambusta currant evocantq; calorem, & congelata membra frigus glaciale sanat. Rhabarbarum flavum, bilem trahit, Agaricus candidus pituitam. Igitur partim coloris similitudine filum purpureum inflammationi faucium medetur, partim communicata à vipera strangulata potestate, quæ tamen similitudine quoque imputanda. Morbi strangulatorii idea filo à viperis impressa videtur,

tur, unde per transplantationem similis affectus ad cognati generis filum transfertur. Sunt qui magnis usibus expetant catenam, qua fures suspenduntur. Pro superstitionis traducimus, an verò hinc subsidium inveniant, ipsi viderint. Qui notas causas expetunt, adeant *Galenum* l. 6. *Simpl. med. fac.* ubi de amuleto pœoniæ disputat, cui rationi congruum videtur, aut partes quaspiam à radice defluentes ac deinde per inspirationem attractas, affectos ita locos curare, aut aerem à radice assidue mutari & alterari. Quod de lino nostro purpureo quoque dictum vult.

HISTORIA LXXIV.

Hirudo in aure.

Hirudines seu sanguisugas in hæmorrhoidibus sanguine delectari, vulgo notum. Hinc quum casu fortuito in ductum auris cujusdam Neapolitani hirudo irreplisset, sanguine aurem externam perfudit *Severinus*, quo revocatus hirudo fuit & aurium latebras reliquit. Alias artes ex auribus evocandi vel enecandi vermes vide apud *Oribasium* l. 4. *Loc. aff. cur. c. 39. 40.* Ex hirudinibus admotis multi ulcera nacti Neapoli, me præsentem, unde fistulæ aliaque mala ad Nosocomium miseros detruferunt. Phtisicum novi ibidem miserè exinde fistula ani tortum. *Chebibi Med.*

Med. Ebræus l. de v. s. testatur ex his vulneribus complures fato cessisse, inflammatione, dolore, abscessu. Panormi eadem audacia affectibus quibuscunque puerisque sanguisugas applicant statim ante ullam corporis purgationem. Habent aliquid veneni hirudines, quod an aqua simplici elui possit, non facile dixero, quum perpetuo in aquis degant. Adscenderunt nonnunquam ad intestina, teste *Zacuto*, & damna illarum in ventriculo recitat *Dioscorides* l. 6. c. 3. Certè tot tantisque casibus permotus *Severinus*, magnus ille *Chiron*, maluit semper ferro hæmorrhoidas aperiri, si ægri ferrent, quos alioquin astu quodam cogendos & decipiendos censuit. Indi aculeis ex cane *Hoitztlacuatzim* hirudinum loco utuntur, ut ex *Historia Mexicana* didici.

HISTORIA LXXV.

Tumidus venter post partum.

MULIER Hafniensis in vico S. Antonii edito legitimo partu, post sex hebdomadas alium enixa est, sed mortuum. Postea venter adeò tumidus permansit quasi plures fœtus superessent, sicut & thorax abdomen æquans. Scilicet gemello partu debilitata viscera colluviem humorum congefferant. Nostriis pueris familiare, si frigido potu nimium delecten-

lectentur, nec moderato tepore corpus semper madeat, tumidum ventrem referre. Molam in utero superfuisse, suspicio nobis nata. Cum Lunæ incrementis venter augebatur. Habita tamen fuit pro Hydropica. Suffocationibus sæpe obnoxia tandem miserè animam creatori reddidit. Consilium nostrum fuit dissecto corpore in causam tumoris curiosius inquirere, sed amicis illius repugnantibus, à suscepto destitimus.

HISTORIA LXXVI.

Timore mortui.

TImoris damna non pauci experti sunt, quorum passim exempla prostant. Metus mali sæpe pejor ipso malo, & mortis formidine quàm plures moriuntur ante mortem. Fugiendus timor vel eo nomine, ne torpidus metu sanguis ingruentia male facilius admittat. Corripiuntur multi hoc tempore pestilentia, quam forsitan constanti animo & sereno evaderent. Viduam novi primariam solo metu concepto, fati necessitatem sibi accelerasse. Vetula enim domestica timidiuscula visum sibi funus ex ædibus efferri narrabat, quo perterrita vidua statim lectum petiit & ad mortem devoto animo se composuit. Romæ mortuus est me præsentem Vir eminens, cui in thorace circa cor sanguis

guis concretus mortis causa credebatur, natus ex timore in mari concepto, quum iniquitate ventorum agitatus Genua solveret in Sardiniam trajecturus.

HISTORIA LXXVII.

Vermes ventriculi.

OB præteriti anni humidissimi intemperiem corrupto fœno, quo vescebantur pecudes, initio veris 1649. strenue & catervatim in Dania moriebantur. In dissectis bobus visæ in ventriculo vesiculæ plurimæ vermibus scatentes, à quibus erosus credebatur ventriculus illis, quæ sua sponte moriebantur. Anthor est *Trallianus* l. 7. c. 9. frequenter lumbricos sursum ad os ventriculi adscendentes, cardiacos affectus, immodicas animi defectiones, syncopas excitare, ut nonnulli statim cum à lumbricis roduntur, intereant. Hinc sæpe mors inopina infantes adultioresque opprimit, sine causa manifesta, ex ventriculo à vermibus perforato, præsertim si ad stomachum pertingant.

HIITO-

HISTORIA LXXVIII.

Urina suaviter olens in moribundo.

RARò suavi odore spirat lotium nisi post assumpta aromata, terebinthinam, &c. neque id semper, sed in sanis tantum ubi corpus purum transeuntes per venas odores non inficit, alioquin bene olentia assumpta fœtent quando excernuntur. In morbofo tamen corpore & mortis candidato gratissimum naribus nostris lotium vidi excretum. Civis Hafniensis scorbuticus & calculosus tandem imbecillitate ventriculi aucta cum vomitu materiam æruginosam, & serosam frequenter rejecit; singultus supervenit, nosque terruit. Urinæ claræ sine sedimento, colore aureo, interdum aqueæ, subinde suppressæ, cum pulsu debili & virium impotentia, frequentique diarrhæa. Odor initio urinæ fœtens erat, quemadmodum excreta alia, sequentibus verò diebus gratissimus sentiebatur odor quasi violarum. Suspicio nobis nata terebinthinam fuisse inconsultis Medicis exhibitam, sed neganti ægro, uxori, astantibusque credere sumus coacti. Nihil tamen profuit odoris suavitas, pulsus enim intermisit, & quanquam subinde recurreret, superveniente Angina, totiusque faciei ingenti tumore, brevi post exspiravit. Causam odoris suavis affer-

re in morbindo corpore difficile, si quidem Terebinthinam excludimus. Sali volatili urinæ adscribit *Borellus* Cent. 2. Observ. 33. quia violarum odorem optime redolere sale gemmeum marinum observavit, qui sale Terebinthinæ junctus augeat urinæ odorem. Cur autem putrescentibus humoribus non sit inquinatum, hanc causam credo, quod vomitu & diarrhæa aliò diverterit, & per vasa languentia liberè commearit.

HISTORIA LXXIX.

Uroscopia elusa.

VUlgus nimis subinde sollicitum in urinarum divinatione, Medicorumque hinc auctoritati struit insidias, vel astu vel simplicitate deceptum. Quomodo verò impostorum dolus animadvertendus, propositis dubiis summam exponit *Fr. Joël* l. 4. sect. 3. c. 48. Imprimis absentes peccant, qui Medici judicium pertentant & lotium impudenter transmittunt, quibus semper infensus fui contemptu potius quam responsione dignis. Sæpe ego peregrè ad me delatæ urinæ judicium inhibui, vel Scorbuto malo inquilino imprægnatum remisi. Placere impensè facetiæ *Ewaldi Screvelii* Medici Professoris Leidensis, quem summa cum voluptate docentem audiivi. Huic rusticus quidam Belga urinam hominis

casu

casu improvisio læsi attulit ut divinaret an ex curru quatuor rotarum, vel rheda duarum, esset lapsus. Statim ille, quasi arti suæ confusus, ex rheda excussum pronunciavit. Rusticus ex curru quatuor rotarum lapsum regeffit. Quæsit Screevelius, an omnem urinam in matula secum attulisset. Illo negante, quia aliquid in itinere fuerat effusum, hem! respondit Medicus, in effusâ urinâ reliquæ duæ rotæ inerant; nam in superstite lotio duæ tantum videntur. Ita stultam de urinis exoticis elusit quæstionē. Similem ferè historiam lege apud *Forestum*, & alia hujus census apud *Thonerum* l. 6. Epist. 21.

HISTORIA LXXX.

Auris perforatio.

STalagmia lobis aurium appendere veteri consuetudine usitatum. Utrique sexui luxus ille communis. *Plinius* l. 9. c. 35. *Parum fuerat in gulas condi maria, nisi manibus, auribus, capite, totoque corpore à feminis juxta virisque gestarentur.* Hinc annulatæ aures apud *Plautum* in *Pœnulo*. Displicuit tamen hic mos sapientibus: *Censori morum Seneca* l. 7. de *Benef.* c. 9. *Video uniones, non singulos singulis auribus comparatos, tam enim exercitata aures oneri ferendo sunt, junguntur inter se, & insuper alii binis superponuntur.*

Lau-

Laudat conjugem alter *Seneca* Tragicus in *Herc. Oet.* cui lapis *Eoa* lectus, in unda gemmiferas aures non detrahit. Turpe mulieri putat *Iuvenalis* Sat. 6. quum

Auribus extensis magnos commisit elenchos.

Maximè in viris luxum istum execrati sunt. *Servius* l. 1. *Æn.* de *Achille* apud *Sigæum* ejus statuam fuisse memorat, quæ imâ auris parte elenchum more femineo habuit. Exprobat id *Paganis Tertullianus* de *Pallio* : *Achilles aurem foratu effeminatus, quod illi apud Sigæum statua servat.* Nolo luxum aurium gemmiferarum defendere. Nudam perforationem laudo & sanitati proficuum cominendo. Me juvene familiare plerisque meminisse sine pompa auribus perforatis annulos gestare. Viam intento digito monstravit *Natura*. Foraminulum in lobo extare stalagmij seu in auribus destinatum ex *Casseri* observatione monnet *Hofmannus* l. 2. *Inst.* c. 84. t. 1. hoc nomine à *Riolano* in *Animadv.* notatus, qui tamen non omnium aures vellicavit. In aliquibus hujusmodi foveolam vidit *Lindanus* *Med. Phys.* c. 11. art. 1. t. 4. Perforatæ aures fontanellæ vicem gerunt, ex toto evacuantis. Mirus enim lobus auris cum corpore reliquo consensus, sive per nervulos, sive per arteriolas à carotide, sive per venas exjugularibus. Veteres auriculam vellicabant in adulatione propter toti-

us titillantem sensum. Memoria quoque sedes credebatur. *Plinius* l. 11. c. 45. *Est in aura ima memoria locus, quem tangentes attestantur.* *Horat.* l. 1. Sat. 9. *licet attestari : ego verò*

Oppono auriculam, rapit in jus.

Acron. Porphyrius, Erasmus, Lipsius, legunt ubique attestari : In antestatione memoriae causa actor auriculam imam tangebatur antestati, cum hoc verbo *Memento*, deinde injecta manu in jus trahebat. Tactus auriculae lobus in consensum trahit reliquas partes. Summo aestu si frigidam lobo aspergas, universum corpus senties refrigerari & refocillari, quod non simplici vice in me expertus sum. Perforatur innoxie, & propter arteriolas carotides, venulasque jugulares, capitis vasa, genas gingivasque perreptantia, non capitis solum, sed oculorum, dentiumque affectibus prodest, ut valde mirer cur *Bubulcus* ille in *Taurinis* apud *Scaligerum* de Subt. Exerc. 13. n. 1. cui auricula perforata fuerat fulmine, amens atque attonitus, nunquam recte aut sapere aut loqui valuerit, nisi extra auriculam inquiramus tantae stoliditatis causam. Testis est *P. Alpinus* l. 3. Med. Ægypt. c. 1. in Ægypto familiarem esse aurium scarificationem, praesertim prima ætatis parte, quo tempore è centenis quibusque pueris quadraginta vix reperiantur, quorum aures ob scarificationem gossipia non gestent. *Vallesius* l. 6. Epid. Sect. 5. part. 21. Empiricos quosdam vidit

vidit ischiaticis omnibus internam auriculæ partem, qua cartilago velut replicata tumorem quendam habet, cauterio urere, & eorum quosdam esse juvatos. Causam addit, quod multis Ischiaticis ex capite fluat materia, & ejus loci ustione intercipiatur. Idem didicit à Sarracenorum filiis, quos Philippus devicta rebellione à Granatæ finibus secedere imperavit. Ad dentium dolorem periodicum nihil præsentius habuit Patavii *Spigelius*, quam ferro candente eam Antelicis partem incidere, quæ supra concham immediate superiorem Tragi partem contingit, deinde vulnus consolidare. Singulare ophthalmiæ remedium ab amico mihi communicatum, lectoribus non invidebo. Auris lobulus lateris affecti perforetur, perque foramen factum trajiciatur turunda longiuscula ex inverso & convoluto cortice radicis Laureolæ. Sinenda eo loco turunda, donec auris & vicinæ partes intumescant, tum leviter turunda commoveatur, ut aquæ copia collecta effluat, qua exhausta detumescet auris, & ophthalmia sedabitur.

HISTORIA LXXXI.

Artificiosa Venarum Separatio.

Accuratas Anatome manus requirit, ut pulcrrior nitidiorque emergat. Divinam artem prostituunt, qui omnia incautè lacerant, & cani-

no more discernunt. Venarum artificiosa separatio multorum exercuit conatus. Dici non potest quantum & profit & delectet. Rudes sunt qui sola viscera spectantium oculis exponunt, quæ laniis quoque obvia sunt. Separato parenchymate hepatis, lienis, &c. vasorum inter se communionem seu anastomoses patent, obscuræ alioquin & dubiis ignorantium involutæ. Usus quoque habet in scirrhus hepatis & lienis, quem facilius emollimus, si parenchymata viscerum noverimus dissolvere. Exhibet plurculis hæc operatio negotium. In Theatro Anatomico compacta viscera rectè primo exponuntur, sed & separata vasis suis sunt spectantibus in tabella exhibenda. Quia id arte fieri debeat, quia plurimis vel ignota, vel per invidiam tecta, non gravabor sine invidia detegere, si quidem publicè non semel in corporum artificiosa dissectione feliciter mihi successit opus. Coquo leviter hepar & lienem, vel in aqua sola macero, deinde detracta facili negotio suaque sponte recedente membrana bacillo lato super lapidem concutio donec parenchyma friabile excutiat, quod reliquum est digitis abraditur. In liene citius perficitur, quia totus ferè fibrillis constat. Nitidior modus cum aceto, quod concretum sanguinem dissolvit, hinc utile spleneticis acetum, & in contusionibus collectus concretusque sanguis aceto infringitur. Alii lac aceto addunt. Nos aceto primas deferimus partes, cui

in-

incoquimus parenchymata. Operosior est venarum, arteriarum, nervorumque ex universo corpore separatio, qua memoriae fugienti impensè consulimus, & in expansis tabellis omnium vasorum ordinatam continuamque seriem representamus. Sceleta hujusmodi venarum, arteriarum, & nervorum sibi confecit olim *Spigelius*, postque eum *Veslingius*, *Leoniceus* perfectiora reddidere. Consobrinus meus fraternis nominibus amandus *D. Henricus Fuiren* elegantes tabellas quatuor possidet, publico Academiae nostrae Musæo dedicatas, quibus venæ, arteriæ, nervi ex cadavere exacti & exsiccati iusta magnitudine & serie agglutinantur. Quibus volupe idem imitari, caveant diligenter ne festinata & ponderosa manu fibrillas lædant, patientes præterea laborum sint & putridi cadaveris odoris. Elegantius enim opus emerget, si ex unico homine eximantur, ita enim sine lacunis, sine additamentis & laciniis omnium series servabitur. Initio ab abdomine factò ad reliquas partes omnes progrediendum, nec ullius ratio habenda præter vasa, quæ junctim omnia separanda prout occurrunt. Peracto difficili & fætoris pleno laborisque negotio, invicem cohærentes venæ, arteriæ & nervi totius corporis jam à cadavere libera spiritu vini immergantur & macerentur, cui alœ & myrrha immixta. Postea repetito labore venarum truncus cum suis propaginibus ab arteriis nervisque

S 3

sepa-

separandus, & arteriæ à nervis, ut disjuncta in tabulis explicari possint ligneis. His primum aciculis affigenda vasa eo ordine quo in cadavere locata sunt, quantum plana tabulæ facies permiserit. Deinde ubi probe disposita fuerint, remotis aciculis glutine temperato ex aloë, spica, &c. agglutinanda, folique ad exsiccationem exponenda. Exsiccata moderato aëris tepore, illinantur oleo spicæ, ut diutius à carie defendantur. Diversas tabulas sibi poscunt Vena Portæ, Venæ lacteæ & Lymphaticæ, nervus sexti paris, & vasa Pulmonaria, quia ob vasorum confusionem reliquis sociari non possunt. A carne sua quoque plantas, inprimis folia, curioso labore nonnulli resolvunt. In ficus Opuntia folio id tentavit *M. Aur. Severinus*, mihi que partem separatam concredidit. Fusè describit hunc contextum fibrarum separatarum in *Zootomia* part. 1. c. 6. p. 64. sed modum reticuit, quem mihi aperuit. Simplici infusione aquæ tamdiu macerat folia, donec fibris lignea duritie residuis, omnis carnea portio per se exsolvatur.

HISTORIA LXXXII.

Sensus abolitus.

JUvenis quidam sensum tactus & gustum amiserat, nec fame ulla premebatur, comedebat tamen

tamen ut sibi vitam servaret, ambulabatque scipione fultus, quia ubi pedes essent ignorabat. Aliam virginem sanam in Anglia novit D. London Medicus, amicus olim meus, quæ ulationes in collo non sentiebat, acumque & fronti impressam & unguium radicibus intrusam sine ullo doloris sensu admisit. Membrarum cerebri stupor vel nervorum vitium ibi incusandum. Hic verò sensus forsan membranis nervisque inerat, sed non dijudicabatur dolor inflictus, quod spiritus non figerentur in partibus, sive consuetudine sive alia causa, quemadmodum dolor maior minorem sedat apud Galenum, non quod non sit, sed quod non sentiat, seu dijudicetur. Alioquin ex Hippocratis decreto in statu p.n. dolentes dolorem non sentientes, h.e. qui dolorem discernere nequeunt, mente laborant. Aliàs notavi volam manus subinde calum obduxisse, ut ignitos carbones innoxie contrectaret.

HISTORIA LXXXIII.

Trimellorum partus.

UXOR Pastoris Hafniensis 1646. ad annum 50. vergens, octavo mense enixa est puellastres vivas, sed brevi post baptismum defunctas. Alia mulier paupercula hic oberrat, totidem liberis uno partu productis stipata. Circa finem anni 1656. plebeji uxor prope portam Orientalem tres

quoque peperit. Quorum primus totus benè formatus & vitalis sacro fonte tinctus, alteri quoque ad perfectionem nihil defuit, nisi quod occipiti carnea massa, mitræ instar, insterneretur. Tertius informis mole molam potius quam fœtum referebat. Rarò enim nostro cœlo trimelli perfecti sunt aut vitales, ob alimenti necessarii defectum in corporibus cacochymicis. Quamquam singuli suos habeant funiculos, unicæ tamen placentæ nonnunquam inferuntur, ex observatione Mich. Rupert. Besleri, Medici Noribergensis Clarissimi in Obs. Anat. Med. singulari: nonnunquam binis, quod obstetrix nostra vidit apud puerperam in platea Boreali.

HISTORIA LXXXIV.

Mola singularis.

Mulier in vico studioforum post triduanos parturientium dolores, elegantis fœtus spe delusa, peperit molam perraram, obstetrice aliisque mulieribus præsentibus & admiratione attontis. Caput ovillum maxima similitudine referebat, & forma & magnitudine. Dentes multi in maxilla prominente, pilosa cutis universa, & oculi ovilli, sed sine sensu ullo, vita cassi.

HIS-

HISTORIA LXXXV.

Cerasi officulum deglutitum.

INnoxie sæpe deglutiuntur ceraforum nuclei, & per alvum immutati dejiciuntur, ubi in cæco non rarò moram traxerint, ut plurimorum sectio docuit. Nonnunquam tamen, ut spinæ, partes quas transeunt, lædunt, si acutis suis eminentiis in via hæreant. Malo suo id experta est nuper matrona Helsingburgensis. Officulum cerasi per imprudentiam elapsâ æstate deglutivit, vel deglutire voluit. Substitit id ipsum in faucibus per plussculas hebdomadas non sine acerbis doloribus ob partim sensibilibium ruptam unionem. Tumor modo ovi columbini, modo pomi medio-cris magnitudine succrevit, sæpicule nonnihil detumuit, ad suppurationem tamen nunquam pervenit. Tandem officulum limoso & tartareo involucro sensim obductum noctu per tussim expuit in pelvium, nihil inde mali amplius perpeffa. Officulum cum rupto cortice tartareo ad me transmisit cum actæ rei historia Vir experientissimus *D. Christophorus Rostius* Poliater Helsingorensis, amicus æstimandus, qui integrum misisset, nisi ipsa ægra malleo contrivisset, exploratura quid esset. Cortex verò undique quidem nucleo inductus fuit, sed inæqualis & asper, acu-

tis hinc inde cuspidibus, lapidea duritie, colore ad viridem vergente. Nempe alimentis liquoribusque sumptis, qui tartarus inerat, officulo adhæsit, quemadmodum dolio affigi solet ex venis, & dentibus quoque agglutinatur. In duritiem verò calore inflammatae partis concrevit, sicut alii in corpore lapides densantur.

HISTORIA LXXXVI.

Apoplexia ex tumore cranii.

Mulier Leidensis tumorem in dextra sincipitis parte gestavit externum. Ablatus ille fuit celeri chirurgi periti manu, & sine ullo gravioris mali metu tres dies effluxerunt. Sed quarto die subito invadente Apoplexia moriebatur, ut prædixerat aliis motus similibusque exemplis Cl. *VValæus*, quia in hujusmodi capitis tumoribus læditur pericranium, quumque hærentes matres internæ dilatantur, concidit cerebrum comprimique ventriculos.

HISTORIA LXXXVII.

Bregma apertum.

TEste *Plinio* l. II. c. 37. Uni hominum infantia palpitat, nec corroboratur ante primum

num sermonis exordium. Nonnullis citius bregma clauditur, aliis serius. Puella mihi oblata quinque annorum, cui adhuc apertum erat, nec fari potuit. Excreverat illo hiantē ingens caput in latitudinem conspicuam, sed palpitans cerebrum non observabatur. *Baehnius* c. 2. de Ext. Corp. Part. mulierem novit, annorum viginti novem, cui nondum induruit, & si quando capite doleat, ea pars dilatatur, sine dubio ab humorum affluxu. Observavit *Parens* meus memoriæ beatæ, in Viro quadragenario membranofam illam partem & infantum more hiantem.

HISTORIA LXXXVIII.

Pulmonum remedia quo modo adhibenda.

Nihil difficilius in ulceribus pulmonum aliisque thoracis affectibus, quam ad partem affectam medicamenta producere, quæ ob viæ longitudinem vix quicquam proficiunt: intercipit enim pleraque; ventriculus per patentes œsophagi meatus, & antequam ad pulmones pervadant, vel imminuitur vis vel prorsus obliteratur. *Plato* quidem ad pulmones tam prompta viâ existimavit assumpta deferre, quam ad ventriculum. Sed epiglottis remoram opposuit qua larynx clauditur. Per rimulas tamen aliquid destillat potulentæ materiæ, quod experimento nos docuit *Hippocrates*
ex

ex mactato recenter porco, in cujus pulmonibus liquor coloratus reperiebatur, quem antea hauserat. Et *Iulius Iasolinus* l. de Aqua in Per. in nobilissimi cujusdam Viri cadavere quærens causam mortis, invenit pericardium adeo humore distentum, ut eo pressio aliquid humoris per os effluerit. Consultum igitur est, ut pectoralia medicamenta, sive tabellæ, sive linctus, sive alia fuerint, diutius in ore contineantur, ut sensim per laryngis latera destillent. Tardum tamen hinc auxilium. Ut confertim irruant ad pulmones, artificium respirationi erit sociandum. Decoctum ex herbis vulnerariis, pectoralibus, aliisque pro medentis scopo, parandum est, cujus vaporem æger inspirans cum aëre continuo recipiat. Hinc enim vapor integris viribus & brevi via ad pulmones delatus, ægritudinibus illorum medebitur. Eo pacto universus aër in commodum ægri inficiatur, nec cum Galeno in Ægyptum navigandum. Musæum nobis Ægyptus erit.

HISTORIA LXXXIX.

Vulnera digitorum lethalia.

Periculo neutiquam carent digitis inflicta vulnera propter tendinum nervorumque contextum, quibus etiam leviter punctis convulsio concitatur. Si per transversum rescindantur, minus subest

subest periculi, quod remedium laudat *Celsus* in convulsionibus à semi secto nervo ortis. Tumultu orto inter studiosos & Nobilium aulicos, superiori anno mense Decembri, Nicolaus Andree Theologiæ studiosus insons portam Regentianam ingressurus triplici in digitis manus dextræ vulnere sauciatur. Curatur à Chirurgo & dextrè quidem obligatur, sed sequenti die orta convulsio, quæ indies exacerbata undecimo die miserè juvenem literatum bonisque moribus præditum extinxit. Cum præscisi nervi tendinesque convulsionem concitare non possint, suspicabar nervum tendinemque semisectum has juveni turbas creasse. Neque enim inflammatio partes læsas corruperat, quia exsanguis, sed tam sana vulnera, etiam post mortem, viscebantur, quasi ruperrimè inflicta. Jussu superiorum D. *Simon Paulli*, D. *Paulus Moth*, & D. *Christianus Ostensfeld*, Collegæ mei honoratissimi, me ægrotante, cadaver lustrarunt, & tria ibidem deprehenderunt vulnera, quorum primum satis amplum conspiciebatur in flexoribus secundi internodii pollicis manus dextræ, nervisque amputatis, ad ipsum os primum pollicis & metacarpo proximum penetrabat paulo infra flexuram secundam. Alterum erat ejusdem manus medii digiti, qui in secundo internodio amputatus erat prominente osse. Tertium denique vulnus in ejusdem manus anularis junctura secunda, & præter ea in
toto

toto cadavere nullum observarunt. Interrogatis insuper ijs, qui frequentes ægro adfuerant, adeoque exquisitis ijs omnibus quæ decumbenti acciderant, æstimataque memoratorum vulnorum constitutione, censuerunt atque pronunciarunt, vulnus pollicis ut ut non sua natura lethale, periculosissimum tamen & ob insecuta symptomata gravissima, veluti convulsiones vehementes totius, ægro lethale extitisse.

HISTORIA XC.

Fucus mulierum Groenlandicarum.

TAm Græcis quam Romanis mulieribus, pulchritudinis studiosis, olim usitatum accepi-mus, supercilia nigrore fucare, vel ex stibio, aca-cia, fuligine, aliisque pulveribus nigris inducto colore. Sequentibus seculis apud Græcas mansit fictus iste ornatus, & ad Turcas deinde transit teste *Bellonio* lib. 3. c. 35. qui collyrium vulgatum Turcis describit, ex ære, galla & aqua composi-tum, quo sibi feminæ supercilia tingunt. Alius fucandi modus in Groenlandia frequens, quod ex feminis ad nos delatis nuper didicimus. Barbaræ illæ quidem, inest tamen & his suus fastus. Non pingunt faciem nativo colore fuscā, sed cicatri-cibus impressis hinc inde compungunt semper, ut operæ parcant, conspicuis. Non tam ad ornatum aut pompam hæc spectant stigmata, quam ut nu-biles

biles feminæ nuptæque à puellis impuberibus aliqua nota distinguantur. Duæ ad nos delatæ mulieres grandiores natu stigmata hæc ostendunt, tertia juvencula 16. annorum caret. In mento, barbæ virilis instar, ab infimo labio ad menti extremum lineæ descendunt nigræ & profundæ, parallelæ, numero 13. & 15. quales supra nasum in superciliorum confinio quoque visuntur, & sub palpebris oculorum inferioribus. Quantum ex relatione Capitanei Davidis Tenelli intellexi, qui navi sua illas abduxit, filum rudius sævo balenarum inductum cum acu per faciei cutem traducunt, cujus vestigia impressa relinquantur, nigra & cicatricibus profundis simillima.

HISTORIA XCI.

Camphora olfactui nocens.

SUbtilem partium est camphora, ut etiam collo febricitantium puerorum appensa tractu temporis consumatur & in auras evanescat. Ingrato sapore multorum palato est molesta, ut ex Aqua Analeptica Rulandi saporis gratia, à nonnullis eliminetur. Olfactum lædere, pauci observarunt. Pharmacopæus Nicopiensis industrius & artis suæ peritus Christophorus Heerfard, de se nuper mihi referebat, à nimio Camphoræ usu in officinis præparato & contrectato, olfactum prorsus sibi esse læsum & ablatum, ut sensu hoc neces-

necessario carere exinde debuerit, reliquis sensibus ad artis suæ & vitæ cōmodum salvis integrisque. Nempe molles sunt nervi olfactorii facileque exsiccantur vel prorsus diffuunt, quod falsas observatum. Mirum autem mihi semper visum, nec causam scio manifestam, cur quidam bene olentia olfaciant, fætida verò non feriant sensum, nec percipiantur, quod proprium est Avunculo meo honoratissimo *M. Iacobo Finchio*, Physices Professori Regio & Academiæ nostræ seniori.

HISTORIA XCII.

Cuculi nutrix Curruca.

DEcantata est apud veteres cuculi ingrati historia; non procul fabulis. Supponere nempe ova in currucae nido, & exclusos cuculos à curruca tamdiu ali, donec adultiores cibis quarendis apti nutricem devorent. Cui volupe, consulat *Gesnerum*, *Aldrovandum*, *Ionstonum*, aliosq.. Pauci tamen inducti sunt ut crederent, vera esse quæ de cuculo magno veterum cōsensu traduntur. Quid his oculis viderim, perituræ chartæ committam. In ædibus Religiosissimi Episcopi Scaniæ D. Petri Winstrupij Magni Theologi, æstate præterita, cum negotiorum causa Londini Scanorum apud Cl. V. M. Vitum Beringium Historiographum Regium, amicum veterine necessitudine & constantia suspiciendum, commorarer, vidi

cucu-

cuculum juniorem caveæ inclusum, & in horto ejusdem suspensum. Nulla esca à domesticis unquam oblata fuit nec aqua, sed statis vicibus avicula passeri similis advolans per patulum foramen caveæ cuculo escam potumque adportavit. Ter quaterque redit curuca, & adventum sibilo nunciat, quem cuculus in cavea simili sono excipit, & hiante rostro præstolatur. Alieno hoc victu ultra hebdomadas octo vixit, nec alia nutrice indiguit. Ita multa quæ falsa credidimus & exoleta, inter vera sæpe se commendant observantium diligentia. An verò nutricem currucam adultior cuculus devoret, videre nequivimus. Curruca enim oberante nescioquo fato mortua, cuculus quoque ob alimenti defectum interit.

HISTORIA XCIV.

Cranium monstruosum.

Cerebri in humano cranio insignis est magnitudo, & si ad corporis molem conferatur, duplo pondere excedit bovinum. Exercentur enim copiosæ hinc animæ functiones, brutis denegatæ. Præterea ad erectam corporis figuram pondus confert. Miraculo vel monstro simile est cranium animalis cujusdam ex Scaniæ prato prope fluvium ad magnum nostrum *Vormium* allatum, cujus iconem nobis exhibuit in Masæi sui historia l. 3. c. 26. Figura est globosa instar humanæ, sed

T

tenue,

tenue, leve, magnitudo duplo ferè superans humanum. Hominis verò cranium non esse ex proboscide & dentium constitutione laudatus Vir divinavit. Nasus enim prominet proboscide similior quam naso. Dentes molares duo supersunt in maxilla, figurâ ab humanis & animalium aliorum diversâ: nam quilibet dens parte qua extat, prominentias quinque semilunares habet. Quum igitur nec ad humanum cranium, nec ad alterius animalis similitudinem accedat, pro monstro interpretor, & lusu naturæ, tam magnitudine quam formâ ludentis, inter aquas generatum. Auget suspicionem apud me, quod orbitæ oculorum nulla supersint vestigia, quibus tamen nullum animal ejus magnitudinis, si naturale sit, carere potest. Fuit cum crederem ossa crescere posse, & hinc sæpius ex terra ossa gigantibus similia erui, & consuetam magnitudinem excedere.

HISTORIA XCV.

Scorpiones deglutiti.

FAtuus quidam Patavij araneas omnes obvias devorabat. Sunt multi qui innoxie hauriant aquam vinumque in quo araneæ fuere immerse & suffocate, de quo disputat *Salmuth. Cent. 2. Obs. 22. 48.* Innoxium ætera animalculum telis texendis industrium, quibus feliciter in febribus depellendis utimur, carpo applicatis. Romæ alius
 inte-

integræ mentis, scorpiones sine damno deglutivit, prius tamen accurato modo complicatis chelis caudæque spiculo, ne linguam & fauces deglutientis læderet pungeretque aculeus. Nempe indemnes scorpiones ex se nihil damni inferunt nisi lædantur, cum vim vi per aculeum retorquent. In Italia sæpe dormienti mihi accubuerunt, sed à me non læsi, innoxij fuere. Aculeo chelisque explicatis nocent, quum ex ipso corpusculo oleum conficiatur scorpionum adversus venenatos morsus. In ventriculum demissi, si aculeum exserere non possint, nihil mali inferunt, quia humiditatibus lentis involvuntur, & ventriculi actione statim transmutantur. Ita externa multa, ut sinapi, muria, allia, oleum vitroili, cutem exculcerant, internè sumpta non ulcerant partes. Quatuor hujus rei causas affert *Galenus* l. 3. de Temp. quibus non acquiescit *Steph. Rodericus Castrensis* l. 4. Quæ ex Quib. c. 10. qui legi meretur. Scorpiones non homines tantum læsi aculeo figunt, sed in sui generis alios sæviunt. Elegans spectaculum fuit in Musæo Consobriini mei D. *Henrici Fuires*, cum Patavij degeremus. Commis- si invicem scorpiones, singulis vitris ante seclusi, in mutuum exitium conspirarunt. Qui magnitudine superabant, minores totos devorabant, exceptis aculeo & chelis, sine dubio aliquot dierum inedia ad hanc lanienam armati.

HISTORIA XCVI.

Mesenterij Abscessus.

Longæ molestæque ægritudinis in Nobilissimo Viro nuper defuncto, compendium faciam. Abscessibus scatebat mesenterium à longo viscerum vitio, nativa dispositione, continuatis studijs, & obstructis hæmorrhoidibus Continuo per alvum purulentam materiam excrevit, subinde eandem per lotium, ut jurares renes esse infensos. Semper tamen fæces alvinæ puræ prodire, unde extra intestinum rectum, cujus sphincter dolebat, & exiguo foramine tuberculi patebat, sedem affectam suspicabamur. Nempe glandulæ mesenterij apostemata congeuerant, quibus maturis ruptisque pus eructabatur. Remittebant subinde dolores expurgato copiosè pure, sed coacervata materia & ad suppurationem maturante, dolores & febris in dies singulos oriebantur, ex Coi præfagio, tumque pure ad librarum pondus prodeunte, levabatur, donec idem malum quasi per circulum rediret. Tormina circa umbilicum & ruptio quasi vesiculæ in abdomine ante sentiebantur, quam pus efflueret. Dolorum, puris, patientiæ ægri constantis nullus modus. Omnium remèdiorum successum pertinax malum & locus abstrusior frustrabatur. Oneratis vexatisque ita interioribus, natura tandem copiâ pressa puris,
exitum

exitum moliebatur. Inter os sacrum & coxendicis in musculis femoris macula orta, mox tuberculum cum tussi protuberans ad tactum flatu pureque plenum. Quia alia nil profuerunt, ferro apertum. Pus copiosum effluxit tanti factoris, tantæ acrimoniæ, ut scutellæ argenteæ qua excipiebatur, aquæ Regiæ instar, nigrorem induxerit. Hinc pertingebant dolores ad scapulam ejusdem lateris sinistram, forsan per lacteum thoracicum ex abdomine ad axillas protensum; computruerant enim interiora pleraque, ut compressa digito chirurgi scapula secundum dorsi longitudinem, per patulum in glutinæis musculis foramen, pus spumans cum sibilo egrederetur. Toto morbi decursu nulla quies, nisi à quotidiano laudani Opii usu. Dolores incredibiles, purisque effluvium demum cum vita cessarunt.

HISTORIA XCVII.

Sanguineus fluxus rupto umbilico.

Puer bimulus optimi & Nobilissimi Viri, sanus hilarisque ulnis nutricis gestatus subito sanguineo fluxu comprehenditur, quo per alvum ubertim sanguis purissimus velut secta vena profiliit, & spacio horarum paucarum, sine alio symptomate, morti dedit. Dysenterix nulla suspicio, quum torminibus caruerit, & maturatum fanus reclamet. Neque ex hemorrhoidibus

prodiisse, præsentēs testantur. Lien vitio immunis. Examinatum cadaver nullum vulnus, nullas contusiones, nullaque signa dubia monstrabat; quibusATRIX accusaretur. Umbilicus verò mortis causam videbatur illustrasse. Retractus ille erat, & quasi ruptus, ut digito immisso non attingeretur, forsan obstetricis culpa post partum nimium rescissus, qui saltu & motu quocunque corporis faciliè rumpebatur. Antiqua est traditio, vasa umbilicalia disrupta subitam mortem afferre. Unde verò sanguis? Dysenteria apud Ægyptios, teste P. *Alpino*, sanatur digito in umbilicum intruso, eoque pluries circumducto. Certè rupto umbilici fune inter abdominis partes continentes & intestina collectus sanguis in tumorem exurgeret. Natura tamen sæpe vias ignotas nobis eligit. Si rectè conjicio, hepar ligamento laxato concidit, vasaque sua comprimendo, sanguinē per ductū cholidochicum ad intestina propellit:

HISTORIA XCVIII.

Lotium ex scroto.

TOrbernus Borresen emeritus nauta Regiæ classis, extra portam orientalem Hafniæ habitans, herniosus olim & calculosus, miserè decumbit. Non tam auxilii fiducia quam misericordiæ testandæ gratia hominem invisi, vidiq; obturatam urethram, usuque cessante flaccidam. Lotium non
per

per consuetum canalem reddit, sed per alia foraminula callosa in scroto dispersa. Duo observavi in scroto, unum antica parte, alterum postica. Præterea tertium in canali ipso circa radicem ad latus sinistrum. Hinc omnis urina excernitur, subinde cruore mixta. Ad summam atrophiam jam pervenit, cibosque se averfari solidos testatur, & sitis depellendæ gratiâ lympham modico vino temperatam amat.

HISTORIA XCIX.

Sexennis puella sine voce.

PUellula Nicopiensis ad tertium usque ætatis annum sana & ad loquendum facilis. Subito tamen illi sublata vox, cum fatuitate, linguaque intumuit, ut ore contineri nequeat, deglutiendisq; cibis impedimento sit, quos avidè satis appetit. Corpore reliquo imbecillis, ut sola stare nesciat agens jam annū ætatis sextum. Solliciti parentes, supernaturalē causam subesse suspicati, iudicium meum per amicum expetiere, an naturalis causa dari possit hujus æpistias, & quid de recuperanda salute in posterum sperare debeant. Ego verò in responsione, nullus dubitavi superfluis in capite juvenulæ humiditatibus mali originem deberi, quibus & nervi & cerebrum copiosius irrigantur, ut sensibus necessarijs non sufficiant, linguamque velut spongia iisdem oppletam tumidamque nec

oris angustis contineri, nec voces dentium al-
 lisu formare: imminere verò majus ex lethargo
 vel Paralyfi periculum, nisi maturis remediis &
 abundans liquor evacuetur & derivetur, & ca-
 put cum nervoso genere roboretur.

HISTORIA C.

Leonis Anatome.

LEO Africanus novem mensium à Clemen-
 tissimo Rege nostro Studiofis Medicinæ
 concessus, in Theatro anatomico privata exer-
 citatione naturæ cultorum 19. Dec. 1656. seca-
 batur. Si quidē verò non ubivis obvia est Leo-
 nis Anatome, non gravabor visa ibidem à me
 aliisque in animalium Principe annotare, neuti-
 quam Leoni mortuo insultaturus, sed fortitu-
 dinis roborisque decantati desiderio. Abdomen
 feræ primo intuitu tumidum videbatur, quasi
 aqua inter cutem lateret, quæ copiose per os
 demortui effluxit. Tumorem intestina crassa
 prodebant, quæ tumida & fætentia, liquidis
 excrementis nigris plena universum abdomen
 duobus gyris tegebant, magnitudine ventriculo
 ovillo similia. His subjacebant tenuia, verè te-
 nuia & exilia, prorsus vacua. Omentum ad se
 ventriculus traxerat ferè sine sevo, marsupio vel
 rete conficiendo peraptum. Cæcum intestinum
 amplitudine cum crassis intestinis certabat, à
 quibus

quibus discerni non potuisset, nisi in pervia extremitas quasi indice digito nobis monstrasset, iisdem excrementis ad satietatem catens. Valvula coli eleganti mitræ capacis figura se commendabat. Ventriculus capax, sinistra parte, seu fundo, tumidus, media contrictor, dextra pariter prope Pylorum latior. Pylorus parum aberat quin ad duodenum medium totus esset cartilagineus. Interna ventriculi facies ordinatis plicis seu laciniis velut membranulis distinguebatur, quarum 21. numerabantur iuxta serie per circulos æqualiter distantes dispositæ, singulæ necessebantur aliis exilioribus, quasi valvulæ cordis suis columnis. In his loculis alimenta diu asservata felicius concoquuntur. Hepar grande satis subfuscum, octo lobis divisum. Vesicula fellis ingens, plena bile atra. Audax enim & iracundum est animal. Umbilici funis non hepatis, sed medio mesenterio inferebatur, duplici diversaque origine. Lien lividus linguam vitulinam forma & magnitudine referebat. Pancreas ab humano nihil diversum, nisi quod durius esset. In Renibus, capsulis, vasis spermaticis nihil peculiare. Omnia tamen homini similia quam canibus, vesiculæ seminales, plenæ seminali materia candicante.

Thorax compressus & angustus. Sternum erat singulare. Ad medias costas extensum per cartilagines demum separabatur. Musculis ster-

ni utrinq; longus latusque. Minor pectoralis medium sternum sex ossibus circularibus constabat media cartilagine junctis, quæ grandioribus in unum os solidantur. Pericardium densius pinguedine abundabat. Cor humano persimile, magnitudine & forma. Grumosus sanguis in dextro ventriculo, ut in suffocatis assolet. In utroq; ventriculo concrementum adipo glandulosum offendimus, simile polypo cordis supra nobis descripto. In dextri ventriculi sinu altero triangulare hoc coagulum castaneæ magnitudine per fibrillas annexum latebat, sua membranula tectum, quod sensim attenuatum vasis instar adscendebat ad venam arteriosam, ibiq; in trifidum ramum in pulmonibus dividebatur. In sinu primo ventriculi sinistri similis substantia hærebat, quæ totidem ramis arteriam venosam ingrediebatur, quot ipsa arteria venosa. In principio aortæ tertium concrementum adiposum conspiciebatur, profundius cum trunci divisione disseminatum. Impeditus hic ibique sanguinis fuerat circuitus, unde viscerum cachexia, & aquosi liquoris in corpore congestio, sanguis præterea crassus alibi in venis comparuit, sed calidus, more canum, digitosque corrugans. Accedebat peregrini hujus humidi aëris frigidi vitium, insuetum leonibus imprimis junioribus.

Ad organa vocis progredientes, vidimus asperam arteriam insolitæ fabricæ, Cartilagineos circulos

culos integros sed ampliores, ut invicem implicarentur, & unius circuli extremitas sub altera inflecteretur; mobili tamen & compage soluta, nisi quod membrana consueta jungerentur. Hoc artificio ad mugitum utitur Natura, explicantur circuli inflexi mobiles in mugitu, sono extenso repletique copioso aëre, redeunt deinde minusque spacium occupant in silentio. Spectaculo hoc spectatores omnes impensè afficiebantur, imprimis Illustris atque Generosissimus Vir D. Evaldus Kleist, Electoris Brandenburgici Consiliarius & ad Regem Daniæ Augustissimum Legatus, magnus Naturæ artiumque fautor, in cujus præsentia illustri sacra hæc tractabantur. An cum ætate integri hi circuli expandantur & sinuicirculum efforment, dubito, cum omnia pariter increcant & augeantur. Amygdalæ oblongæ propendebant, rubentes, octo digitos transversos longæ, latæ duos, oblique per asperæ arteriæ latera serpentes. Nervus recurrens conspicuæ magnitudinis. Larynx cum Epiglottide, rima, cartilaginibus cōiunctis ab homine non deviabant, sed majora omnia. Lingua asperrima, setis brevioribus obsita, quæ digito tacta aculeos quasi habebat, ut lambendo enecare animalia ad pastum possit, cruoremque derafa cute eliciat.

In capite dentes caninis similes, sed pauciores, Musculus temporalis amplus & fortis, quia mordendo leo valet, observante quoque *Galeno* l. 9. us.

Uts. Part. c. 19 Cranium craffiffimum & poro-
 sum, necdum in os condensatum. Cerebrum &
 cerebellum humano simile, si magnitudinem
 excipiamus, vix enim decimam partem illius
 æquat. Ventriculi nitidi & satis ampli pro pro-
 portione cerebri. Ventriculus verò quartus no-
 bilis capacitate humanum superat, quia pluri-
 mis spiritibus animalibus indiget leo ad robu-
 stos sensus. Robur artubus debet brevioribus
 & musculis compactis, & validissimis tendini-
 bus. Ad hos copiosi spiritus conflunt in amplo
 ventriculo nobili generari, quos largus corporis
 sanguis ubique tumidis venis conspicuus alit.
 Parum ossa conferunt, quæ solida non sunt, sed
 cavitatibus prædita manifestis, quod viderunt
 quoque *Columbus* & *Severinus*, cum medullæ u-
 bertate, nec solida sine ingenti pondere & cor-
 poris gravitate esse potuerunt. Nolo de ossibus
 plura referre, quæ ex scelere Leonum in ma-
 gnarum Musæis petantur. Sufficiat in hac se-
 ctione vidisse & monuisse contra veterum cre-
 dulitatem, & ossa Leonum esse medullosa, &
 collum vertebriis distingui ad facilem cervicis
 motum.





I N D E X H I S T O R I A R U M.

Numerus prior Centuriam, posterior Historiam notat.

A.

A Bortus cum Mola.	3. 1
Abortus revocatus.	4. 57
Abscessus fracturæ salutaris.	3. 84
Abscessus post febrem.	3. 48
Aceti vires Alexipharmacæ.	4. 13
Ex Æthiöpe natus.	4. 5
Alius nonnullorum obstinata.	4. 40
Amuleta elusa.	3. 62
Amuleta Epilepsicæ.	4. 69
Anatome Cachectici.	3. 67
Anatome calculosi pueri Brixiani.	3. 34
Anatome calculosi pueri Leidensis.	3. 35
Anatome embryonis 16. mense nati.	3. 51
Anatome febricitantis.	4. 18
Anatome femine diarrhæa defunctæ.	3. 99
Anatome Hominis sani.	4. 6
Anatome Monachi.	4. 10
Anatome mulieris quæ prægnans falsò credebatur.	3. 6
Anatome nuper natæ puellæ.	3. 25
Aneurismata Varia.	4. 41

V

Anti-

I N D E X

<i>Antiphaticæ varia.</i>	3. 28
<i>Apoplexia ex tumore cranii.</i>	4. 86
<i>Apostema spinæ.</i>	3. 65
<i>Aquæ in Variolis Vſus.</i>	3. 89
<i>Arterioſus ſanguis ſerofus</i>	3. 29
<i>Arthritus menſtrua.</i>	3. 63
<i>Articulorum exſiccatio.</i>	3. 11
<i>Auris perforatio.</i>	4. 80

B.

B <i>Etonicæ experimentum.</i>	3. 97
<i>Bregma apertum</i>	4. 87
<i>Bubo peſtilens.</i>	4. 63

C.

C <i>Alculi per annum excreti.</i>	4. 49
<i>Calculoſi & hernioſi Anatome.</i>	4. 8
<i>Calculus ex ſcroto ſuppurato.</i>	4. 8
<i>Camphora olfactui nocens.</i>	4. 91
<i>Cataracta rara.</i>	4. 21
<i>Ceraſi oſſiculum deglutitum.</i>	4. 85
<i>Cetorum genera.</i>	4. 24
<i>Cingulum mercuriale.</i>	3. 79
<i>Civetæ Anatome.</i>	4. 1
<i>Clitoris Oſſeum.</i>	3. 69
<i>Clyſteres ad ventriculum penetrantes.</i>	4. 68
<i>Cæcus eruditus</i>	3. 44
<i>Colica ex ſero.</i>	4. 58
<i>Colica periodica.</i>	4. 59
<i>Colli diſtorſio.</i>	4. 48
<i>Conceptus ſine menſium ordinato fluxu.</i>	4. 37
<i>Convulſiones Paralyticæ.</i>	4. 3
<i>Convulſivi motus ex dextro hypochondrio.</i>	3. 20
<i>Corii humani Vſus & præparatio.</i>	3. 87
<i>Corona Urinæ.</i>	4. 26

Cranium

<i>Cranium monstrosus.</i>	4. 94
<i>Cuculi nutrix Currucæ.</i>	4. 92
<i>Curationes Amethodicæ.</i>	4. 39

D.

D entes decidui.	4. 65
Digitorum vulnera lethalia.	4. 89
Dolores post partum.	4. 52

E.

E Briosi & Volvuli Anatome.	4. 47
Emplastra magna.	4. 9
Epilepsia ex vermibus.	4. 7
Epilepticæ Anatome.	3. 80

F.

F Ebris in sene Nonagenario.	3. 82
Febris malignæ Anatome.	3. 68
Filum purpureum in Angina.	4. 73
Fontanella in dorso.	4. 33
Fragorum vis diaphoretica.	3. 57
Fucus mulierum Gronlandicarum.	4. 90
Fungus maxillæ.	3. 53

G.

G Ravidæ Anatome.	4. 27
Gravida insomnis.	4. 70
Gruis Anatome.	4. 12
Gulonis Anatome.	4. 30

H.

H Æmorrhagia in Prægnante.	4. 36
Hermaphroditus pariens.	3. 12
Hermaphroditus sine cute.	3. 5
Hernia Umbilicalis.	3. 22
Hirudo in aure.	4. 74
Hydropicæ Anatome.	4. 20. 25

V 2

Hydropicæ

<i>Hydropici Anatome.</i>	3. 81
<i>Hydrops mirus.</i>	3. 23
<i>Hydrops vetulæ.</i>	3. 83

I.

<i>Icterus Quartanæ superueniens non semper malus.</i>	3. 4
<i>Impotentia ex incantamento.</i>	3. 71
<i>Infans à glire erosus.</i>	4. 61
<i>Infans hirsutus & rugosus.</i>	3. 38
<i>Insecta in lotio.</i>	4. 72
<i>Intestinorum inflammatio.</i>	3. 96. 4

L.

<i>Lapides per alvum excreti.</i>	4. 11
<i>Lapis in utero.</i>	4. 64
<i>Leonis Anatome.</i>	4. 100
<i>Lien induratus.</i>	4. 60
<i>Liens exsectio.</i>	4. 51
<i>Linguae portentosa magnitudo.</i>	3. 43
<i>Lochia per alvum expurgata.</i>	3. 19
<i>Lotium calculosi copiosum.</i>	3. 33.
<i>Lotium ex scroto.</i>	4. 98
<i>Luxatio Costarum.</i>	4. 66
<i>Lymphatica Vasa capitis.</i>	4. 38
<i>Lymphatica Vasa in homine.</i>	3. 2

M.

<i>Mammarum moles.</i>	3. 46
<i>Manus exsiccata.</i>	3. 54
<i>Maxilla superior semper immobilis.</i>	3. 86
<i>Medullæ spinalis Anatome.</i>	3. 9
<i>Melancholicus digitos sibi detruncans.</i>	3. 30
<i>Melancholicus loqui nolens.</i>	3. 18
<i>Menstrua ultra 50. annum fluentia.</i>	3. 90

Menstrui

<i>Menstrui fluxus ubertas.</i>	3. 8
<i>Mesenterii abscessus.</i>	4. 96
<i>Mictio cruenta.</i>	4. 45
<i>Mola singularis.</i>	4. 48
<i>Monstrum intestinis exsertis.</i>	3. 32
<i>Monstrum sine cranio.</i>	3. 7
<i>Monstrum sine oculis.</i>	3. 47
<i>Mors & flamma ex Vino adusto.</i>	3. 56
<i>Mors ex vulnere acus.</i>	3. 42
<i>Motus sine corde.</i>	3. 15
<i>Mulier splendens.</i>	3. 70

N.

Natta.

3. 40

O.

O *Lus ex Mirrhide perniciosum.*

4. 46

Orbes Majores Marini.

4. 34

P.

D *E Pane observationes.*

4. 16

Pedes manus vicarii.

3. 26

Penis duplex.

4. 22

Penis gangræna.

3. 27

Penis constricti periculum.

3. 52

Pes abscissus.

3. 85

Pestilentia magna 1654.

3. 60

Phrisci Anatome.

3. 2

Pilosa capitis cutis vivo evulsa.

3. 76

Pinguedo exsuperans in puella.

3. 88

Pleuritides Error.

3. 73

Pluvina lapidum.

4. 49

Polypus cordis.

3. 17

Prægnans menstruata.

3. 13

Prægnantibus Noxius annus.

3. 59

Prognosticum Lethale.

4. 31

I N D E X.

<i>Ptyalismus singularis.</i>	3. 77
<i>Puella novennis menstruata.</i>	3. 91
<i>Puella sexennis sine voce.</i>	4. 99
<i>Pullities in sterquilinio.</i>	3. 100
<i>Pulmonum remedia quo modo adhibenda.</i>	4. 88
<i>Pulsus intermittens.</i>	4. 42
<i>Purgantium dubium tempus.</i>	3. 93
<i>Pus & sanguis sine pthisi.</i>	4. 17
<i>Pustulae in ventriculo.</i>	3. 92

Q.

<i>Quartanae typus.</i>	3. 55
-------------------------	-------

R.

<i>Ructus Hystericarum.</i>	3. 21
-----------------------------	-------

S.

S <i>Anguineus fluxus rupto umbilico.</i>	4. 97
<i>Sanguis in corpore concretus.</i>	3. 94
<i>Scabies post Quartanam.</i>	4. 35
<i>Scintillae ex capillis.</i>	3. 37
<i>Scombrus Monstrosus.</i>	4. 54
<i>Scorpiones deglutiti.</i>	4. 95
<i>Scroti tumor.</i>	3. 64
<i>Sensus abolitus.</i>	4. 82
<i>de Septo cordis pervio experimentum.</i>	4. 20
<i>Serum in sanguine glutinosum.</i>	3. 49
<i>Spasmus Cynicus ex lue Venerea.</i>	4. 53
<i>Spasmus Periodicus.</i>	3. 39
<i>Spectra Funesta.</i>	3. 58
<i>Splendores in Epilepticis.</i>	3. 45
<i>Sudor vini rubri.</i>	4. 62
<i>Superfetatio rara.</i>	4. 14

Tela

T.

T ela capiti inhaerentia,	4. 67
Timore inductus morbus,	3. 4 ⁱ
Testæ ovi Vfus in calculo,	4. 23
Tetanus ab esu anguillæ,	3. 24
Thoras compressus,	3. 31
Timore mortui,	4. 76
Transplantatio Morborum,	3. 66
Trimellorum partus,	4. 83
Tophacea materia in collicis doloribus,	3. 75
Tubercula in facie,	3. 72
Tuberosus pueri pes,	3. 10
Tumor Vagus,	4. 55
Tumulorum periculosa apertio,	4. 32
Tympani ruptura,	4. 29

V.

V ariolæ Epidemicæ	4. 50
Variolis denati Anatome,	4. 43
Venæ ex pulmonibus rejectæ,	3. 98
Venæ sectio in dorso,	4. 33
Venarum artificiosa separatio,	4. 81
Venarum intumescencia,	4. 56
Venter post partum tumidus,	4. 75
Ventriculi depressio,	4. 71
Ventriculi dolores periodici,	3. 50
Vermes dentium,	3. 96. b
Vermes ventriculi,	4. 77
Vermes ex gravida,	3. 14
Vesicatorium devoratum,	3. 16
Viperarum ingluvies,	4. 15
Vnguium resectio,	3. 78
Vnicornu Grœnlandicum,	4. 4
Vomica Pulmonum,	3. 95
Vomitus Bufonum.	4. 19

Vomitus


I N D E X

<i>Vomitus Contagiosus,</i>	4. 44.
<i>Vomitus sanguinis lethalis,</i>	3. 61
<i>Vomitus sanguinis salutaris,</i>	3. 36
<i>Vrinæ suspensum annulare.</i>	3. 74
<i>Vrina suaviter olens in moribundo,</i>	4. 78
<i>Vroscopia elusa,</i>	4. 79
<i>Vteri prolapsus cum urinæ incontinentia,</i>	4. 2
<i>Vulnus sclopeti in occipite.</i>	3. 3

F I N I S.


Cl. Viri
P E T R I P A W I
O B S E R V A T I O N E S
A N A T O M I C Æ
S E L E C T I O R E S ,
Jam primum editæ ,

Curante
T H O M A B A R T H O L I N O !



HAGÆ-COMITIS,

Ex Typographia ADRIANI VLEACQ.
M.DC. LVII.



TH. BARTHOLINUS

Lectori S.

Promiserat Academiae Leidensis Curatoribus Petrus Pav. Anatomicus suo tempore paucis comparandus, in Operum catalogo Observationum Medicarum & Anatomicarum Tomum: Sed fidem exsolvere non potuit, morte sine dubio praeventus. Ubi interea signatae Observationum chartae haeserint, ignorare cogor, nisi penes Filium Johannem Pavium delitecant in situ, quem Clarissimus parentis discipulus Henricus Florentius, de Peste aliàs sollicitaverat. Nonnullae illarum ad me beneficio D. Henrici Fuiren, Medici Excellentissimi, Consobrini loco amandi, pervenerunt, manu cujusdam Discipuli ne-

gligentius exceptæ , ex quibus selectiores
Bibliopolæ , in meis Historiis Anatomicis
edendis occupato ad prælum concessi , ne
mea culpa diutius cum blattis tineisque lu-
etarentur. Manibus tanti Viri grata in
bene meritos memoria id debui , quod meis
optarem. Vale. Hafniæ XXIV. Decemb.
Anno cIo. Io. CLVII.

P. P A-

P. PAWI

OBSERVATIONES ANATOMICÆ.

OBSERVATIO I.

Anatome gravidæ.

VTerus in gravidis in eam assurgit molem, ut dextra sui parte jecur, sinistra ventriculum attingat, uti Anno 1590, Die 8. Jan. vidi in grvida, cui aperto abdomine dissecui uterum, fætumque jam ante mortuum & planè morbidum extraxi. In apertione reperi placentam seu uterinum jecur quod *ævelor* membranæ incumbit, nilque nisi affusio sanguinis est, quem per umbilicum attrahit fœtus. Examinaui & umbilicum, qui ulnam facillè in longitudine æquat, nodi autem illi quibus insignitur, nil nisi reduplications venarum & arteriarum sunt, inter se, hoc est, iis locis venæ & arteriæ in se convolvuntur. Examinaui Arteriolas umbilicales, reperi que eas inferi in truncum arteriæ aortæ, ubi inguina perreptat, & ad crura inferius tendit, idque jam infra ipsius arteriæ aortæ bifurcationem. Vena umbilicalis in jecur

inse-

inferitur, quæ hic pervia manifesta erat (uti & arteria) licet in provectis nulla interna cavitas deprehendi possit. Urachus verò umbilico hic non erat affixus, verum infra fundum vesicæ exigua eminentia conspicua erat, quæ minimi digiti crassitiem in longitudine non æquabat, nec vel diligenter diuque mihi inquirenti parva esse ullo pacto deprehendi poterat. Animadverti ossa capitis quamdiu perfectus non est fœtus non esse conjuncta, verum qua futurae sunt ibi dissoluta fluctitabant, & non nisi pericranio vincta detinebantur.

OBSERVATIO II.

Anatome Diabetis & cæci.

ANno 1590, die 25. Octobris, Voorsanti (qui est pagus duobus circiter milliaribus Leida distans) dissecai filiam præsidis Hollandiæ Zushi 18. annor. Hæc aliquot ante obitum annis Diabete laborarat, adeoque sitibunda extiterat, ut unico die non raro urnas duas tresve potus assumeret, nec minore quantitate urinam indies reddebat Paucis ante obitum diebus cœcitate hæc correpta fuit, qua uterque oculus clarus quidem existebat, nec aut in membranis aut humoribus vitii aliquod apparebat, ipsa tamen nec lumen quidem candelæ oculi admo-
tæ

tæ percipiebat. Huic aperto cranio reperi insignem vesicam, quæ nervos opticos occuparat circa crucifixionem : hac novacula pertusa circiter lib. f. aqueæ materiæ limpidissimæ effluxit. Vtpote materia potius præ renum imbecillitate attrahi amplius cum non posset ἀναρροηθῆς facta, ad caput regurgitarat, eumque locum occuparat. Renes huic non absumpti, verum flaccidiores solito, figura cinericea non impensè rubra.

OBSERVATIO III.

Anatome Calculosi.

ANno 1591, die 16. April : dissecui (præsente D. Heurnio & D. Exalto) senem septuagenarium, qui ardente febre eadem die extinctus fuerat. Hic viginti amplius ante obitum annis de intolerabili laterum dolore conquestus fuerat, nimirum infra costas nothas, mucosam substantiam una cum urina diu excreverat, nunquam tamen aut arenulas aut calculos. Huic sinistri Renis substantia carnea intus absumpta planè erat, in eoquæ hærebat calculus duas habens radices satis insignes. Dexter verò Ren à calculo quidem immunis erat, attamen à naturali constitutione abiens, dum substantiam flavidam magis obtineret, coloremque subfuscum. Vreteres huic mirum in modum ca-

paces apparebant. Vesica admodum distenta, extusque in fundo liquor apparebant vesiculæ ei adnatæ. In interna vero capacitate magnum reperi calculum pendentem Vnc. ii cum Dr. ii. Hic levis etsi æqualis ex parte existebat, non asper aut inæqualis, uti qui in Vere extrahebatur. Ventriculus huic interius in fundo concreto sanguine conspersus apparebat, sumpserat enim non diu ante obitum ab imperito temerarioque medico pilulam ex præcipitato.

OBSERVATIO IV.

Anatome pueri Ventrem dolentis.

ANno 1591. die 25. Julii, aperui (præsente D. Heurnio, D. Exalto) puerum circiter 10. annorum. Hic aliquot ante obitum annis continuè de dolore in sinistra abdominis parte, universoque ventre conquestus fuerat, variusque Medius, hic Jecur, ille Lienem, tertius Renes in vitio esse dicebat. Reperi ventriculum admodum exiguum, adeò ut nullam ex omnibus intestinis esset, quod non mole eum excederet: naturale autem hoc erat vitium primæ conformationis. Intestina autem omnia mirum in modum distenta, & veluti inflata, quod ventriculus nunquam ritè concoquens, semicocta ad intestina transmitteret, quæ in flatus

tus ibi conversa continuis fermè colicis doloribus infestatum testabantur. Pancreatis corpus glandulosum reperi adeò durum & exsiccatum, ut primo tangens, ingentem me percipere calculum existimarem. Ren sinister huic plane & omnino pure consumptus erat: totus namque abscessibus scatebat, ita quidem, ut simulac vel digitis vel durius premerem, rupto abscessu purulenta emanaret substantia. Eo autem dissecto magna semicocti (nihil incruenti habens) copia effluxit. Præterea & ingentem inæqualem in eodem rene album deprehendi calculum ex illuvie illa purulenta procul dubio natum. Oppositus dexter Ren adeò exiguus erat, ut vix reperiri posset, nec figuram obtinebat naturalem nec substantiam, fungosus namq; & flaccidus admodum tangenti occurrebat.

OBSERVATIO V.

Anatome Hydropica.

ANno 1591. die 6. Novembr. in templo publicè secui sceminam octogenariam Hydropicam. Huic mirum in modum turgēbat abdomen, existimabantque è vulgo non pauci eam fascino laborasse: simulac cutis separata esset, copiosa serosa materia in latere dextro emanavit, quæ præ nimia copia à natura eo deposi-

ta fuerat. Pertusis abdominis musculis protinus copiosa erupit aqua, quæ universum replebat abdominis spatium. Quin & in Thorace omnia vitalia viscera aquosæ Materiæ largiter innatabant. Ablata quoque calvaria ventriculi aqua repleti erant, affatimque cerebrum aquam profundeabat. Peritonæum huic cum Omento prorsus absumptum cernere erat : nam simulac musculi abdominis dissecti erant, cernere erat in inferna abdominis capacitate copiosa filamenta nervea, eodem fere modo, uti in ventriculis cordis; ast copiosiora hæc erant, & hinc inde vesiculas fecerant, quibus pertusis aqua effluebat. Hæc corpora nil nisi reliquias peritonæi & omenti notabant. Omnia huic ferè viscera non naturali erant statu. Vesica reperiēbatur nusquam. Intestina omnia in unum conglomerata, & veluti in globum acta, qui globus exterius undiquaque peculiari eaque satis crassa cingebatur membrana, uti videbatur ex excrementis aquosæ substantiæ nata. Jecur solito multò durius, nihil tamen lapidei intus continebat, nec ei dolor naturalis, ast albidus, seu pallidus. Lien durus admodum & solito multo major, ponderosusque figuram mutarat suam, dum & in longitudine & latitudine accreverat. Ventriculus tamen, Pancreas, Mesenterium sana omnia. Renes solito multo flaccidiores, tum & versus dorsi vertebrae plus solito

to

to retracti. In cordis dextro ventriculo substantiam quandam pituitosam viscidamque reperi vitellum ovi colore & substantia referentem ex pituita lenta & viscida ibi concretam. Aqua quæ huic effluxit vix duabus urnis (Emmers nostratibus) capi poterat.

OBSERVATIO VI.

Anatomie gravidæ.

ANno 1592. die 6. Januarii, aperui sceminæ gravidæ uterum, quæ semestrem foetum utero gerebat: huic abdomen mirum in modum turgebat, quod tamen ab utero non erat, verum omnia intestina & ventriculus mirum in modum flatibus distenta erant, adeo ut simulac leviter solummodo tam ventriculum quam intestina pertudissem, magna vis flatuum exiret, ipsaque confestim subsiderent, (quod si huic injectus fuisset clyster procul dubio vitam servasset.) Uterus sex mensium foetum ferens etiam nunc sub intestinis ac omento demersus latebat, quibus amotis in conspectum quidem prodibat, sed non tali aut figura aut colore præditus, uti sit cum maturus est foetus. Color ille talis qualis in Virginibus, aut non gravidis, sanguineus nimirum ad nigrorem vergens, nec æqualiter distans apparebat, sed
hinc

hinc inde inæqualitates planas ostendebat, ne fundi extremitate locum umbilici excederet. Eo dissecto in conspectum prodiit fœtus suis membranis involutus, ita situs, ut incurvatus licet, caput tamen inferiora versus os uteri convolutum haberet, nates superiora, dextrum uteri respiceret latus. Facies ac corporis pars anterior latus uteri sinistrum cruribus flexis genubus oculos utrinque tangebatur, calcibus verò nates, brachia reflexa caput versus, ubi in fronte manus conjunctas habebat. Umbilico enim cingebatur, nisi quod bis in ambitu dextrum ei brachium cingeret. Magnitudo corporis universi in longitudine talis erat, ut duos palmos cum dimidio, id est, octo digitos longus existeret, longitudo tamen umbilici accedebat ad palmos sex, seu digitos transversos 24. Caput respectu reliqui corporis maximum: cujus omnia ossa fluctuabant iis locis, ubi in adultis per suturas conjuncta sunt, nec sibi invicem aliter hærebant, nisi quod cutis capitis ea conjuncta teneret. Aperto pectore fœtus vidi os sternon integrum esse, nec ulla ex parte vel minimum apparebat vestigium transversarum suturarum aut harmoniarum, quibus septem, è quibus constare volunt, ossa connecti videbantur. Cor, Pulmo, tum & omnia abdominis viscera integrè formata erant. Jecur respectu reliquarum partium longè maximum. Ventriculus dissectus chylum colore albo præditum effundebat. Vesica
urinaria

urinaria mirum in modum urina distenta apparebat, quâ compressâ per penem exiliebet urina. Urachum pervium esse nulla arte perspicere poterat. Cutis foetus adeò tenera, ut vel leviter solummodo tacta digito excoriaretur, & à subiectis partibus discederet. In matre aperto Thorace, vidi pulmonem in dextro latere per valida filamenta nervea aliquot locis costis adnatum, tum & in utroque latere non naturali colore pulmonem insignitum: asthmatica enim fuerat foemina. Cutis matris in abdomine mirum in modum rugosa existerat, innumerisque plicis prædita. In cordis gravidæ dextro ventriculo similem reperi substantiam, uti in hydropica paulò ante dicta foemina, nimirum substantia erat pituitosa, consistentia lubrica, eodem planè modo, ac si vitellum ovi membranula etiamnum sua inclusum videas, eundem namque luteum vitello ovi similem representabat colorem. Sectio hæc habita fuit præsentem D. Heurnio, D. Johanne Exalto, D. Johanne Arly, aliisque spectatoribus.

OBSERVATIO VII.

Anatome Jecoris suppurati.

Anno 1593. die 30. Octob. Juvenem publicè dissecui; qui ex Jecoris suppuratione obierat. Huic simæ Jecoris partis ea portio quæ in dextro est hypochondrio incumbens reni dextro

trò sphacelo correpta erat, tota livida ad nigredinem accedens apparebat illa portio, intusque tanta puris albi & concocti continebatur copia, ut viginti libras pus effluens æquaret. Huic Ren dexter totus quoque purulentus erat, & planè consumptus, nihil præter membranam externam superstitè. Eidem diaphragma, qua parte in sinistro latere Jecori accumbit, magno foramine exesū erat, adeo capaci, ut duos pugnos admitteret.

O B S E R V A T I O V I I I.

Anatome Phrenitidis & Convulsionis.

A Nno 1593. die 18. Nov. in Nosocomio D. Catharinæ præsentibus M. Johanne Simonis & M. Alberto Chirurgis, Viro ablato cranio caput aperui. Hic per biennium conquestus fuerat de dolore in occipite, tandem hic phrenitide ac convulsivis motibus correptus subito interiit. Huic crassa cerebri membrana aliquot locis exesa erat variis foraminibus, idque potissimum in bregmate sub sagittali sutura, ubi ea cum corporali jungitur. Ex iis foraminibus effluebat & per membranam dictam effusus erat sanguis ferè concretus, ater ac adustus, admodum foetens. Tali quoque sanguine distenta erant vasa per anteriorem crassæ meningis superficiem discurrentia, quin & ea quæ numerosa per tenuem disseminata sunt. Huic intra Cerebellum abscessus hu-

humore non naturali scatens, repertus fuit. Erat is humor colore excitrino ad pallorem vergens: Pallida bilis nimirum. Ipsa cerebelli substantia flaccida omnino, molliorque multo quam cerebri substantia.

OBSERVATIO IX.

Anatome Tabifici.

ANno 1593. die 26. Nov. Juvenem publicè dissecuimus in Nosocomio obierat. Huic utrâque pulmonis pars validè costis adnata erat. Hinc in utraque pulmonis parte varii abscessus purulenti, quia & variis locis pituita adeò in pulmone concreta cernebatur, ut calculi tangenti esse viderentur, imò perfectam calculosam duriem non paucis locis obtinebat. Hic tabe quamvis consumptus, vixque hæreret ossibus, copiosam tamen aquam pericardio continebat. Vidimus in hoc Venam cavam eodem fermè loco oriri ex Jecore, quo venam Portæ, quamvis una sui parte ex gibba Jecoris parte prodire videntur. Tum & ferri potius recto ductu per Jecoris superficiem, quam ex eo prodire, veramque esse hanc ad rem picturam Vesalij p. 458. Nec verum esse, quod nonnulli dicunt, duobus truncis seu ramis è Jecore emergere hanc venam, quorum alter statim reflectitur inferiora versus. Eandem venam vidimus non mittere ramum ad cordis dextrum

dextrum ventriculum, uti Galenus scribit, sed eo modo se jungere, ut Vasalius, Columbus aliique scribunt. Spinali medulla examinata in hoc subiecto, observavi extremam ejus membranam, spacio vacuo intermedio distare à subjectis uti in cerebro membrana dura; ex quo suspicio mihi est moveri & spinalem medullam. Eadem spinali medulla dissecta, eam solidam iatus, nec ullo modo bifidam esse vidimus.

OBSERVATIO X.

Anatome Cuniculi.

ANno 1593. præsentibus omnibus Studiosis Medicinæ in loco Anatomico ante meridiem dissecai Cuniculum. Quos vidi in multis convenire cum cane ac homine, sed carent omento. Suspensorio Jecoris ligamento eodem modo uti homines (secus verò ac canes) donati sunt. Intestina habent copiosissima, præcipiè vastum intestinum colon. Maximè conspicuum habent intestinum Monoculum seu cæcum, adeò ut id ostensus cuniculum meritò dissecaerim. Quum & Mesenterium venæque Meseraicæ, tum & omnes fermè rami venæ portæ. Cætera eodem modo ut in homine se habent, Ventriculus inquam, Jecur, Renes, cū vasis Emulgentibus, Lien, Vesicula bilis, Pancreas, Diaphragma, Cor, Pulmo, quin insuper Vena cava, Arteriæq; Aorta eodem modo Ramis suis per corpus distribuuntur, uti in cæteris.

OB-

HISTORIA XI.

Anatome Viri cultro interempti.

ANno 1594. die 4. Mart. Virum publicè secui, qui sibi ipsi cultro violentas intulerat manus. Hic vulnus sibi ipsi inflixerat in abdominis regione dextra, statim sub costis, quo vena cava tam magna sanguinis copia in capacitatem effluxerat abdominis. In viro hoc observavi terminos musculi temporalis, qui tales sunt. Anterior hic musculus attingit partem illam protuberantem ossis jugalis quæ orbitam oculi in facie constituit, posterius circiter pollicis latitudinem ultra auriculam se effert; metiendo versus os occipitis, terminus ejus seu circumferentia extrema, qua sagittalem futuram spectat, & dimidia longitudo ejus spacii, quod ab extremitate seu pinula nasi est ad concursum usque sagittalis coronalisque futuræ, nimirum sume mensuram ejus spacii, quod ab extremitate nasi per ejus longitudinem perque medietatem ossis frontis ad concursum usque duarum suturarum excurrit, ejus lineæ dimidium collocatum una sui parte in bregmate, seu suturarum concursu, altero sui extremo, tanget extremam circumferentiam musculi temporalis. Quin & eadem mensura apex seu summitas futuræ Lambdoidis deprehenditur.

Huic tres inerant venæ Emulgentes, atque spinalis medulla manifestè à pia Matre in duo

B

latera

latera divisa apparebat. Quin & eadem in lumbis non nisi ex multis velut loris seu chordis sibi invicem junctis constare conspiciebatur (uti in cunctis fit hominibus.) In eodem maximum corporis examinavi nervum, quem nervi ex osse sacro prodeuntes constituunt, undique eo per longitudinem dissecto etiam substantiam interiorem nihil medulloso continere, sed similem esse substantiæ spinalis medullæ in lumbis, hoc est, ex multis veluti filamentis nerveis oblongis constare, cinctis duplici membrana. Quin & conspicuè ostendi in hoc supra omnia septem vocata paria nervorum cerebri oriri ex spinali medulla, intra cranium etiam ipsos nervos opticos.

OBSERVATIO XII.

Anatome veneno demortuorum.

ANno 1594. die 21. Junii, præsentē D. Heurnio, & D. Trencatio, puellulā annuam in foro Boario aperui, quæ fascino laborasse ex eoque obiisse dicebatur. Huic abdomen admodum intumuerat, maculæ purpuræ circa claviculas apparebant. In Thorace huic omnia integra. Jecur pallidum imò albicans ex valida intemperie frigida conspiciebatur. Intestina omnia præsertim colon turgidum admodum flatibus. Ventriculo aperto ejus orificiū superius duobus locis erosum apparebat, ita ut venenum ei exhibitum potius videretur.

Anno

Anno 1594. die 10. Novembris, præsentibus D. Heurnio, Bontio, Chirurgis M. Johanne Simonis, & M. Alberto Nosocomii præfectis, aperui virile cadaver jacens in ædibus M. Jacobi van Werckhoyst in't Doozteijnde. Hic cum ei curandum à lue venerea tradiderat, jamque sanitati ubi videbatur restitutus, de habitu cogitaret, subito exclamare cœpit, venenum sibi propinatum fuisse, postmodum phrenitide correptus aliquot post horas obiit. Jussu magistratus præsentis prætoris hujus dissectus œsophagus cum ventriculo. Vidimus oris ventriculi superioris internam substantiam erosam ac exesam, præterea universam internam ventriculi membranam ita exesam, erosam ac putridam, ut ligneo cultello, imò digito simulac tangeretur facillimè disrumperetur. Colore tinctus ventriculus intus ex purpureo nigro erat, procul dubio causticum corrosivum aliquod pharmacum is hauserat.

OBSERVATIO XIII.

Anatome Hydropici.

ANno 1595. die 6. Januarij: Virum publicè secui è Nosocomio Amsterodamensi. In hoc frontis muscoli omni ex parte tegebant musculum temporalem, ita ut nulla sui parte is conspici posset, nisi dictis ablatis. Tam venæ quam arteriæ emulgentes tres erant numero. Æqua-

sem habebant renes situm. Lien huic adeò intumuerat, ac induratus erat, ut tres libras lance libratus penderet. Pulmo fermè centum locis, costis ac pleuræ arctissimè adnexus hærebat. Hydropicus obierat: Fluctuabant namque ac aquæ innatabant omnia quæ in abdomine erant. Erat aqua flavi coloris, fœtoris pessimi.

OBSERVATIO XIV.


Anatome febris Hæctica.

ANno 1595. die 16. Jan. præsentibus D. Trelcatio, Heurnio, Trutio (in een doers stract gaende bande Hooge Woert na't Lebendeel) puellam annorum undecim aperui, incantata quæ credebatur, adeò miris symptomatibus per octennium correpta fuerat. Hinc Cor intra Pericardium aquæ virulentæ innatabat, cui color viridis ac si marinam vidisses aquam. Causa mortis pancreas erat, quod mirum in modum intumuerat, jecoris cavæ parti arctissimè adnatum erat, ita scirrhosum ut lapidem tangere te existimares. Dissectum candido plene intus conspiciebatur colore, haud aliter ac si albam pituitam admodum indurata tractasses, extenuata omnino erat extincta febre hæctica.

OB-

OBSERVATIO XV.

Anatome Viri publica.

ANno 1595. die 16. Febr. In virili cadavere publicè dissecto vesiculæ fellis duos ductus observavi, quorum unus ad ventriculum tendebat. Vena portæ non uno trunco sed tribus furculis è jecore prodibat, qui conjuncti tandem ipsum truncum constituebant. Vena  tam in sinistro quàm dextro conspiciebatur latere, ramus dexter jungebatur cum ramo è trunco cavæ infra emulgentem. Variis locis ductus per interiora pulmonis obstructi erant à crassa melancholica materia cui calculosa ferè durities. Venæ emulgentes tres. Vena adiposa non à trunco cavæ, sed ab Emulgente oriebatur. Cerebrum bifidum, hoc est singulæ cerebri partes dextra ac sinistra iterum sectæ erant.

OBSERVATIO XVI.

Varia in Anat. observationes.

ANno 1595. die 12. Aprilis, præsentibus M. Joh. Simonis, M. Alberto, puerulum triennem aperui, cui Pancreas induratum, vehementerque adnatum ventriculo ac Jecori, tum & venæ portæ. Jecur valide adnatum peritonæo latere sinistro & diaphragmati, lien admodum induratus.

B 3

Anno

Anno 1595. die 16. Decembris in corpore virili publicè dissecto, in quo dexter Ren vena carebat Emulgente, nilque præter arteriam Emulgentem ei inferebatur.

Anno 1596. die 24. Jan. In subjecto virili quem Amstelodamenses ad nos miserant, à gibba jecoris parte filamenta multa nervea, quæ ligamenti suspensorii in modum jecur neceiebant peritonæo. In eodem vesiculæ bilis ductus bifidus erat, unaque sui parte in intestinum jejunum, altera in colon inferebatur.

OBSERVATIO XVII.

Anatome Monstri.

ANno 1596. die 4. Febr. Infantem primum natum (vixerat 24. horas) publicè, præsentibus D. Scaligero, Heurnio, Merula, Bontio, D. Arty, magna spectatorum corona dissecuri. Huic mola adnata erat occipiti, quæ capitis humani justæ ætatis molem æquabat. Cingebatur hæc cute, tum & intra illam duabus membranis, quarum altera à dura, à pia matre erat altera. Hisce dissectis, sanguinem concretum tum & rorum paulò quam coagulatus sanguis duriores ex multis inæqualibus frustulis (condilomatum instar) constantem vidi, per quem venæ ac arteriæ copiosæ etiam discurrebant. Informis hæc massa radices egerat in ipsa cerebri substantia, nam occipit-
os

os orbiculare habebat foramen, è quo prodibat moles hæc, imò ad ventriculos Cerebri usque, cerebrum corruptum omninò erat. Cranii figura mirè in hoc infante vitiata erat, nam frontis os planum ac depressum erat, adeò quidem ut fronte carere eum omnes dicerent. Sincipitis ossa depressa in se considerant, duasque ostendebant cavitates conspicuas, occipitis os in acumen prominebat, ac protuberabat acuminata illa pars foramen ostendebat. Sub frontis osse aliud secundum os enascebatur. Cutis cranium hoc cingens adeò crassa existeret, ut adulti hominis cutem superaret, quæ ea parte qua mola ei annexa, non densos solum, sed prolixos habebat capillos. Aliud in hoc infante monstruosum, quod scrotum vacuum ac testibus carens esset. Intus retracti aperto abdomine utrinque in lumbis collocati videbantur à natura eo loco, quo foeminarum testes siti. Habebant tum vasa seminaria præparantia quin & deferentia, quæ (quod visu mirum) projiciebant se extra abdomen loco in Viris solito, extremitatibusque suis in ipsum penis corpus terminabantur. In hoc infante Umbilicum cum examinarem, vidimus conspicuè venam umbilicalem in jecur terminari. Ast arteriæ umbilicales extendebant se vesicam urinariam versus, & in ipsum truncum arteriæ aortæ paulò supra lumborum vertebrae se infigebant, ut à Const. Varolo illud benè notatum, qui has arterias in foetu radices dorsales

foetus appellat. Etiam Urachum hic examinavimus, quem sive per longitudinem sive per transversum dissecarem, solidum, nec ulla ratione fistulosum intus deprehendi. Revera itaque nil nisi ligamentum existit, quo vesica foetus ab abdomine pendula sustinetur; etenim vesica mirum in modum distenta erat. Ad intestina quod attinet, diversitas inter intestina tenuia & crassa hic evidenter apparebat, nam tenuia rubicundo colore tincta erant. Ast crassa atro ac ingrato utpote stercorebus, corruptoque menstruo referta.

OBSERVATIO XVIII.

Anatome pueri veneficio interempti.

ANno 1596. die 26. Aug. petitione D. Trelcatii, infantem dissecui decimestrē, qui veneno à venefica osculo inflicto interfectus dicebatur. Huic omnia quæ intra thoracem sana ac integra, solum in abdomine jecur pallidum ac non naturalis coloris. Cui appendens vesicula bilis multo quàm per naturam major capaciorque, tum & limpidissima aqua repleta, imò distenta, in qua nihil lutei coloris conspiciebatur. Ast diaphana planè apparebat vesicula.

OBSERVATIO XIX.

Anatome fecoris inflammati.

ANno 1596. die 14. Sept. petitione D. Trelcatii Virum quinquagenarium dissecui, cui D. Heur-

Heurnius medicinam fecerat. Hic inflammatione jecoris laborarat, quod viscus torrido ac adusto conspiciebatur colore. Pertusa autem ejus membrana parenchyma univcrsum in putrilaginem abierat, maximamque puris copiam effundebat, potissimum ea sui parte gibba quæ diaphragmati adhæret. Adfuerat cōtinua febris, quæ cordis succulentiam nativam ita consumpserat, pyri in modum uti contractū conspiceretur, flaccidum planè, haud aliter ac si pulmonem tetigisses. Huic pulmo variis locis adnatus costis conspiciebatur.

OBSERVATIO XX.

Intestina erosa.

A Nno 1596. die 26. Octobr. In virili subiecto Delphis strangulato ac à me publicè dissecto, vidi pulmonem in dextro Thoracis latere validè adnatum diaphragmati. Costis verò multis locis variis fibris. Huic intestina variis locis superficie seu membrana externa, erosa ac exesa, punctisq; nigris respersa. Ren dexter huic corrugatus planè, ac in duos velut tresve renes sectus.

OBSERVATIO XXI.

Anatome veneficio mortuæ.

A Nno 1596. die 13. Decembris, petitione D. Trelcatii præsentè D. Heurnio, septuagenariam aperui, quæ veneficio tacta dicebatur, quod ipsum confirmavit autopsia. Etenim huic Cor
B 5
triplo,

triplo, quam pro consuetudine & proportionem
 subjecti majus, adeò enim intumuerat, parte sui
 dextra, ut universum Thoracis latus dextrum re-
 pleret, distentum una pericardium. Ea parte qua
 auricula cordis dextra venam excipit cavā ingens
 aneurisma in cava vena conspiciebatur. Dissecta
 auricula dextra reperta in ea materia concreta co-
 loris flavi, condensata admodum. Aperta verò
 vena cava, ipsoque corde, magna copia concreti
 planè sanguinis nigerrimi se effundebat: Nec so-
 lum illa cavæ parte, quæ cordi se jungit, sed & om-
 nes corporis venæ concreto sanguine plenæ erāt.
 Quod nobis suspicionem fecit, venenum frigidis-
 simum ei fuisse exhibitum, quod adeo extinxerit
 calorē ut sanguis congelatus fuerit, præterquam
 quod cordi adeo fuerit inimicum, ut naturalē ejus
 conformationem perverterit. Aperuit venam ca-
 vam in lumborum vertebra, ubi bifurcatā petit
 crura, at qui exibat sanguis concretus erat. Mirū,
 in vivente corpore sanguinem concreescere posse:
 dissecta fuit hora pomeridiana secunda, cum eo-
 dem die hora 7. matutina obiisset. At caput non
 fuit apertum licet videremus universam veneni
 vim in agone mortis ad caput translatam. Etenim
 facies mirum in modū inturguerat, labia tumida,
 palpebræ ita distentæ, ut bulbi oculorum omni ex
 parte retracti intra orbitas essent. Tanta autem
 malignitas ac acrimonia veneni erat, ut variis lo-
 cis cutis faciei exesa esset, emanaretque sanies
 Fulva.

OB-

OBSERVATIO XXII.

Abscessus pulmonis.

IN corpore muliebri publicè dissecto Anno 1597. die 30. Jan. jecur pallidum planè, & quocunq; pungeres loco ex sanguine, cum tamen scirrhum non esset. Pulmo (miserabile visu) variis locis pleuræ innumeris ligamentis annexus, pericardio quoque; & diaphragmati non uno loco. Sinister pulmo ingentem ostendebat abscessum (qui radicem habebat sub clavicula sinistra) aquosa sanie tabeque plenum, qui plus quam quatuor libras saniei effundebat. Præter magnum hunc abscessum plus quam 30. locis hinc inde exigua habebat apostemata vero ac cocto pure albo referta. Tum & variis locis scirrhus erat pulmo.

OBSERVATIO XXIII.

Tumor oculorum.

ANno 1597. die 7. April. Præsentibus Chirur-
gis M. Johanne Simonis & Alberto, puerulo trienni aperui caput. Hic aliquot mensibus ingenti laborarat tumore ex oculo sinistro, adeo quidem ut integer bulbus ocularis cum musculis omnibus foras protuberaret, in tantamque accrevisset molem, ut duos pugnos protuberantia æquaret. Huic duabus ante mortem septimanis alius tumor ortus fuerat, prope musculum temporalem fini-

sinistrum, quem ablata cute vidimus peculiari (eaq; crassa satis, membrana obductum intra cutem, craniumque hære. Cranium exiguum habebat foraminulum, per quod materiam ejecerat natura. Ablato cranio vidimus ocularis tumoris materiam intra cranium & duram matrem collectam universam integro planè & illæso cerebro. Aperto utroque tumore vidimus eos substantia cerebro planè simili repletos, permixto sanguine concreto, haud aliter ac si molæ substantiam vidisses.

OBSERVATIO XXIV.

Anatome Hydropicæ.

ANno 1597. die 28. Aug. Præsentibus D. Joh. Arsenio & M. Cornelio Chirurgo abdomen fœminæ aperui Hydropicæ, quæ credebatur gravida. Huic magna aquæ flavæ ac fœtidæ effluxit copia. Jecur corruptum. Hujus utero exterius circa fundum adnata cernebatur excrescentia candida, magnitudine Verrucæ, quæ dissecta nil intus continebat, sed solida omni ex parte erat.

OBSERVATIO XXV.

Anatome Atrophicæ.

ANno 1597. die 8. Sept. petente & præsentē D. Trelcatio fœminæ pectus aperui, cui totus pulmo intus purulentus erat, ita ut quacunq; eum tangeres parte, seu novacula pungeres, pus album erum-

erumperet. Hæc lenta macie ac atrophia consumpta Scheleton planè referebat. Referebant malū illud familiæ hæreditarium, ex quo fratres etiam obierant.

OBSERVATIO XXVI.

Dissectio Virilis cadaveris.

ANno 1598. die 28. April. In subiecto virili publicè dissecto 1. dexter musculus pectoralis divisus erat, membrana tendinosa per eum excurrente. 2. Ex illa jecoris parte, quæ sinistrum versus se extendit hypochondrium aliquot per intermedias conjunctæ cernebantur venulæ in ventriculum insertæ. 3. Tertium & quartum nervorum cerebri par huic desiderabatur. 4. Arteriis hic carebat spermaticis, earū loco in utroq; latere duas venas spermaticas videre erat. Loco autem arteriarum seminalium produxerat natura ex ipso trunco Arteriæ aortæ paulò supra ejus bifurcationem ad crura conspicuam amplamque Arteriam, quæ recta deorsum exporrecta in parastatas glandulas, penisque radicem se terminabat.

OBSERVATIO XXVII.

Anatome inflammati jecoris.

ANno 1598. die 10. Octobr. Præsentibus D. Bontio, Heurnio, nonnullisque Studiosis, Danus Studiosus apertus ex inflammatione jecoris qui obierat. Gibba jecoris pars duobus locis ulcus
osten-

ostendebat penetrans ad jecoris interiora. Jecoris parenchyma conglomerata velut cernebatur ac avulsa à membrana jecur cingente, ita ut cavitas conspicua in jecore cernebatur, è qua dimidia urina puris foetidi se effundebat.

OBSERVATIO XXVIII.

Anatome Raphelengii Hydropici.

ANno 1601. Initio, aperui Christophorum Raphelengium, aperto abdomine reperimus magnam se effluentis ac corruptæ flavæ aquæ copiam. Omentum absumptum, Jecur schirrosus ac induratum valdè & cujus Parenchyma planè croceum. Vesicula bilis turgida, qua dissecta ater ac cænosus effluxit crassus fœculentusque sanguis. Intestina, Mesenterium, livido ac adusto colore tincta. Venæ Meseraicæ crassæ obductæ membrana, adeò ut earum nulla conspici posset.

OBSERVATIO XXIX.

Anatome Hydropicæ.

ANno 1601. die 24. Ian. Mulierem aperui adjutus M. Cornelio vocato Meleman Chirurgo, cui abdomen ita inturguerat, ut tres haberet in ambitu ulnas. Aperto abdomine effuderunt se 56. pintæ aquæ. Omentum totum consumptum. Jecoris, lienis, renum (dictu mirum, verissimum tamen) ne vestigia quidem. Diaphragma multis locis exesum ac consumptum. Uterus in eam mole-

lem

lem elatus conspiciebatur, ut in ambitu sesquiulnam haberet. Apertus, conspiciebatur intus mola ex multis duris schirrosis condilomatibus constans, quæ multis locis in pus mutata erant, color molæ erat albus, adenosam substantiam in scirrhum conversam dixisses.

OBSERVATIO XXX.

Anatome Heurnij Calculosi.

A Nno 1601. die 12. Aug. Aperui vesicam Clarissimi Viri D. Iohannis Heurnii, in qua reperi calculos septem, quorum singuli magnitudine erant nucis juglandis, pendebant autem singuli drachmas duas, ita ut simul omnes pondus efficerent drachmarum 14. cum dimidia, aut duarum Unciarum, detracta semidrachma.

OBSERVATIO XXXI.

Anatome Hydropicæ.

A Nno 1602. die 20. Martii, petitione & in præsentia D. Trelcatii, & quoq; Iunioris Trelcatii, præsentibus nonnullis ex Medicinæ Studiosis in foro boario, hydropicæ fœminæ ventrem aperui, è quo aquæ crassæ & amurcæ similis, pintæ se effuderunt 36. Iecur huic totum consumptum, venosis solummodo ductibus iisq; per paucis superstitis. Consumptus Lien, Renes. Venter prassina, viridi bile plenus. Diaphragma aliquot locis sphacelo correptum. Uterus molam intus habebat.

habebat, quæ in materiam melli similem conversa erat, effundebatque se simulac uterus pertunderetur. Fœmina 34. annorum hæc erat.

INDEX

Observationum selectarum

P. PAWII.

I. Anatome gravida.	pag. 3
II. Anatome Diabetis & cæci.	6
III. Anatome Calculosi.	7
IV. Anatome pueri ventrem dolentis.	8
V. Anatome Hydropica.	9
VI. Anatome Gravida.	11
VII. Anatome lecoris suppurati.	13
VIII. Anatome Phrenitidis & Convulsionis	14
IX. Anatome Tabifici.	15
X. Anatome Cuniculi.	16
XI. Anatome Viri cultro interempti.	17
XII. Anatome Veneno Demortuorum.	18
XIII. Anatome Hydropici.	19
XIV. Anatome febris Hæctica.	20
XV. Anatome Viri publica.	21
XVI. Variæ in Anatome Observationes.	21
XVII. Anatome Monstri.	22
XVIII. Anatome pueri veneficio interempti.	24
XIX. Anatome lecoris inflammati.	24
XX. Intestina erosa.	25
XXI. Anatome veneficio mortua.	25
XXII. Abscessus pulmonis.	27
XXIII. Tumor oculorum.	27
XXIV. Anatome Hydropica.	28
XXV. Anatome Atrophica.	28
XXVI. Dissectio Virilis cadaveris 1598.	29
XXVII. Anatome inflammati lecoris.	29
XXVIII. Anatome Raphelengii Hydropici.	30
XXIX. Anatome Hydropica.	30
XXX. Anatome Heurnii calculosi.	31
XXXI. Anatome Hydropica.	31



FINIS.

E 3 - ~~IX - 3~~
~~611~~ Bar

12°
Reg. 183.121

181 6. 1. 75.

BIBLIOTECA DE CATALUNYA



1001942657

E



R

